

Meccanismo interno 1Q vs 2Q su Fock $|n=10\rangle$ a $T=10\,\tau_s$ (main_010)
Popolazione 1-eccit.
2Q indep. (seed 5): tripletto simmetrico $P_{|B\rangle}(t)$
2Q indep. (seed 5): singoletto dark $P_{|D\rangle}(t)$ (max $=0.423$, finale $=8\times10^{-6}$)
2Q common (seed 7): singoletto dark $P_{|D\rangle}(t)\equiv0$ (simmetria conservata)
Popolazione $|e,e\rangle$ / $|e\rangle$
2Q common (seed 7): doppia eccitazione $P_{|e,e\rangle}(t)$ (max $=0.767$)
2Q indep. (seed 5): doppia eccitazione $P_{|e,e\rangle}(t)$ (max $=0.566$)
1Q (seed 0): singola eccitazione $P_{|e\rangle}(t)$ (satura a 1 qubit)
Purezza cavità $\mathrm{Tr}[\rho_c^2]$
1Q (seed 0): $\mathrm{Tr}[\rho_{cav}^2]\geq0.50$ (rango Schmidt ≤2, finale 0.897)
2Q common (seed 7): $\mathrm{Tr}[\rho_{cav}^2]\geq0.339$ (rango ≤3, finale 0.9999)
2Q indep. (seed 5): $\mathrm{Tr}[\rho_{cav}^2]$ scende a 0.277 (rango 4, finale 0.99995)
Limite inferiore purezza 1Q ($1/2=0.50$) e 2Q common ($1/3\approx0.333$)
Tempo normalizzato t/τ_s