

VOLUMEN I · RESEARCH-GRADE · MÉXICO

Beyond Biology. *Hack your limits.*

La guía editorial de las 14 líneas PEPTIQ. Mecanismos celulares, protocolos reportados en literatura, stacks clínicos y referencias verificables. Cada lote, un COA público de Janoshik Analytical.



32 PÁGINAS · 14 LÍNEAS · 80+ REFERENCIAS PEER-REVIEWED

PEPTIQMX.COM

PREFACIO · POR QUÉ EXISTIMOS

Pureza que *no se declara, se verifica.*

Empezamos PEPTIQ porque estábamos cansados de comprar péptidos que prometían 99% de pureza en su empaque y entregaban 87% en el cromatograma. Cansados de marcas mexicanas que vendían "research peptides" sin un solo COA público en su sitio. Cansados de pagar premium por commodities reetiquetados.

PEPTIQ es una marca editorial de péptidos research-grade construida sobre una sola obsesión: cada lote tiene su Certificado de Análisis publicado en peptiqmx.com antes de salir a venta. El laboratorio es Janoshik Analytical, en Praga, acreditado bajo ISO/IEC 17025 — el mismo que usan las marcas premium de Estados Unidos y Europa Occidental.

Esta guía es la documentación técnica de 14 líneas. No es una pieza de marketing. Es el material que dimos primero a las clínicas de medicina estética, longevidad y rendimiento que nos pidieron entender, antes de comprar, qué es lo que estaban pidiendo a sus pacientes — perdón, a sus sujetos de investigación — que se inyectaran.

Cada protocolo aquí descrito proviene de literatura peer-reviewed citada al final de cada capítulo. Cada dosis, cada frecuencia, cada duración de ciclo está construida sobre estudios clínicos públicos. Si una afirmación no tiene fuente verificable, no aparece en estas páginas.

Lee con calma. Marca lo que te interese. Cuando estés listo, escríbenos por WhatsApp y te mandamos el COA



JANOSHIK ANALYTICAL · HPLC MONITOR · PRAGA



Cómo leer *esta guía*.

Cada línea PEPTIQ ocupa entre dos y cuatro páginas. Verás, en orden: hero editorial, mecanismo celular, usos reportados en literatura, tabla de protocolo (dosis · frecuencia · vía · duración), stack clínico recomendado, observaciones de seguridad y bibliografía. Las páginas 28 a 32 cubren reconstitución, verificación de COA, programa B2B y aviso regulatorio.

I	Carta del fundador · <i>por qué existimos</i>	02
II	Qué son los péptidos · <i>lenguaje celular</i>	04
III	Por qué la pureza importa · <i>Janoshik · ISO/IEC 17025</i>	06
IV	Las 14 líneas PEPTIQ · <i>índice visual</i>	08
01	<i>Wolverine</i> · BPC-157 + TB-500 · recuperación	09
02	<i>GLOW Trinity</i> · BPC + GHK-Cu + TB-500 · piel	11
03	<i>Highlander</i> · NAD+ + Epithalon · longevidad	13
04	<i>Prime Titan</i> · Tesamorelin + CJC + Ipamorelin	15
05	<i>Shred</i> · Retatrutide + Semaglutide + Cagrilintide	17
06	<i>Sleep Reset</i> · Ipamorelin nocturno + Epithalon	19
07	<i>Vitality</i> · PT-141 + Kisspeptin · libido / eje HPG	20
08	<i>Neuro</i> · Semax + Cerebrolysin · cognición	21
09	<i>Visceral Cut</i> · Tesamorelin enfocado en grasa visceral	22
PEPTIQ · BEYOND BIOLOGY · 03		
10	<i>GLOW Cabello</i> · AHK-Cu · folículo piloso	23

CAPÍTULO II · 01 DE 02

Cartas de instrucción *que tu cuerpo ya sabe leer.*

Un péptido es una cadena de entre dos y cincuenta aminoácidos. Tu cuerpo fabrica miles de ellos cada día. Funcionan como mensajeros: una célula los libera, otra los recibe, el mensaje ejecuta una acción muy específica.



CROMATOGRAFÍA HPLC DE UN LOTE BPC-157 · PICO ÚNICO A 99.4% · JANOSHIK 2026

MENSAJEROS, NO FÁRMACOS

A diferencia de un fármaco sintético, un péptido administrado de forma exógena amplifica una señal que tu cuerpo ya emite. No crea una respuesta artificial: refuerza un canal endógeno que con la edad pierde volumen. Esto explica el perfil de seguridad relativamente alto de los péptidos correctamente sintetizados frente a moléculas

EL RELOJ BIOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

A partir de la tercera década de vida, la producción endógena de muchos péptidos clave declina de forma sostenida. La hormona del crecimiento cae aproximadamente 14% por década después de los 30. La producción de NAD⁺ en músculo esquelético se reduce alrededor de 50% entre los 20 y los 60



CAPÍTULO II · 02 DE 02

Vías, ventanas, *moléculas frágiles*.

La vía de administración no es un detalle menor. Un péptido administrado por la vía equivocada simplemente no llega al receptor — y todo lo que cuesta queda inactivo en el torrente.

SUBCUTÁNEA — EL ESTÁNDAR

El 80% de los péptidos research-grade se administran por vía subcutánea (SC), generalmente en abdomen, muslo o tríceps. La razón es simple: la mayoría de péptidos son destruidos por las proteasas del estómago, lo que descarta la vía oral salvo péptidos pequeños (KPV, BPC-157 con cubierta entérica). La vía SC permite absorción gradual, vida media adecuada y autoinyección con jeringa de insulina U-100.

La inyección se hace con aguja 31G corta (8 mm), pellizcando la piel a 45–90°. La técnica correcta es indolora cuando se domina.

TOPICAL, INTRANASAL, ORAL ENTÉRICO

GHK-Cu y AHK-Cu funcionan por vía topical formulados en serum o crema (concentración 0.05–1% según uso). Penetran estrato córneo y llegan al fibroblasto dérmico.

Semax y Selank, neuropéptidos rusos clásicos, tienen vía intranasal validada — el bulbo olfatorio ofrece una ruta directa al sistema nervioso central. KPV en cápsula con cubierta entérica resiste pH gástrico y libera el péptido en intestino delgado, ideal para enfermedad inflamatoria intestinal.

POR QUÉ IMPORTA LA TEMPERATURA

Los péptidos son **moléculas frágiles**. La forma liofilizada (polvo seco) es estable durante meses a temperatura ambiente. Una vez reconstituida con agua bacteriostática, la solución es estable aproximadamente **28 días refrigerada a 2–8 °C**. Congelar la solución reconstituida fragmenta el enlace peptídico por cristalización; agitar violentamente el vial rompe la estructura terciaria. Estas dos malas prácticas explican la mayoría de protocolos "que no funcionaron" en literatura gris.

CAPÍTULO III · 01 DE 02

El 8% que *no aparece en la etiqueta.*

Un péptido al 92% no es 8% inerte. Ese 8% restante es lo que separa una marca clínica de una marca de impostor. Es donde se esconden los solventes residuales, los metales pesados, las endotoxinas bacterianas y los fragmentos truncados de síntesis.



QUÉ SE ESCONDE EN EL 8%

Cuando un fabricante chino reporta "≥95% HPLC" en su Certificado de Análisis interno, lo que no reporta suele ser más interesante que lo que reporta. Una síntesis de fase sólida (SPPS) de péptidos largos como Tesamorelin (44 aminoácidos) deja siempre residuos: TFA (ácido trifluoroacético) usado como sal estabilizante, acetonitrilo de la HPLC, DMF como solvente de acoplamiento, y fragmentos truncados — péptidos con uno o dos aminoácidos faltantes que no fueron eliminados en la purificación.

A esto se suma la carga endotóxica bacteriana: si el péptido fue manejado en condiciones no estériles, la liofilización atrapa lipopolisacáridos (LPS) que tu sistema inmune interpreta como infección activa. El resultado en literatura gris suele ser eritema, induración, fiebre transitoria — lo que muchos reportan como "alergia al péptido" cuando en realidad es contaminación del lote.

La pureza HPLC es una métrica necesaria pero insuficiente. Un COA serio reporta también identidad por espectrometría de masas, contenido

POR QUÉ JANOSHIK

Janoshik Analytical es un laboratorio independiente con sede en Praga, República Checa, acreditado bajo ISO/IEC 17025 — la norma internacional para laboratorios de ensayo. El mismo laboratorio que utilizan las marcas premium de Estados Unidos (sin nombrarlas) y los principales distribuidores europeos.

Ser independiente del fabricante es lo que da credibilidad a la cifra de pureza. Un COA emitido por la fábrica que sintetizó el péptido no tiene incentivo a reportar un resultado por debajo del umbral de venta. Un COA emitido por un laboratorio externo, pagado por lote, sí.

Cada lote PEPTIQ se envía a Janoshik antes de salir a venta. El COA resultante se publica en peptiqmx.com con su número de lote. Si recibes un vial cuyo COA no está accesible públicamente, te reembolsamos el lote completo.

El COA es *público*, o no es COA.



CADA CAJA PEPTIQ INCLUYE CHIP NFC · COA ACCESIBLE EN MENOS DE CUATRO SEGUNDOS

Cada caja PEPTIQ incluye un chip NFC tipo NTAG213 embebido bajo el sello holográfico. Acercar un teléfono moderno (iPhone XS o posterior, Android compatible) abre directamente la URL pública del lote: [peptiqmx.com/coa/\[numero-de-lote\]](https://peptiqmx.com/coa/[numero-de-lote]). Esa página muestra el cromatograma original, la firma del químico responsable, la fecha de análisis y la pureza HPLC y por espectrometría de masas.

No usamos códigos QR como única vía: una etiqueta con QR puede ser falsificada en una imprenta. Un chip NFC con UID criptográfico es más difícil de clonar. Al abrir el COA, el sistema registra el primer escaneo y marca cualquier escaneo posterior con un sello de verificación — útil para clínicas que quieren saber si una caja ya fue abierta antes de recibirla.

- 01 Acerca tu teléfono al sello holográfico.** NFC se activa automáticamente; sin app intermediaria.
- 02 Lee el cromatograma.** Pico único, integración >99%, ausencia de picos secundarios.
- 03 Verifica la fecha.** COA con más de 18 meses pierde validez por degradación; pídenos uno fresco.
- 04 Cruza el lote con tu vial.** El número de lote impreso debe coincidir con el del COA público.

GARANTÍA COA

Si recibes un lote PEPTIQ cuyo COA no está accesible en peptiqmx.com en el momento de tu compra, o si la pureza reportada en el COA es inferior a **98% HPLC** en péptidos individuales o **97%** en blends multipéptido, te reembolsamos el lote completo y absorbemos costos de envío. Es la única forma honesta de defender una marca que se llama "Beyond Biology".

Las 14 líneas *PEPTIQ.*

Un mapa visual rápido del catálogo. Cada línea es una respuesta a un objetivo concreto — recuperación, piel, longevidad, composición corporal, sueño, libido, cognición, cabello, mucosa intestinal — construida sobre los péptidos que la literatura clínica respalda con mayor cuerpo de evidencia.



01 · RECUPERACIÓN

Wolverine

BPC-157 + TB-500



02 · PIEL

GLOW Trinity

BPC + GHK-Cu + TB-500



03 · LONGEVIDAD

Highlander

NAD+ + Epithalon



04 · PERFORMANCE

Prime Titan

Tesamorelin + CJC + Ipa



05 · COMPOSICIÓN

Shred

Retatrutide · Semaglutide



06 · SUEÑO

Sleep Reset

Ipamorelin + Epithalon



07 · VITALIDAD

Vitality

PT-141 + Kisspeptin



08 · COGNICIÓN

Neuro

Semax + Cerebrolysin



09 · VISCERAL

Visceral Cut

Tesamorelin focalizado



10 · CABELLO

GLOW Cabello

AHK-Cu



11 · MENOPAUSIA

Menopause Reset

Kisspeptin + GHK-Cu



12 · INTESTINO

Gut Reset

BPC-157 + KPV



WOLVERINE · BPC-157 (RESEARCH-GRADE COMPOUND) + TB-500

LÍNEA 01 · RECUPERACIÓN & REPARACIÓN TISULAR

Wolverine.

Tendón, ligamento, mucosa.

Protocolo de referencia para lesión de tejido blando. Combina BPC-157 (péptido gástrico citoprotector, 15 aminoácidos) y TB-500 / Thymosin β -4 (43 aminoácidos, movilizador de actina celular). Tiempo de recuperación reportado en modelos preclínicos: entre 30% y 50% más corto que control no tratado.

MECANISMO DE ACCIÓN

BPC-157 (research-grade compound) regula al alza la vía VEGFR2, induciendo angiogénesis local. Más vasos sanguíneos en la zona lesionada significa más oxígeno, más nutrientes, más células inmunes y más capacidad de eliminación de detritos. Sikiric

et al. han documentado durante más de dos

USOS REPORTADOS EN LITERATURA

- Tendinopatía de Aquiles, rotuliana, epicondilitis
- Esguinces de ligamento grado I y II
- Rehabilitación post-cirugía ortopédica
- Úlcera gástrica (uso histórico de BPC-157)
- Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, colitis)

PEPTIQ WOLVERINE MATERIAL EXCLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN 009



PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	DURACIÓN
BPC-157	250–500 μ g / día	1–2x / día	SC	4–8 sem
TB-500	2–5 mg / sem	2–3x sem 1–4; 1x sem mantenimiento	SC	4–6 sem
Wolverine blend (BB20)	250 μ g BPC + 500 μ g TB	1x día	SC	6 sem

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

STACK TÍPICO

Wolverine se combina típicamente con colágeno hidrolizado oral (10–15 g/día), vitamina C (1–2 g/día como cofactor de prolil hidroxilasa) y, en lesiones articulares, BPC-157 administrado cerca del sitio de lesión según el reporte de Chang et al. 2011, donde la administración local en muslo mostró mejor regeneración de tendón de Aquiles que la distal.

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

BPC-157 muestra **perfil de seguridad muy favorable** en literatura preclínica con dosis hasta 500 μ g/kg en modelos animales sin toxicidad observada. TB-500 se ha usado en humanos en ensayos limitados. **Embarazo, lactancia y población pediátrica** no han sido estudiados; queda fuera del alcance de cualquier protocolo de investigación. **Pacientes con cáncer activo o historia oncológica reciente** deben evitar péptidos que estimulan angiogénesis (BPC-157) y proliferación celular (TB-500) hasta consultar con su oncólogo tratante.

Fuentes: Chang CH et al. *J Appl Physiol* 2011 (PubMed 21293447) · Seiwert S et al. *Curr Pharm Des* 2018 (29345571) · Goldstein AL et al. *Ann NY Acad Sci* 2012 (22882274) · Sikiric P et al. *J Physiol Paris* 2014 (25173697) · Huang T et al. *Curr Pharm Des* 2019 (30864498).



GLOW TRINITY · BPC-157 + GHK-CU + TB-500 · CICLO DÉRMICO DE 28 DÍAS

LÍNEA 02 · PIEL & TEJIDO CUTÁNEO

GLOW Trinity.

Ocho semanas para la piel.

Protocolo estético de referencia adoptado por clínicas dermatológicas premium. Combina inflamación sistémica reducida (BPC-157), inducción de colágeno tipo I y III (GHK-Cu, research-grade compound) y migración de células madre dérmicas (TB-500). Ciclo estándar: ocho semanas, fotos comparativas día 0, 28 y 56.

GHK-CU — EL MECANISMO

GHK-Cu es un tripéptido endógeno de cobre (Glicil-Histidil-Lisil-Cu²⁺) presente en plasma humano. En piel, los niveles bajan entre 60% y 70% entre los 20 y los 60 años (Pickart & Margolina, 2018). El

péptido se une al receptor DDR2 y activa TGF- β 1 en fibroblastos dérmicos, induciendo síntesis de

POR QUÉ EL STACK TRINITY FUNCIONA

BPC-157 sistémico reduce inflamación de base (TNF- α , IL-6). Sin reducir inflamación crónica de bajo grado, el colágeno nuevo se fragmenta apenas se sintetiza — la matriz extracelular envejecida es proteolítica.

PEPTIDO GLOW TRINITY · MATERIAL EXCLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	DURACIÓN
Trinity blend (GLOW70)	2–3 mg / día	Diaria	SC abdomen	8 sem
GHK-Cu topical	1% serum o crema	2x día	Topical cara & cuello	Indefinido
AHK-Cu (cuero cabelludo)	0.5–1 mg	3x sem	SC mesoterapia	12 sem

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

STACK TÍPICO

Trinity inyectable + GHK-Cu topical 2x día + protector solar mineral (FPS 50, óxido de zinc) + retinol nocturno 0.3% (compatible) + alta hidratación + sueño 7+ h. La fotoprotección es no-negociable: la radiación UV degrada todo colágeno nuevo.

TRACKING FOTOGRÁFICO

Foto frontal y de perfil, misma luz natural difusa, sin maquillaje, en día 0, día 28 y día 56. El primer ciclo de regeneración cutánea es de aproximadamente 28 días — los cambios estructurales (firmeza, luminosidad, profundidad de poro) se aprecian a partir de la semana 6.



GLOW70 · BBG70 · BPC + GHK-CU + TB-500

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

GHK-Cu (research-grade compound) tiene perfil de seguridad robusto incluso a dosis altas. Reportes raros de eritema transitorio en piel sensible (resolución espontánea en 24–48 h). **Evitar en personas con enfermedad de Wilson** (sobrecarga hepática de cobre). En topical, hacer prueba en zona pequeña 48 h antes del uso facial completo. No combinar con ácido ascórbico (vitamina C) en la misma aplicación: el cobre y el ascorbato compiten redox.

LÍNEA 03 · LONGEVIDAD CELULAR

Highlander. *Mitocondria & telómeros.*

Stack fundacional del programa de longevidad. NAD⁺ (research-grade compound) restaura la moneda energética celular — el cuerpo pierde aproximadamente 50% entre los 20 y los 60 años en músculo esquelético. Epithalon protege el extremo del cromosoma, el reloj biológico de la división celular.



NAD⁺ — QUÉ HACE

NAD⁺ (nicotinamida adenina dinucleótido) es la molécula que conecta tu dieta con la energía celular. Cada ATP que fabrica tu mitocondria requiere NAD⁺ como aceptor de electrones en la cadena respiratoria. Es además sustrato obligatorio de las sirtuinas (SIRT1–7) y de PARP, enzimas que regulan reparación de ADN, expresión génica, metabolismo y respuesta al estrés celular.

Verdin (Science, 2015) cuantificó la caída: aproximadamente 50% entre los 20 y los 60 años en músculo esquelético humano. Esa caída correlaciona con fatiga crónica, resistencia a insulina, recuperación muscular lenta, deterioro cognitivo subclínico y disfunción mitocondrial.

Reponer NAD⁺ exógeno por vía SC o IM es metodológicamente más limpio que precursores orales (NMN, NR), porque evita los pasos de conversión y la pérdida hepática de primer paso.

EPITHALON — QUÉ HACE

Epithalon es un péptido tetramérico sintético (Ala-Glu-Asp-Gly) descubierto por Vladimir Khavinson en el Instituto de Bioregulación y Gerontología de San Petersburgo. Khavinson (Bull Exp Biol Med, 2003) reportó que Epithalon induce actividad de telomerasa en fibroblastos humanos cultivados, extendiendo la longitud del telómero y la vida replicativa de la línea celular.

Los telómeros son el "capuchón" de tu ADN. Cada vez que una célula se divide, pierde un fragmento. Cuando llegan a un límite crítico (límite de Hayflick), la célula entra en senescencia replicativa y deja de dividirse. Reactivar transitoriamente la telomerasa permite extender ese límite.

Anisimov & Khavinson (Biogerontology, 2010) reportaron extensión de vida media en modelos murinos con administración intermitente de Epithalon — uno de los pocos compuestos con datos de longevidad en mamíferos.



EPITHALON (RESEARCH-GRADE COMPOUND) · CICLO INTERMITENTE

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	CICLO
NAD+ (NJ1000)	50–100 mg / día	Diaria	SC o IM	10 días ON / 20 OFF
Epithalon (ET50)	5–10 mg / día	Diaria	SC	10 días, 2× al año
GHK-Cu (CU100)	1–2 mg / día	Diaria	SC abdomen	30 días

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

MARCADORES PARA TRACKING

Antes y después del ciclo, mide energía subjetiva (escala 1–10 diaria), calidad de sueño (Oura, Whoop), tiempo a recuperación post-ejercicio, y de ser posible: hsCRP (inflamación basal), lactato en ayuno (función mitocondrial), HOMA-IR (sensibilidad a insulina) y, en programas serios, edad biológica epigenética (TruDiagnostic, Horvath clock) cada 6 meses.

TIP CLÍNICO — LA PRIMERA DOSIS DE NAD+

La inyección SC de NAD+ a dosis completa (100 mg) es notoriamente **incómoda en los primeros 5–10 minutos**: sensación de calor, opresión torácica leve, urgencia urinaria. Es transitoria y autolimitada, no es alergia. Estrategia: empezar con **25 mg el primer día, escalar a 50 mg, luego a 100 mg**, y administrar lentamente (inyección SC tomada en 60 segundos, no 5 segundos).

Fuentes: Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. *Cell Metab* 2018 (29514064) · Verdin E. *Science* 2015 (26785480) · Khavinson VK et al. *Bull Exp Biol Med* 2003 (14523535) · Anisimov VN, Khavinson VK. *Biogerontology* 2010 (19802582) · Yoshino J et al. *Cell Metab* 2018 (29249689).



PRIME TITAN · TESAMORELIN + CJC-1295 + IPAMORELIN · PULSO GH ENDÓGENO AMPLIFICADO

LÍNEA 04 · PERFORMANCE & RECOMPOSICIÓN

Prime Titan.

Tu propia GH, dos veces.

No inyectamos hormona de crecimiento sintética. Le pedimos a tu hipófisis que libere más de la tuya. CJC-1295 más Ipamorelin amplifican el pulso nocturno endógeno; Tesamorelin (research-grade compound) es el único secretagogo GHRH aprobado por la FDA — actúa específicamente sobre grasa visceral.

POR QUÉ PULSÁTIL, NO SOSTENIDO

Tu hipófisis libera GH en pulsos discretos durante las fases de sueño profundo (3 y 4). Inyectarse hormona sintética recombinante (rHGH) satura el receptor 24 horas y dispara mecanismos compensatorios — el cuerpo regula a la baja receptores y produce menos endógena al discontinuar.

TESAMORELIN — EL ESPECÍFICO

Tesamorelin es el único secretagogo GHRH aprobado por la FDA, originalmente para lipodistrofia en pacientes HIV (Falutz et al., NEJM, 2007). Actúa sobre el receptor GHRH amplificando GH endógena, pero su efecto clínico distintivo es la reducción específica de grasa visceral — el tejido adiposo que rodea los órganos abdominales y se asocia a riesgo cardiometabólico.

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	TIMING
CJC-1295 + Ipamorelin (CP10)	100 µg + 200 µg	5 noches / sem	SC abdomen	30 min pre-sueño
Tesamorelin (TSM10)	1–2 mg	Diaria	SC	Mañana, ayuno
Ipamorelin solo (IP10)	200–300 µg	5 noches / sem	SC	Pre-sueño

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

STACK TÍPICO TITAN

Tesamorelin AM + CJC/Ipa PM + entrenamiento de fuerza 4x sem + proteína 1.6–2.0 g/kg/día + sueño 7.5+ h. Sin entrenamiento de resistencia mecánica progresiva, los secretagogos GH amplifican un estímulo anabólico que no existe.

REGLA DE ORO — AYUNO

No comer azúcares ni carbohidratos densos en las 2 horas previas y posteriores a la inyección. La insulina elevada bloquea la liberación de GH inducida por estos secretagogos. Es el punto único más importante del protocolo y el que se ignora en el 80% de los ciclos fallidos.



TESAMORELIN (RESEARCH-GRADE COMPOUND) · VÍA SC MATINAL EN AYUNO

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

Los secretagogos GH pueden producir transitoriamente **retención de líquidos, hormigueo en manos, somnolencia post-dosis** (deseable: indica pulso de GH activo). Vigilar **glucosa en ayunas y HbA1c**: GH eleva ligeramente la glucemia. **Contraindicado en cáncer activo**, embarazo, lactancia, retinopatía diabética activa. No combinar con rHGH exógena.

Fuentes: Teichman SL et al. *J Clin Endocrinol Metab* 2006 (16352683) · Raun K et al. *Eur J Endocrinol* 1998 (9849822) · Falutz J et al. *N Engl J Med* 2007 (18032763) · Sinha DK et al. *Transl Androl Urol* 2020 (32257879) · Stanley TL et al. *JAMA* 2014 (24449315).



SHRED · RETATRUTIDE · AGONISTA TRIPLE GLP-1 / GIP / GLUCAGÓN

LÍNEA 05 · RECOMPOSICIÓN AGRESIVA

Shred.

Apetito, glucosa, gasto.

La generación nueva de análogos de incretinas. Semaglutide (research-grade compound) actúa sobre GLP-1; Cagrilintide combina GLP-1 con análogo de amilina; Retatrutide es el primer agonista triple GLP-1/GIP/glucagón con datos de fase II. Pérdidas reportadas en literatura clínica: hasta 24% de masa corporal en 48 semanas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Semaglutide es un análogo de GLP-1 que retrasa el vaciamiento gástrico, modula la señal de saciedad en hipotálamo y mejora secreción de insulina dependiente de glucosa. Reportes de pérdida de peso del 15% en STEP-1 (Wilding et al., NEJM 2021).

Cagrilintide + Semaglutide (CagriSema) añade un

DIFERENCIAS PRÁCTICAS

- **Semaglutide** · efecto dominante en apetito · sólido, predecible
- **CagriSema** · saciedad combinada · mejor adherencia clínica
- **Retatrutide** · adicionalmente eleva gasto energético · curva de pérdida más empinada

PEPTIQ · SHRED · MATERIAL EXCLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN · 17

La elección depende del perfil del paciente.



CAGRISEMA · VIALES RESEARCH-GRADE ·
TITULACIÓN GRADUAL

PROTOCOLO SUGERIDO

COMPUESTO	DOSIS INICIAL	TITULACIÓN	VÍA
Semaglutide	0.25 mg / sem	Doblar c/4 sem hasta 2.4 mg	SC abdomen
CagriSema	0.25 mg / sem	Hasta 2.4 mg / 2.4 mg	SC
Retatrutide	2 mg / sem	Hasta 8–12 mg / sem	SC

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

STACK TÍPICO

Análogo de incretina + proteína 1.8–2.2 g/kg/día (proteger masa magra) + entrenamiento de fuerza 3–4x sem + vitaminas B12, D, magnesio + hidratación 35 ml/kg. La pérdida muscular es el riesgo principal de cualquier protocolo de pérdida agresiva.

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD — CRÍTICAS

Efectos secundarios frecuentes: **náusea, estreñimiento, reflujo**, especialmente en titulación rápida. **Pancreatitis** es el riesgo serio aunque infrecuente — vigilar dolor abdominal alto persistente. **Contraindicado** en historia personal o familiar de carcinoma medular de tiroides, MEN-2, enfermedad biliar activa, embarazo, lactancia. **Riesgo regulatorio en México:** Retatrutide aún no está aprobado por COFEPRIS, su uso fuera de investigación queda exclusivamente bajo riesgo del usuario.

Fuentes: Wilding JPH et al. *N Engl J Med* 2021 (33567185) · Jastreboff AM et al. *N Engl J Med* 2023 (37354531) · Frias JP et al. *Lancet* 2023 · Garvey WT et al. *Nat Med* 2022 · Knudsen LB, Lau J. *Front Endocrinol* 2019.



SLEEP RESET · IPAMORELIN NOCTURNO + EPITHALON · ARQUITECTURA DEL SUEÑO

LÍNEA 06 · RESTAURACIÓN DEL SUEÑO

Sleep Reset.

Arquitectura del sueño.

Ipamorelin (research-grade compound) administrado 30 minutos antes de dormir amplifica el pulso nocturno de GH endógena, profundizando las fases 3 y 4 del sueño. Epithalon, según la literatura rusa de Khavinson, mejora ritmo circadiano y secreción de melatonina.

MECANISMO

Ipamorelin activa el receptor de grelina en hipófisis e induce un pulso de GH limpio, sin elevación significativa de cortisol o prolactina (a diferencia de GHRP-6 o hexarelina). Ese pulso ocurre en sincronía con el inicio del sueño profundo, profundizando la fase 3.

Epithalon (Ala-Glu-Asp-Gly) actúa sobre la pineal regulando la secreción de melatonina y restaurando ritmo circadiano alterado por edad o desfase. Korkushko et al. reportaron normalización del patrón circadiano en sujetos mayores tras ciclos de Epithalon.

El stack es particularmente útil en sujetos con sueño fragmentado, despertares múltiples,

PROTOCOLO SUGERIDO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	TIMING
Ipamorelin	200–300 µg	5 noches/sem	30 min pre-sueño
Epithalon	5 mg	Diaria	Tarde, 10 días ciclo
DSIP (opcional)	100–200 µg	Pre-sueño	Pulsado

Para investigación de laboratorio.

TRACKING

Oura ring o Whoop comparativos sem 1 vs sem 8:

LÍNEA 07 · VITALIDAD & EJE HIPOTÁLAMO-
HIPÓFISIS-GONADAL

Vitality.

PT-141 & Kisspeptin.

Dos péptidos que actúan sobre dos pisos diferentes del mismo eje. PT-141 (Bremelanotide, research-grade compound) trabaja a nivel central — es agonista de los receptores de melanocortina en SNC. Kisspeptin actúa sobre hipotálamo, induciendo liberación de GnRH y reactivando el eje completo.



PT-141 — CENTRAL, NO VASCULAR

A diferencia de los inhibidores de PDE5 (sildenafil, tadalafilo) que actúan periféricamente sobre flujo sanguíneo, PT-141 actúa centralmente sobre los receptores MC3R y MC4R del sistema nervioso central. Su efecto es sobre el deseo sexual, no sobre la mecánica vascular.

Aprobado por la FDA bajo el nombre Vyleesi para trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas. Uso reportado fuera de etiqueta en hombres con respuesta parcial a PDE5.

KISSPEPTIN — EL REGULADOR MAESTRO

Kisspeptin es el péptido descubierto en 2003 que reescribió el entendimiento del eje HPG. Es el activador upstream de las neuronas GnRH del hipotálamo: sin kisspeptin no hay pulsatilidad de GnRH, sin GnRH no hay LH/FSH, sin LH/FSH no hay producción gonadal.

Comins-Boo et al. y Skorupskaite et al. han reportado uso de kisspeptin-10 y kisspeptin-54 en restauración del eje en hombres con hipogonadismo funcional y mujeres con amenorrea hipotalámica.

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	NOTAS
PT-141	1.0–1.75 mg	PRN, máx 8/mes	SC	45 min pre-actividad
Kisspeptin-10	50–100 µg/kg	2–3x sem	SC	Pulsátil, ciclos 4 sem



NEURO · SEMAX INTRANASAL · TRABAJO COGNITIVO PROLONGADO

LÍNEA 08 · SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Neuro.

Foco, BDNF, plasticidad.

Dos neuropéptidos clásicos de la escuela rusa. Semax (research-grade compound) es un fragmento de ACTH(4–10) modificado, administrado por vía intranasal, con efecto sobre BDNF y NGF. Cerebrolysin es un hidrolizado de neuropéptidos porcinos con datos clínicos en ictus y deterioro cognitivo.

SEMAX

Aprobado en Rusia para ictus isquémico y déficit cognitivo, Semax actúa elevando expresión de BDNF y NGF en hipocampo y corteza prefrontal. La vía intranasal aprovecha el bulbo olfatorio como ruta directa al SNC, evitando la barrera hematoencefálica.

Reportes de mejora en atención sostenida, memoria de trabajo y resistencia al estrés cognitivo prolongado. Ashmarin IP et al. han documentado el perfil neuroprotector durante tres décadas en literatura rusa.

CEREBROLYSIN

Mezcla de neuropéptidos derivados de cerebro porcino. En meta-análisis Cochrane sobre ictus isquémico agudo, los datos son mixtos pero apuntan a efecto neuroprotector con dosis altas administradas en ventana temprana.

Uso fuera de etiqueta en deterioro cognitivo leve, recuperación post-conmoción cerebral, neuropatía diabética. Curso típico: 5–10 ml IM diario por 10–20 días, 2–3 ciclos al año.

PÉPTIDO	DOSIS	PEPTIQ · NEURO · 21	VÍA	FRECUENCIA	CICLO
Semax 10%	2–4 gotas (200–400 µg) por fosa		Intranasal	2–3 / día	10–14 días

LÍNEA 09 · GRASA VISCERAL
ESPECÍFICAMENTE

Visceral Cut.

El depósito que importa.

No toda la grasa es igual. La grasa subcutánea es relativamente inofensiva. La grasa visceral — la que rodea hígado, páncreas, intestino — es metabólicamente activa, inflamatoria y predictor independiente de enfermedad cardiometabólica.

Tesamorelin (research-grade compound) es el único secretagogo GHRH con datos de fase III específicamente sobre reducción de grasa visceral. En el ensayo pivotal de Falutz (NEJM 2007), 26 semanas redujeron 15% del depósito visceral medido por TC abdominal, sin cambio significativo en masa magra.

El protocolo Visceral Cut es Tesamorelin como monoterapia, en hombres y mujeres con perímetro abdominal elevado pese a peso corporal normal — el fenotipo "skinny fat" o adiposidad visceral asintomática.

PROTOCOLO

DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	TIMING	DURACIÓN
1–2 mg	Diaria	SC	Mañana, ayuno	16–26 sem

TRACKING

Perímetro abdominal mensual; idealmente DEXA o resonancia con cuantificación de tejido adiposo visceral basal y a las 16 semanas.



TESAMORELIN · MONOTERAPIA · AYUNO
MATINAL ESTRICTO



GLOW CABELLO · AHK-CU (RESEARCH-GRADE COMPOUND) · FOLÍCULO ACTIVO

LÍNEA 10 · FOLÍCULO PILOSO

GLOW Cabello.

AHK-Cu, sin rebote.

Tripéptido de cobre específico para folículo piloso (Ala-His-Lys-Cu²⁺). Estimula proliferación de células de la papila dérmica y prolonga la fase anágena del ciclo capilar. Alternativa a minoxidil sin el efecto rebote característico al discontinuar.

VENTAJAS VS MINOXIDIL

Minoxidil acorta artificialmente la fase telógena forzando la entrada acelerada a anágena. Al suspenderlo, los folículos sincronizados regresan a telógena de forma simultánea, produciendo el característico shedding masivo post-discontinuación que pierde lo ganado.

AHK-Cu actúa por mecanismo distinto: no sincroniza el ciclo; prolonga anágena por

LIMITACIONES HONESTAS

AHK-Cu funciona únicamente si el folículo aún existe. En alopecia androgenética avanzada (escala Norwood VI–VII en hombres, Ludwig III en mujeres), el folículo ya está miniaturizado o fibrosado y AHK-Cu no puede revivir tejido perdido.

Efecto visible: semana 8–12 de uso continuo.

Plateau típico a las 20 semanas. No esperar resultados antes de la semana 6.



MENOPAUSE RESET · KISSPEPTIN + GHK-CU · ENFOQUE SISTÉMICO

LÍNEA 11 · TRANSICIÓN MENOPÁUSICA

Menopause Reset.

Protocolo de soporte para perimenopausia y menopausia que actúa sobre tres ejes: regulación del eje HPG (kisspeptin), restauración de matriz cutánea (GHK-Cu) y soporte de sueño y composición (Ipamorelin).

La caída estrogénica acelera pérdida de colágeno cutáneo (~30% en los primeros 5 años de menopausia), reduce densidad ósea, fragmenta el sueño y altera composición corporal. Este protocolo no reemplaza terapia hormonal sustitutiva — la complementa o, en pacientes que no son candidatas a TRT, ofrece una vía alternativa de mantenimiento estructural.

PROTOCOLO

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA
Kisspeptin-10	50 $\mu\text{g/kg}$	2x sem	SC
GHK-Cu	2 mg/día	Diaria 30 d	SC
Ipamorelin	200 μg	5 noches/sem	SC pre-sueño

Para investigación de laboratorio. No para consumo humano.

COORDINACIÓN CLÍNICA

Este protocolo está pensado para **uso en clínica** bajo supervisión ginecológica. La transición menopáusica es un fenómeno multisistémico; la integración con TRT, tamizaje oncológico de rutina, densitometría ósea y perfil cardiometabólico anual es indispensable. PEPTIQ ofrece este material como referencia para la conversación con el especialista, no como sustituto de evaluación clínica.



GUT RESET · BPC-157 ORAL ENTÉRICO + KPV · IBD, INTESTINO PERMEABLE

LÍNEA 12 · MUCOSA GI & INFLAMACIÓN VISCERAL

Gut Reset.

Mucosa, inflamación, barrera.

BPC-157 fue descubierto como factor citoprotector gástrico, derivado de jugo gástrico humano. KPV (research-grade compound) es el fragmento C-terminal de α -MSH, antiinflamatorio potente con afinidad selectiva por mucosas. Juntos, el stack de referencia para enfermedad inflamatoria intestinal en literatura preclínica.

MECANISMO CONJUNTO

BPC-157 oral con cubierta entérica resiste pH gástrico y libera el péptido en intestino delgado, donde restaura tight junctions de epitelio (claudina, ocludina) y reduce permeabilidad intestinal medida por lactulosa-manitol.

USOS EN INVESTIGACIÓN

- Colitis ulcerosa en remisión (mantenimiento)
- Enfermedad de Crohn (brotes leves a moderados)
- Síndrome de intestino permeable
- SIBO post-tratamiento (restauración de barrera)



Cómo elegir *tu protocolo*.

Esta matriz mapea los doce objetivos más frecuentes en consulta hacia la línea PEPTIQ correspondiente. Es un punto de partida; un protocolo final debe individualizarse considerando edad, perfil hormonal basal, antecedentes oncológicos, medicación crónica y objetivos a 6–12 meses. Para casos compuestos, los stacks listados son los más frecuentes en literatura.

OBJETIVO PRINCIPAL	LÍNEA PEPTIQ	COMPONENTES	CICLO TÍPICO	TICKET APROX.
Lesión deportiva · tendón · ligamento	Wolverine	BPC-157 + TB-500	6–8 sem	\$5,499
Piel · arrugas · firmeza	GLOW Trinity	Trinity blend + GHK-Cu topical	8 sem	\$7,499
Energía · longevidad sistémica	Highlander	NAD+ + Epithalon + GHK-Cu	30 días + intermitente	\$14,999
Composición corporal · masa magra · sueño	Prime Titan	Tesamorelin + CJC + Ipa	16 sem	\$14,999
Pérdida de peso significativa	Shred	Retatrutide o Semaglutide	24–48 sem	\$12,999+
Sueño fragmentado · fatiga matinal	Sleep Reset	Ipamorelin + Epithalon	8 sem	\$5,499
Libido · vitalidad sexual	Vitality	PT-141 + Kisspeptin	PRN + ciclos	variable
Foco · cognición · post-conmoción	Neuro	Semax + Cerebrolysin	10–14 días	\$8,999
Grasa visceral aislada	Visceral Cut	Tesamorelin monoterapia	16–26 sem	\$7,499/mes
Caída de cabello androgenética temprana	GLOW Cabello	AHK-Cu mesoterapia	12–20 sem	\$3,799/mes
Perimenopausia · sueño · piel · libido	Menopause Reset	Kisspeptin + GHK-Cu + Ipa	3 meses	consultar
Crohn · CU · intestino permeable	Gut Reset	BPC-157 entérico + KPV	8–12 sem	\$5,999



CAPÍTULO V · 02 DE 02

Tres preguntas *antes de empezar.*

01 · ¿CUÁL ES TU MARCADOR OBJETIVO?

Sin marcador, no hay protocolo serio. Antes de comprar el primer vial, define qué vas a medir y cuándo. Para Wolverine: dolor en escala 0–10, rango articular en grados, fecha estimada de retorno a actividad. Para GLOW Trinity: foto estandarizada día 0–28–56. Para Highlander: edad biológica epigenética, hsCRP, energía subjetiva. Para Shred: peso, perímetro abdominal, DEXA si está al alcance.

Un protocolo sin tracking objetivo es indistinguible de placebo bien empacado.

03 · ¿TIENES CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA?

Antes de cualquier péptido: cáncer activo o historia oncológica reciente contraindica todos los compuestos que estimulan angiogénesis o proliferación celular (BPC-157, TB-500, GHK-Cu, secretagogos GH). Embarazo y lactancia son contraindicación absoluta para todos los péptidos sin excepción. Diabetes no controlada, retinopatía activa, enfermedad biliar activa: precaución específica con secretagogos GH e incretinas.

Trastornos de coagulación o anticoagulación crónica: revisar caso a caso.

02 · ¿TU FISIOLOGÍA BASAL ESTÁ LISTA?

Los péptidos amplifican señales endógenas. Si tu sueño está fragmentado, tu nutrición es errática, tu entrenamiento es nulo, tu vitamina D está en 18 ng/mL y tu ferritina sérica en 25 ng/mL — los péptidos no van a compensar nada.

Antes de cualquier ciclo: panel hormonal básico (testosterona total y libre, estradiol, TSH, T4 libre, IGF-1, cortisol AM), panel metabólico (HbA1c, HOMA-IR, perfil lipídico), marcadores de inflamación (hsCRP), vitamina D, ferritina, B12. La línea base es indispensable.

ACOMPAÑAMIENTO PEPTIQ

Si tu compra incluye un stack $\geq$ \$7,500 MXN, recibes una llamada de protocolo de 30 minutos con un investigador formado en este material. Reviewamos línea base, ajustamos dosis y frecuencia a tu caso, definimos marcadores y check-ins. Si necesitas referencia a clínica especializada, mantenemos un directorio en CDMX, MTY y GDL de médicos y dermatólogos que trabajan con péptidos research-grade.


El concierge se incluye sin costo adicional. La biología es un terreno técnico — no debería

Reconstitución & conservación.


Los péptidos llegan en polvo liofilizado para máxima estabilidad de larga duración. Antes de cada ciclo, se reconstituyen con agua bacteriostática. Siguiendo el protocolo correcto, la solución es estable aproximadamente 28 días refrigerada a 2–8 °C.

PROTOCOLO PASO A PASO

- 01 Lava manos.** Desinfecta el septum del vial liofilizado y del vial de agua bacteriostática con alcohol isopropílico al 70%. Espera 30 segundos a que evapore.
- 02 Carga la jeringa con agua bacteriostática.** Volumen típico: 2 mL por vial de 10 mg (concentración resultante: 5 mg/mL = 5000 µg/mL). Para concentraciones distintas, consulta la calculadora PEPTIQ.
- 03 Inyecta el agua escurriéndola por la pared interna del vial,** no directamente sobre el polvo. Esto previene formación de espuma y agregación.
- 04 Deja reposar 60 segundos. No agites.** Rota el vial suavemente entre las palmas hasta disolución completa. Puede tomar 1–3 minutos.
- 05 Etiqueta con fecha de reconstitución** usando marcador permanente sobre la tapa. Almacena a 2–8 °C en refrigerador (no congelador, no puerta).
- 06 Carga cada dosis** con jeringa de insulina U-100 estéril nueva. Nunca recargues una jeringa usada.



MANEJO ASÉPTICO · TÉCNICA ESTÉRIL
OBLIGATORIA



ERRORES FRECUENTES

Agitar violentamente: rompe estructura terciaria del péptido por estrés mecánico. Siempre rotar, jamás vortex ni shaker.

Usar agua destilada o purificada simple: sin alcohol bencílico al 0.9% no hay conservador, y la contaminación bacteriana aparece en 48–72 horas con eritema en sitio de inyección.

Congelar la solución reconstituida: la cristalización fragmenta el enlace peptídico de manera irreversible. Solo refrigerar entre 2 y 8 °C.

Dejar el vial a temperatura ambiente más de una hora: acelera degradación. Regresar a refrigerador entre dosis.

Mezclar dos péptidos en la misma jeringa para ahorrar pinchazos: incompatibilidades químicas pueden destruir uno o ambos. Cada péptido en su jeringa.

Reutilizar agua bacteriostática: tras múltiples punciones del septum, la esterilidad se compromete. Vial de 3 mL → máximo 10 punciones.

CÁLCULO DE DOSIS · EJEMPLO

Vial: BPC-157 10 mg en polvo liofilizado.

Reconstitución: 2 mL de agua bacteriostática.

Concentración resultante: $10 \text{ mg} \div 2 \text{ mL} = 5 \text{ mg/mL}$
 $= 5000 \mu\text{g/mL}$.

Jeringa de insulina U-100: 100 unidades = 1 mL.
Cada unidad = 0.01 mL = 50 μg .

Dosis objetivo: 250 μg .
 $250 \mu\text{g} \div 50 \mu\text{g/u} = 5 \text{ unidades}$.

Dosis objetivo: 500 μg = 10 unidades.

CALCULADORA ONLINE

peptiqmx.com/calculadora · introduce dosis del vial, agua de reconstitución y dosis objetivo. Devuelve unidades exactas en jeringa U-100. Verifica siempre antes de cualquier protocolo.



CADA LOTE · NFC INTEGRADO · COA PÚBLICO
EN PEPTIQMX.COM

CAPÍTULO VII

Verificación de lote.

Cada caja PEPTIQ incluye un chip NFC bajo el sello holográfico que abre directamente el COA público del lote. Sin app intermediaria, sin proceso de registro.

- 01 Acerca tu teléfono al sello holográfico.** iPhone XS o posterior, Android moderno con NFC habilitado. La URL del COA se abre en navegador.
- 02 Verifica número de lote.** El lote en pantalla debe coincidir exactamente con el impreso en la caja y en cada vial.
- 03 Lee el cromatograma HPLC.** Pico único limpio > 99% de área integrada (péptidos individuales) o > 97% (blends multipéptido).
- 04 Verifica fecha de análisis.** COA emitido en los últimos 12–18 meses. Lotes más antiguos: solicítanos COA fresco antes de uso.
- 05 Cruza con espectrometría de masas.** El peso molecular reportado debe coincidir con el peso teórico del péptido (± 0.5 Da).

Si recibes un lote cuyo COA no carga, no coincide o cuya pureza es inferior al umbral:

peptiqmx.com/garantia-coa reembolsa el lote completo sin discusión.



CAPÍTULO VIII · PARA PROFESIONALES

Programa B2B *clínicas.*

PEPTIQ trabaja con clínicas de medicina estética, longevidad, hormonal y deportiva en CDMX, MTY, GDL, Querétaro, Cancún y Tijuana. Programa transparente, márgenes definidos, soporte clínico real.

MARGEN PARTNER

Pricing mayoreo con descuentos del 15% al 35% según volumen mensual. Margen final clínica concierge al paciente. Factura con IVA, plazos de pago a 30 días sobre catálogo aprobado.

SOPORTE CLÍNICO

Material editorial de marca blanca. Llamadas de protocolo con tu equipo médico cada vez que entra una nueva línea. Templates de consentimiento informado y de tracking objetivo. Acceso a investigador dedicado por WhatsApp en horario laboral extendido.

WHITE-LABEL OPCIONAL

Para clínicas con volumen ≥ 200 viales/mes, ofrecemos línea white-label con tu marca, manteniendo COA Janoshik público bajo el lote correspondiente. Empaque negro mate, holográfico anti-falsificación, NFC integrado.

14

LÍNEAS ACTIVAS

95%+

PUREZA HPLC
GARANTIZADA

24h

CDMX · MTY · GDL

100%

COA PÚBLICO POR
LOTE

Para iniciar conversación con el equipo de partnerships: peptiqmx.com/b2b-clinicas · onboarding de clínica completo en menos de siete días hábiles, incluyendo training inicial al equipo médico, primer pedido demo y configuración de sistema de tracking.



GRACIAS POR LEER · HACK YOUR LIMITS

Pureza que no se declara. *Se verifica.*

Esta guía documenta los protocolos que usan nuestras clínicas partner y nuestros sujetos de investigación. Si llegaste hasta aquí y quieres seguir la conversación, escríbenos por WhatsApp y te mandamos el COA Janoshik del lote vigente que te interese — antes, no después, de tu compra.

[ASESORÍA WHATSAPP →](#)[PEPTIQMX.COM](https://peptiqmx.com)

CATÁLOGO

14 líneas research-grade. Cada lote, COA Janoshik público con verificación NFC.
peptiqmx.com

CLÍNICAS B2B

Programa partner con descuentos 15–35%. Factura con IVA, soporte clínico, white-label desde 200 viales/mes.
peptiqmx.com/b2b-clinicas

CONCIERGE

+52 1 444 577 0445
hola@peptiqmx.com
Instagram · @peptiqmx
Entrega 24h CDMX, MTY, GDL.