


# ESPERANÇA MATEMÁTICA




1

## Esperança Matemática



### Exemplo

Considere uma urna que contém 5 fichas idênticas, numeradas de 1 a 5. As fichas são mexidas de forma aleatória e é retirada uma, sendo registado o seu valor, após o que é novamente introduzida na urna. O jogo é repetido 25 vezes. Qual o valor esperado da soma dos valores registados em cada ficha retirada?



2



## Esperança Matemática

- Probabilidade de sair um número = 1/5
- Soma das 5 fichas = 15
- Valor esperado de uma ficha = 3
- Repetindo o processo 25 vezes, valor esperado da soma dos valores registados em cada ficha retirada é  $25 \cdot 3 = 75$




3



## Esperança Matemática

### Exemplo

Considere o exemplo anterior, agora com as fichas apresentadas na figura. Qual o valor esperado da soma dos valores registados em cada ficha retirada?



4



5



## Esperança Matemática

### Exemplo


No jogo da roleta existem 36 números, inscritos, alternadamente, em casas vermelhas e negras. Além destes 36 números existem ainda duas casas, de cor verde, com 0 e 00 inscritos. Neste jogo existe a possibilidade de apostar na cor negra (18) ou na cor vermelha (18). A ocorrência da cor escolhida dá direito a um prémio igual ao montante apostado. Caso ocorra uma das casas verdes, a banca recolhe tudo o que está em cima das mesas, isto é, nenhuma aposta sai vitoriosa. Suponha que um jogador pode apostar exactamente 1000 unidades monetárias e o decide fazer na cor preta. Calcule o valor esperado do ganho por parte da banca.

6

# Esperança Matemática



## Exemplo



$$E[X] = (-1) \frac{18}{38} + (+1) \frac{20}{38} = \frac{2}{38} = 0.055$$

7

# Valor Esperado



## Definição:

Se o acontecimento cujo resultado é  $X$  for realizado muitas vezes, então a média de todos os resultados será aproximadamente igual a  $E(X)$

8

# Valor Esperado



- Se  $X$  é uma variável aleatória discreta e  $f(x)$  o valor da sua distribuição de probabilidade em  $x$ , o valor esperado da variável aleatória

$$E[X] = \sum_x x f(x)$$

- Se  $X$  é uma variável contínua e  $f(x)$  o valor da sua função densidade de probabilidade em  $x$ , o valor esperado da variável aleatória

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

9

# Valor Esperado



## Exemplo

Um conjunto de 12 televisores contém 2 com defeito. Deste conjunto, 3 são escolhidos aleatoriamente. Quantos televisores com defeito são esperados?

$x$	0	1	2
$f(x)$	$6/11$	$9/22$	$1/22$

$$f(x) = \frac{C_x^2 C_{3-x}^{10}}{C_3^{12}} \quad x = 0, 1, 2$$

$$E[X] = 0 \frac{6}{11} + 1 \frac{9}{22} + 2 \frac{1}{22} = \frac{1}{2}$$

10



## Valor Esperado

- Se  $X$  é uma variável aleatória discreta e  $f(x)$  o valor da sua distribuição de probabilidade em  $x$ , o valor esperado da variável aleatória  $g(X)$  é

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)f(x)$$

- Se  $X$  é uma variável aleatória contínua e  $f(x)$  o valor da sua função densidade de probabilidade em  $x$ , o valor esperado da variável aleatória  $g(X)$  é

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

11



## Propriedades

**1.**  $E[aX + b] = aE[X] + b$      $a, b$  constantes

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad E[aX] = aE[X]$$

$$E[X - Y] = E[X] - E[Y] \quad E[a] = a$$

**2.**  $E\left[\sum_{i=1}^n c_i g_i(X)\right] = \sum_{i=1}^n c_i E[g_i(X)]$      $c_i$  constantes

12



## Variância

- Se  $X$  é uma variável aleatória discreta e  $f(x)$  o valor da sua distribuição de probabilidade em  $x$ , a variância da variável aleatória

$$\sigma^2 = \text{Var}[X] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x)$$

- Se  $X$  é uma variável contínua e  $f(x)$  o valor da função densidade de probabilidade em  $x$ , a variância da variável aleatória

$$\sigma^2 = \text{Var}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

13



## Variância

$$\sigma^2 = \text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = \sum_x (x^2 - 2x\mu + \mu^2) f(x) = \\ &= \sum_x x^2 f(x) - 2\mu \sum_x x f(x) + \mu^2 \sum_x f(x) = \\ &= E[X^2] - 2E[X]E[X] + (E[X])^2 \cdot 1 = \\ &= E[X^2] - (E[X])^2 \text{ c.q.d.} \end{aligned}$$

14



## Propriedades

**1.**  $Var[aX + b] = a^2 Var[X]$      $a, b$  constantes

$$Var[aX] = a^2 Var[X]$$

$$Var[a] = 0$$

**2.**  $Var[X_1 \pm X_2] = Var[X_1] + Var[X_2] \pm 2Cov[X_1, X_2]$

$$Cov[X_1, X_2] = E[(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)] = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2]$$

$Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$  se X e Y são v.a. independentes