

Tópicos de Física Moderna, MIEI

Teste 2: 22 de Maio de 2021

1h, 10 valores

Física Quântica

1. (4.5v) Considere duas partículas no estado quântico

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2}|HH\rangle + \frac{1}{2}|HV\rangle + a|VH\rangle$$

- (a) Determine a constante a de modo a que este estado esteja normalizado.
- (b) Qual a probabilidade de, se efectuar uma medida na primeira partícula, ela dar o valor V ? Que valor obtém para a segunda partícula se fizer uma medida dela logo a seguir?
- (c) Estas partículas estão num estado entrelaçado? Fundamente a resposta.
2. (1v) Qual é o comprimento de onda de de Broglie de uma bala com 100 g de massa que é disparada a uma velocidade de 500 m/s? ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg / s}$)
3. (1v) Considere a seguinte função de onda:

$$\Psi(x, t) = 0.5 \sin(5\pi x - 25\pi t)$$

em que Ψ e x vêm em metros e t em segundos. Indique qual a amplitude da onda, o número de onda angular, o período e o comprimento de onda.

4. (1v) Uma amostra foi criada com 10^{15} isótopos radioactivos que decaem com um tempo de meia vida $t_{1/2} = 3$ minutos. Ao fim de 5 minutos, quantos isótopos radioactivos existem na amostra?
5. (1v) Se o $^{14}_6\text{C}$ decai num processo de decaimento β^- , quais são os produtos do decaimento?
6. (1.5v) Quais são os portadores da interação forte? Qual a principal diferença em relação aos outros portadores de interação?