

Álgebra Linear

para engenharia

M. Lurdes Teixeira
Dep. Matemática
ECUM

1^o semestre de 2024/2025

1

MATRIZES

- Conceitos básicos
- Operações - adição
- Operações - multiplicação por um escalar
- Operações - multiplicação
- Operações - transposição
- Matrizes invertíveis
- Aplicações

2 = 2

	Teste 1	Teste 2	Trabalho	Apresentação
Ana	17	14	15	17
Carlos	13	16	15	12
João	14	14	17	16
Rita	18	12	14	18
Tomás	17	13	15	15

Conceitos básicos

Sabendo o significado de cada linha e de cada coluna, a informação relevante pode ser representada pela seguinte tabela:

$$\begin{bmatrix} 17 & 14 & 15 & 17 \\ 13 & 16 & 15 & 12 \\ 14 & 14 & 17 & 16 \\ 18 & 12 & 14 & 18 \\ 17 & 13 & 15 & 15 \end{bmatrix}$$

A classificação de cada aluno é calculada com base nos seguintes pesos:

peso do trabalho	0.25
peso da exposição	0.15
peso do primeiro teste	0.25
peso do segundo teste	0.35

Como calcular a classificação de cada aluno a partir da tabela?

Veremos a resposta, em termos de operações com matrizes, mais à frente.

Exemplo 2

Considere-se o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} x & -y & -2z & = & 1 \\ 2x & & +2z & = & 1 \\ -x & +2y & & = & 0 \\ & 2y & +z & = & 2 \end{cases} .$$

A informação relevante pode ser armazenada nas seguintes tabelas:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

E o que fazer com as incógnitas? $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

Definição de matriz

Dados $m, n \in \mathbb{N}$, chama-se **matriz de tipo $m \times n$** a uma tabela com m linhas e n colunas, na qual cada posição é preenchida por um número, dito elemento da matriz ou entrada da matriz.

Dados $m, n \in \mathbb{N}$, o conjunto das matrizes de tipo $m \times n$ de entradas reais representa-se por $\mathbb{R}^{m \times n}$.

Alguns autores usam a notação $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Uma grandeza que pode ser caracterizada por um único número é designada por grandeza escalar, pelo que por vezes se fala de um *escalar* para referir um número, que se distingue de um vetor ou de uma matriz que representam grandezas designadas vetoriais.

Neste curso trabalharemos apenas com matrizes de entradas reais e com escalares que são números reais.

Uma matriz pode representar-se de várias formas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = [a_{ij}]_{m \times n}.$$

- $[A]_{ij} = a_{ij} \rightarrow$ elemento da matriz A da linha i e coluna j .
- A linha i da matriz A é $L_i = \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{bmatrix}$.
- A coluna j é $C_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$.
- (a_{11}, \dots, a_{ll}) é a diagonal da matriz A , onde $l = \min\{n, m\}$.

Definição

Duas matrizes A e B são **iguais** se são do mesmo tipo, digamos $m \times n$, e se os elementos são iguais posição a posição, isto é, se $a_{ij} = b_{ij}$, para quaisquer $i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$.

Definições

Seja A uma matriz de tipo $m \times n$. Então,

- a matriz A diz-se uma **matriz quadrada** (de ordem n) se $m = n$;
- sendo A uma matriz quadrada, A diz-se

triangular superior se $a_{ij} = 0$ para qualquer $i > j$
triangular inferior se $a_{ij} = 0$ para qualquer $i < j$;

- se A é uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ caso $i \neq j$, então A diz-se uma **matriz diagonal** e representa-se por **$diag(a_{11}, \dots, a_{nn})$** , isto é,

$$diag(a_{11}, \dots, a_{nn}) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix};$$

- se A é uma matriz diagonal em que $a_{ii} = 1$ para $i \in \{1, \dots, n\}$, então A diz-se a **matriz identidade** e representa-se por **I_n** ;
- se as entradas de A são todas iguais a 0, então A diz-se a **matriz nula** e representa-se por **$0_{m \times n}$** ;

- se $n = 1$, então a matriz diz-se uma **matriz coluna**, ou um **vetor coluna**, ou simplesmente um **vetor**:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1\,1} \\ a_{2\,1} \\ \vdots \\ a_{m\,1} \end{bmatrix} ;$$

- se $m = 1$, então a matriz diz-se uma **matriz linha** ou um **vetor linha**:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \dots & a_{1\,n} \end{bmatrix} .$$

Definição

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ duas matrizes. Define-se a **soma de A com B** como sendo a matriz

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}.$$

Desta forma define-se uma operação binária entre matrizes do mesmo tipo, designada **adição de matrizes**.

Proposição

Se A , B e C matrizes do tipo $m \times n$, então:

- 1 $A + B = B + A$;
- 2 $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- 3 $A + \mathbf{0}_{m \times n} = A$;
- 4 se $A' = [-a_{ij}]_{m \times n}$, então $A + A' = \mathbf{0}_{m \times n}$.

Definição

Se A é uma matriz do tipo $m \times n$, então a matriz $[-a_{ij}]_{m \times n}$ designa-se **a matriz simétrica de A** (i.e., inversa para a operação de adição).

Recordemos o [Exemplo 1](#).

Considere-se a matriz das classificações dos 5 alunos:

$$\begin{bmatrix} 17 & 14 & 15 & 17 \\ 13 & 16 & 15 & 12 \\ 14 & 14 & 17 & 16 \\ 18 & 12 & 14 & 18 \\ 17 & 13 & 15 & 15 \end{bmatrix}$$

Suponhamos que se pretende as classificações numa escala de 0 a 100.

Qual seria a matriz? O que se deveria fazer para obter esse resultado?

$$\begin{bmatrix} 5 \times 17 & 5 \times 14 & 5 \times 15 & 5 \times 17 \\ 5 \times 13 & 5 \times 16 & 5 \times 15 & 5 \times 12 \\ 5 \times 14 & 5 \times 14 & 5 \times 17 & 5 \times 16 \\ 5 \times 18 & 5 \times 12 & 5 \times 14 & 5 \times 18 \\ 5 \times 17 & 5 \times 13 & 5 \times 15 & 5 \times 15 \end{bmatrix} = 5 \cdot \begin{bmatrix} 17 & 14 & 15 & 17 \\ 13 & 16 & 15 & 12 \\ 14 & 14 & 17 & 16 \\ 18 & 12 & 14 & 18 \\ 17 & 13 & 15 & 15 \end{bmatrix}$$

Definição

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ uma matriz e α um número real. Então define-se o **produto da matriz A pelo escalar α** como sendo a matriz

$$\alpha \cdot A = [\alpha a_{ij}]_{m \times n}$$

Desta forma define-se uma operação designada por **multiplicação por um escalar**.

Proposição

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$, A e B matrizes do tipo $m \times n$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Então,

- 1 $(\alpha\beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A);$
- 2 $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A;$
- 3 $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B;$
- 4 $1 \cdot A = A;$
- 5 a matriz $(-1) \cdot A$ é a matriz simétrica de A ;
- 6 $\alpha \cdot \mathbf{0}_{m \times n} = \mathbf{0}_{m \times n};$
- 7 $0 \cdot A = \mathbf{0}_{m \times n}.$

Operações - multiplicação

Voltemos ao **Exemplo 1** e ao problema que ficou em aberto.
Como se calcula a classificação de cada aluno?

	T1	T2	Tr.	Exp.		
Ana	17	14	15	17	$\begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.35 \\ 0.25 \\ 0.15 \end{bmatrix}$	T1
Carlos	13	16	15	12		T2
João	14	14	17	16		Tr.
Rita	18	12	14	18		Exp.
Tomás	17	13	15	15		

$$\text{Ana} \longrightarrow 17 \times 0.25 + 14 \times 0.35 + 15 \times 0.25 + 17 \times 0.15$$

$$\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dots & b_{1j} & \dots \\ \dots & b_{2j} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & b_{nj} & \dots \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = [A \cdot B]_{ij}$$

Definição

Sejam $m, n, p \in \mathbb{N}$, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{n \times p}$ matrizes. Então define-se o **produto de A por B** como sendo a matriz $m \times p$,

$$A \cdot B = \left[\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right] \begin{matrix} i = 1, \dots, m \\ j = 1, \dots, p \end{matrix}$$

Desta forma define-se uma operação entre matrizes designada por **multiplicação de matrizes**.

Proposição

Sejam A , B e C matrizes e α um número. Então:

- ① Se o produto $A \cdot (B \cdot C)$ está definido, então

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C;$$

- ② Se a expressão $A \cdot (B + C)$ está definida, então

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C;$$

- ③ Se a expressão $(A + B) \cdot C$ está definida, então

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C;$$

- ④ Se o produto $A \cdot B$ está definido, então

$$\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B = A \cdot (\alpha \cdot B);$$

- ⑤ Se A é do tipo $m \times n$, então $I_m \cdot A = A$ e $A \cdot I_n = A$.

Definição

Sejam $k, n \in \mathbb{N}$, e A uma matriz quadrada $n \times n$. Então define-se a **potência de ordem k** da matriz quadrada A como sendo o produto de k fatores todos iguais a A .

$$A^k = \underbrace{A \cdot \dots \cdot A}_k$$

A **potência de ordem 0** é

$$A^0 = I_n$$

Desta forma define-se a operação unária, em matrizes quadradas, designada **potenciação de ordem k de matrizes**, para qualquer $k \in \mathbb{N}_0$.

Definição

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ uma matriz. Então, define-se a **transposta** da matriz A como sendo a matriz de tipo $n \times m$, que se representa por A^T , tal que para cada posição

$$[A^T]_{ij} = a_{ji}$$

Desta forma define-se uma operação unária, em matrizes, designada **transposição de matrizes**.

Proposição

Sejam A e B matrizes e α um escalar. Então:

- 1 $(A^T)^T = A$;
- 2 se A e B são do mesmo tipo, $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- 3 $(\alpha \cdot A)^T = \alpha \cdot A^T$;
- 4 se o produto $A \cdot B$ está definido, $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.

Definição

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ uma matriz quadrada. Então diz-se que A é uma **matriz invertível** (ou **não singular**) se existir uma matriz quadrada do mesmo tipo, denotemo-la por X , tal que

$$A \cdot X = X \cdot A = I_n.$$

Uma matriz que não é invertível diz-se **não invertível** (ou **singular**).

Exemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = X \cdot A = I_3$$

Exemplo 4

A matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é não invertível.

$$B \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_{11} + x_{21} & x_{12} + x_{22} & x_{13} + x_{23} \\ x_{21} + x_{31} & x_{22} + x_{32} & x_{23} + x_{33} \\ -x_{11} + x_{31} & -x_{12} + x_{32} & -x_{13} + x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_{11} + x_{21} = 1 \\ x_{12} + x_{22} = 0 \\ x_{13} + x_{23} = 0 \\ x_{21} + x_{31} = 0 \\ x_{22} + x_{32} = 1 \\ x_{23} + x_{33} = 0 \\ -x_{11} + x_{31} = 0 \\ -x_{12} + x_{32} = 0 \\ -x_{13} + x_{33} = 1 \end{cases} \quad \text{que é impossível.}$$

Para simplificar a notação deixarmos de escrever o símbolo \cdot para indicar a multiplicação de matrizes ou a multiplicação por um escalar.

Proposição

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ uma matriz invertível. Então, existe uma e uma só matriz A' que satisfaz as equações matriciais

$$AX = XA = I_n.$$

Definição

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ uma matriz invertível. Então, a solução das equações matriciais $AX = XA = I_n$ diz-se a **matriz inversa** (inversa para a multiplicação) de A e representa-se por A^{-1} .

Proposição


Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ uma matriz quadrada. Se existir uma solução A' para a equação $AX = I_n$, então também $A'A = I_n$.

Proposição

Sejam A e B matrizes invertíveis de ordem $n \in \mathbb{N}$ e α um escalar. Então:

- 1 $(A^{-1})^{-1} = A$;
- 2 AB é invertível e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- 3 A^T é invertível e $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
- 4 se $\alpha \neq 0$, αA é invertível.

Problema 1: Considere-se uma rede de comunicação, em que várias cidades estão ligadas entre si através de uma rede de estradas, (ver figura abaixo). As cidades representam-se por círculos e as vias de comunicação por segmentos de reta.



Pode-se representar esta informação por uma matriz?

Quantos caminhos há de 4 para 1 em duas etapas?

E de 4 para 5 em três etapas?

Matriz adjacência $\rightarrow A = \begin{cases} a_{ij} = 1 & \text{se existe um caminho de } i \text{ para } j \\ a_{ij} = 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

Calcule $[A^2]_{41}$. Calcule $[A^3]_{45}$.

Seja A a uma matriz de adjacência de um grafo com n vértices. Para $k \in \mathbb{N}$, $[A^k]_{ij}$ é o número de caminhos de i para j de comprimento k .