

### 3.4- Primitivação de funções racionais.

Função racional é uma razão de polinómios na mesma variável, ou seja  $\frac{f(x)}{g(x)}$ , onde  $f(x)$  e  $g(x)$  são funções polinomiais.

Uma função racional diz-se *própria* se o grau do polinómio do denominador é maior do que o grau do polinómio do numerador. Caso contrário, diz-se *imprópria*.

Toda a função racional imprópria pode ser escrita como a soma de um polinómio e de uma função racional própria,  $\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{g(x)}$ , onde  $Q(x)$  designa o quociente e  $R(x)$  designa resto da divisão polinomial.

Exemplo:

$$\frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^3 - x} = 1 + \frac{2x^2 + x + 1}{x^3 - x}, \text{ dado que } \begin{array}{r|l} x^3 + 2x^2 + 1 & x^3 - x \\ \hline -x^3 + x & \\ \hline 2x^2 + x + 1 & \end{array}$$

Chama-se fração simples a uma função racional própria do tipo  $\frac{A}{(x-a)^k}$ ,

$a, A \in \mathbb{R}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

Sendo  $\frac{R(x)}{P(x)}$  uma função racional própria, fatorizando o polinómio do denominador  $P(x)$ , obtemos fatores da forma  $(x-a)^\alpha$  correspondentes a raízes reais  $a$  de multiplicidade  $\alpha$  e/ou fatores da forma  $[(x-p)^2 + q^2]^\beta$  correspondentes a raízes complexas  $p \pm iq$  de multiplicidade  $\beta$ .

No caso dos fatores  $(x-a)^\alpha$  correspondentes a raízes reais, podemos escrever a função racional própria  $\frac{R(x)}{P(x)}$  como soma de frações simples, em que cada

fator  $(x-a)^\alpha$  dará origem à soma das  $\alpha$  frações simples

$$\frac{A_1}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_\alpha}{(x-a)},$$

onde  $A_1, A_2, \dots, A_\alpha$  são constantes reais a determinar. Assim, a primitiva da

função racional própria  $\frac{R(x)}{P(x)}$ , resume-se então à soma de primitivas da forma

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \begin{cases} A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1}, & \text{se } k > 1, \\ A \ln|x-a|, & \text{se } k = 1. \end{cases}$$

No caso dos fatores  $[(x-p)^2 + q^2]^\beta$  correspondentes a raízes complexas

$p \pm iq$ , podemos escrever a função racional própria  $\frac{R(x)}{P(x)}$  como soma de

frações, em que cada fator  $[(x-p)^2 + q^2]^\beta$  dará origem à soma das  $\beta$  frações

$$\frac{P_1x + Q_1}{[(x-p)^2 + q^2]^\beta} + \frac{P_2x + Q_2}{[(x-p)^2 + q^2]^{\beta-1}} + \dots + \frac{P_\beta x + Q_\beta}{(x-p)^2 + q^2},$$

onde  $P_1, Q_1, P_2, Q_2, \dots, P_\beta, Q_\beta$ , são constantes reais a determinar.

### Exemplos:

$$1. \int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^3 - x} dx = \int \left( 1 + \frac{2x^2 + x + 1}{x^3 - x} \right) dx = \int 1 dx + \int \frac{2x^2 + x + 1}{x^3 - x} dx = x + \int \frac{2x^2 + x + 1}{x(x^2 - 1)} dx =$$

$$= x + \int \frac{2x^2 + x + 1}{x(x-1)(x+1)} dx = (*)$$

---

$$\frac{2x^2 + x + 1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} \Rightarrow 2x^2 + x + 1 = A(x^2 - 1) + B(x^2 + x) + C(x^2 - x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x^2 + x + 1 = (A + B + C)x^2 + (B - C)x - A \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 2 \\ B - C = 1 \\ -A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} --- \\ --- \\ A = -1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B + C = 3 \\ B - C = 1 \\ 2B = 4 \Rightarrow B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} --- \\ 2 - C = 1 \Rightarrow C = 1 \\ --- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 2 \\ C = 1 \end{cases}$$


---

$$(*) = x + \int \frac{-1}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} dx = x - \ln|x| + 2\ln|x-2| + \ln|x+1| + c.$$

$$2. \int \frac{x^2 + 10x + 5}{x^2(3x^2 - 5)} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x^2 + 10x + 5}{x^2 \left(x - \sqrt{\frac{5}{3}}\right) \left(x + \sqrt{\frac{5}{3}}\right)} dx = (*)$$


---

$$\frac{x^2 + 10x + 5}{x^2 \left(x - \sqrt{\frac{5}{3}}\right) \left(x + \sqrt{\frac{5}{3}}\right)} = \frac{A_1}{x^2} + \frac{A_2}{x} + \frac{B}{x - \sqrt{\frac{5}{3}}} + \frac{C}{x + \sqrt{\frac{5}{3}}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 5 = A_1 \left(x^2 - \frac{5}{3}\right) + A_2 x \left(x^2 - \frac{5}{3}\right) + Bx^2 \left(x + \sqrt{\frac{5}{3}}\right) + Cx^2 \left(x - \sqrt{\frac{5}{3}}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 5 = (A_2 + B + C)x^3 + \left(A_1 + \sqrt{\frac{5}{3}}B - \sqrt{\frac{5}{3}}C\right)x^2 - \frac{5}{3}A_2x - \frac{5}{3}A_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_2 + B + C = 0 \\ A_1 + \sqrt{\frac{5}{3}}B - \sqrt{\frac{5}{3}}C = 1 \\ -\frac{5}{3}A_2 = 10 \\ -\frac{5}{3}A_1 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} --- \\ --- \\ A_2 = -6 \\ A_1 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 6 \\ \sqrt{\frac{5}{3}}B - \sqrt{\frac{5}{3}}C = 4 \\ --- \\ --- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 6 \\ B - C = 4\sqrt{\frac{3}{5}} \\ 2B = 6 + 4\sqrt{\frac{3}{5}} \\ \downarrow \\ B = 3 + 2\sqrt{\frac{3}{5}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C = 6 - B = 3 - 2\sqrt{\frac{3}{5}} \\ --- \\ --- \\ --- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -3 \\ A_2 = -6 \\ B = 3 + 2\sqrt{\frac{3}{5}} \\ C = 6 - B = 3 - 2\sqrt{\frac{3}{5}} \end{cases}$$


---

$$\begin{aligned}
(*) &= \frac{1}{3} \int \left( \frac{-3}{x^2} + \frac{-6}{x} + \frac{3+2\sqrt{\frac{3}{5}}}{x-\sqrt{\frac{5}{3}}} + \frac{3-2\sqrt{\frac{3}{5}}}{x+\sqrt{\frac{5}{3}}} \right) dx = \\
&= \frac{1}{3} \left\{ -3 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} - 6 \ln|x| + \left( 3+2\sqrt{\frac{3}{5}} \right) \ln \left| x - \sqrt{\frac{5}{3}} \right| + \left( 3-2\sqrt{\frac{3}{5}} \right) \ln \left| x + \sqrt{\frac{5}{3}} \right| \right\} + c = \\
&= \frac{1}{x} - 2 \ln|x| + \left( 1 + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} \right) \ln \left| x - \sqrt{\frac{5}{3}} \right| + \left( 1 - \frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} \right) \ln \left| x + \sqrt{\frac{5}{3}} \right| + c.
\end{aligned}$$

3.  $\int \frac{x+3}{x(x^2+1)^2} dx = (*)$

---


$$\frac{x+3}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{P_1x+Q_1}{(x^2+1)^2} + \frac{P_2x+Q_2}{x^2+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+3 = A(x^2+1)^2 + (P_1x+Q_1)x + (P_2x+Q_2)x(x^2+1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+3 = A(x^4+2x^2+1) + (P_1x^2+Q_1x) + (P_2x^4+P_2x^2+Q_2x^3+Q_2x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+3 = (A+P_2)x^4 + Q_2x^3 + (2A+P_1+P_2)x^2 + (Q_1+Q_2)x + A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+P_2=0 \\ Q_2=0 \\ 2A+P_1+P_2=0 \\ Q_1+Q_2=1 \\ A=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=3 \\ P_1=-3 \\ Q_1=1 \\ P_2=-3 \\ Q_2=0 \end{cases}$$


---

$$\begin{aligned}
(*) &= \int \left( \frac{3}{x} + \frac{-3x+1}{(x^2+1)^2} + \frac{-3x}{x^2+1} \right) dx = \int \frac{3}{x} dx + \int \frac{-3x+1}{(x^2+1)^2} dx + \int \frac{-3x}{x^2+1} dx = \\
&= 3 \int \frac{1}{x} dx - 3 \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx + \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx - 3 \int \frac{x}{x^2+1} dx = \\
&= 3 \ln|x| - \frac{3}{2} \int 2x(x^2+1)^{-2} dx + \int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx - \frac{3}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx =
\end{aligned}$$

$$= 3\ln|x| + \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{-1} + \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx - \frac{3}{2}\ln|x^2 + 1| = (**)$$


---

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \frac{1 + x^2 - x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \left[ \frac{1 + x^2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{-x^2}{(x^2 + 1)^2} \right] dx =$$

$$= \int \frac{1}{x^2 + 1} dx - \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = \arctan x - \int \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \cdot \frac{x}{2} dx =$$

$$= \arctan x - \int 2x(x^2 + 1)^{-2} \cdot \frac{x}{2} dx \stackrel{\text{por partes}}{\downarrow} = \arctan x - \left\{ -(x^2 + 1)^{-1} \cdot \frac{x}{2} - \int \left( -(x^2 + 1)^{-1} \cdot \frac{1}{2} \right) dx \right\} =$$

$$\arctan x + (x^2 + 1)^{-1} \cdot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x + \frac{x}{2}(x^2 + 1)^{-1} - \frac{1}{2}\arctan x + c =$$

$$= \frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2}(x^2 + 1)^{-1} + c$$


---

$$(**) = 3\ln|x| + \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{-1} + \frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2}(x^2 + 1)^{-1} - \frac{3}{2}\ln|x^2 + 1| + c =$$

$$= 3\ln|x| + \frac{3+x}{2}(x^2 + 1)^{-1} + \frac{1}{2}\arctan x - \frac{3}{2}\ln|x^2 + 1| + c.$$

4.  $\int \frac{x^2 + 10x + 5}{x^2 \left( x^2 + \frac{5}{3} \right)} dx = (*)$

---

$$\frac{x^2 + 10x + 5}{x^2 \left( x^2 + \frac{5}{3} \right)} = \frac{A_1}{x^2} + \frac{A_2}{x} + \frac{Px + Q}{x^2 + \frac{5}{3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 5 = A_1 \left( x^2 + \frac{5}{3} \right) + A_2 x \left( x^2 + \frac{5}{3} \right) + (Px + Q)x^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 5 = A_1 \left( x^2 + \frac{5}{3} \right) + A_2 \left( x^3 + \frac{5}{3}x \right) + Px^3 + Qx^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x + 5 = (A_2 + P)x^3 + (A_1 + Q)x^2 + \frac{5}{3}A_2x + \frac{5}{3}A_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_2 + P = 0 \\ A_1 + Q = 1 \\ \frac{5}{3} A_2 = 10 \\ \frac{5}{3} A_1 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 3 \\ A_2 = 6 \\ P = -6 \\ Q = -2 \end{cases}$$


---

$$\begin{aligned} (*) &= \int \frac{3}{x^2} + \frac{6}{x} + \frac{-6x + -2}{x^2 + \frac{5}{3}} dx = 3 \int x^{-2} dx + 6 \int \frac{1}{x} dx - 6 \int \frac{x}{x^2 + \frac{5}{3}} dx - 2 \int \frac{1}{x^2 + \frac{5}{3}} dx = \\ &= -3x^{-1} + 6 \ln|x| - 6 \cdot \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + \frac{5}{3}} dx - 2 \cdot \frac{3}{5} \int \frac{1}{\frac{x^2}{5/3} + 1} dx = \\ &= -3x^{-1} + 6 \ln|x| - 3 \ln \left| x^2 + \frac{5}{3} \right| - \frac{6}{5} \sqrt{\frac{5}{3}} \int \frac{\sqrt{3/5}}{\left( \frac{x}{\sqrt{5/3}} \right)^2 + 1} dx = \\ &= -\frac{3}{x} + 6 \ln|x| - 3 \ln \left| x^2 + \frac{5}{3} \right| - 2 \sqrt{\frac{3}{5}} \arctan \frac{x}{\sqrt{5/3}} + c. \end{aligned}$$

### Exercícios propostos:

➤ Calcule as primitivas das seguintes frações racionais:

a)  $\frac{1}{(x-2)(x+2)}$

b)  $\frac{x^4 + 3x^3}{x^2 - 3x + 2}$

c)  $\frac{-x^3 - 5x + 9}{(x-1)^3(x+2)}$

d)  $\frac{x^5 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1}{x(x-1)^2}$

e)  $\frac{x^4}{x^4 - 1}$

f)  $\frac{x^3 + x - 1}{(x^2 + 4)^2}$

g)  $\frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2}$

h)  $\frac{-2}{(x^2 - x)(x^2 + 1)}$

i)  $\frac{1}{x^2(x^2 + 2)}$