

Pontificia Universidad Católica del Perú

Escuela de Posgrado

Análisis Complejo (semana 13)

LAURENT

1. Sea $f_n(z)$ una función analítica en la región U tal que $f_n(z_0) \neq 0$ para todo $z_0 \in U$. Si $f_n(z)$ converge uniformemente en cada compacto de U y $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ para todo $z \in U$, pruebe que $f(z)$ es idénticamente cero o bien $f(z) \neq 0$ para todo $z \in U$.
2. Probar que la serie

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-z}$$

converge para todo z con $\operatorname{Re}(z) > 1$.

3. Desarrollar $\frac{1}{1+z^2}$ en potencias de $(z-1)$
4. Usar la representación en una serie de Taylor para probar que el conjunto de polos de una función definida en una región, no admite un punto de acumulación.
5. Probar que la serie de Laurent de una función $f(z)$ es única
6. Halle la serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{z^2}{z-1} e^{1/z}$$

en cada anillo $0 < |z| < 1$ y $|z| > 1$.

7. Sea $f(z)$ una función analítica en el anillo abierto $D^*(a, r) : 0 < |z-a| < r$ con un polo en a y $g(z)$ una función entera. Probar que $g(f(z))$ tiene un polo en a
8. Sea $f(z)$ una función analítica en el anillo abierto $D^*(a, r) : 0 < |z-a| < r$. Si la imagen $f(D^*)$ está incluida en el semiplano $\operatorname{Im}(z) > 0$, probar que $f(z)$ tienen una singularidad removible en el punto a .

9. Probar que la serie de Laurent de $\frac{1}{e^z - 1}$ en una vecindad de origen tiene la forma

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{B_n}{(2n)!} z^{2n-1}.$$

Probar la regla de recurrencia

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} B_k}{(2k)!(2n-2k+1)!} = \frac{1}{2(2n)!} - \frac{1}{(2n+1)!}$$

y calcule B_1 , B_2 y B_3 .

10. Probar que cualquier función analítica $f(z)$ en el semiplano Π^+ dado por $\operatorname{Im}(z) > 0$ y de periodo 2π admite una expansión de la forma

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inz}, \quad \forall z \in \Pi^+.$$

Halle una expresión integral para los coeficientes c_n .

11. Sea $f(z)$ una función analítica e inyectiva en el disco abierto U . Si el disco cerrado D dado por $|z-a| \leq r$ está incluido en U probar que

$$f^{-1}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{zf'(z)}{f(z)-w} dz$$

para todo $w \in f(D)$

San Miguel, 2020.