

NEXOR – Formulário BITEPLANER para Avaliação Inicial do Cliente pelo Dentista Licenciado:

A **NEXOR** desenvolve pesquisas científicas e dispositivos técnicos personalizados para auxiliar atletas de elite assim como pessoas como você a treinarem com mais **Conforto, Segurança** e obterem mais **Performance, Consistência, Saúde e Longevidade**.

Este formulário é seu primeiro passo para o time de especialistas projetar seu dispositivo personalizado.

Agradecemos sua
confiança,

Equipe NEXOR

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Política de Privacidade

A NEXOR presta serviços de tecnologia e suporte, parte dos dados é tratada em nome dos dentistas e parte, em nome da Nexor, tais como dados de navegação e métricas agregadas.

Marque todas que se aplicam.

☐ Li e concordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme a Política de Privacidade.

Seção 2 – Mandar para “Cadastro de Usuário” para cliente revisar/atualizar informações [apenas algumas informações abertas à visualização dentista selecionado → Seção 2 (informações básicas: nome e profissão), Seção 3 (perfil), Seção 4 (treinamento)]

Seção 3 - Saúde

1. HISTÓRICO MÉDICO GERAL (aberto/editavel para dentista selecionado)

1. Possui algum diagnóstico médico prévio relevante?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim → Quais?
 - Ex.: hipertensão, diabetes, doenças reumatológicas, fibromialgia, transtornos de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, bruxismo, apneia, enxaqueca/cefaleia crônica, etc.

2. Faz uso atual de medicamentos? (Essas informações são necessárias para a segurança do seu tratamento).

- ☐ () Não
- ☐ () Sim → Quais, dosagens e há quanto tempo?
 - Inclui analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ansiolíticos, antidepressivos, medicações para sono, anticonvulsivantes, etc.

3. Já fez uso prolongado (≥ 3 meses) de medicamentos para dor crônica ou sono?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim → Especificar quais, dose e período aproximado:

4. Alguma cirurgia prévia na região de cabeça, pescoço ou coluna?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim → Qual(is) e quando?

5. Histórico de traumas:

- Trauma em face/mandíbula (pancadas, fraturas, luxações):
- Acidentes (trânsito, esportivos, quedas) com impacto em cabeça/pescoço/coluna:

6. Distúrbios do sono (auto-relato):

- Qualidade do sono (0–10):
- Dificuldade para iniciar o sono? () Não () Sim
- Acorda várias vezes à noite? () Não () Sim
- Ronco relatado por terceiros? () Não () Sim
- Pausas respiratórias/apneia relatadas? () Não () Sim
- Ranger ou apertar os dentes dormindo (bruxismo do sono)?
 - () Não
 - () Suspeito / já me falaram
 - () Diagnóstico confirmado

3. HISTÓRICO ODONTOLÓGICO E OROFACIAL

1. Já recebeu algum diagnóstico de **DTM (disfunção temporomandibular)**?

- () Não
- () Sim →

- Ano do primeiro diagnóstico:

- Profissional responsável:

- Tipo de DTM (se informado): () Muscular () Articular () Mista () Não sei

2. Já teve ou tem (assinale tudo que se aplica):

- () Dor na região da ATM (perto do ouvido, à frente da orelha)

- () Dor em têmporas (lateral da cabeça)

- () Dor em mandíbula (queixo, corpo mandibular)

- () Dor na região dos masseteres (bochechas)

- () Dor ou rigidez em pescoço

- () Dor em ombros

- () Desgaste acentuado dos dentes (relatado por dentista)

- () Sensibilidade dentária frequente

- () Sensação de “morder torto” ou mudança na mordida

3. Sintomas articulares específicos de ATM:

- Estalos ou cliques ao abrir/fechar a boca?
 - () Nunca () Ocasionalmente () Frequentes

- Estalos associados à dor? () Sim () Não
 - Sensação de areia/ruído de atrito na ATM? () Não () Sim
 - Travamento para abrir a boca (não conseguir abrir totalmente)?
 - () Nunca
 - () Já ocorreu 1–2 vezes
 - () Ocorre com certa frequência
 - Já ficou com a boca “presa” aberta ou fechada, precisando de ajuda ou manobra para destravar?
 - () Não
 - () Sim → Quantas vezes aproximadamente e em que circunstâncias?
4. Abertura bucal (se o profissional medir em consulta): (apenas editável pelo dentista selecionado)
- Abertura máxima sem dor (mm):
 - Abertura máxima com dor (mm):
 - Desvio da linha média ao abrir? () Não () Sim → para qual lado?
5. Hábitos parafuncionais (vigília – acordado):
- Mordiscar objetos (tampa de caneta, etc.)? () Não () Sim

- Roer unhas? () Não () Sim
- Morder bochechas/lábios? () Não () Sim
- Apoiar o queixo na mão com frequência? () Não () Sim
- Percebe apertar os dentes durante o dia (concentrado, no trabalho, dirigindo, etc.)?
 - () Não
 - () Sim, frequentemente
 - () Tenho dúvida

6. Tratamentos odontológicos prévios relacionados à dor orofacial/ATM:

- Placa miorrelaxante:
 - () Em uso
 - () Já usou no passado
 - () Nunca usou
 - Tipo (se souber): () Placa rígida () Placa macia () Não sei
- Fisioterapia para ATM/dor orofacial: () Não () Sim → período aproximado:
- Fonoaudiologia voltada para ATM/mastigação/fala: () Não () Sim

- Infiltrações / Toxina botulínica em músculos mastigatórios: () Não () Sim
- Cirurgia de ATM: () Não () Sim → qual técnica e quando?
- Outros tratamentos (laser, acupuntura, etc.):

7. Grau de satisfação com tratamentos anteriores (0–10):

- Com tratamento odontológico:
- Com fisioterapia/fono/terapias complementares:
- Comentário sobre o que ajudou mais / menos:

8. Usa atualmente ou usou anteriormente algum tipo de aparelho para ortodôntico? * tratamento

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Uso atualmente
- ☐ Nunca usei
- ☐ Usei no passado, mas não uso mais atualmente

9. Usa atualmente algum tipo de prótese ou elemento dentário? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Prótese sobre implante
- ☐ Dentadura
- ☐ Ponte
- ☐ Coroa
- ☐ Lente cerâmica
- ☐ Lente de resina
- ☐
- ☐

Não uso Outro:

10. Você já possui dentista da sua confiança para acompanhamento geral? * (não visível ao dentista licenciado selecionado)

(Se sim, indique a cidade e o bairro onde ele atende)

4. SINTOMAS ATUAIS – DOR OROFACIAL, CERVICAL E IMPACTO FUNCIONAL

4.1. Dor orofacial e cervical

1. Presença de dor atualmente:

- ☐ () Não
- ☐ () Sim

2. Localização da dor (pode marcar mais de uma):

- ☐ () Região do ouvido / frente à orelha (ATM)
- ☐ () Têmporas

- () Mandíbula (região anterior / lateral / posterior)
- () Região masseter (bochechas)
- () Pescoço
- () Ombros
- () Outros (especificar):

3. Padrão da dor:

- Início (há quanto tempo?):
- A dor começou associada a algum evento específico?
 - () Início espontâneo
 - () Após trauma
 - () Após aumento de carga de treino
 - () Após período de estresse intenso
 - () Outro:
- Frequência:
 - () Diária

- ☐ () Algumas vezes por semana
- ☐ () Algumas vezes por mês
- ☐ () Episódica / esporádica
- Duração média de cada episódio:
- Horário mais frequente:
 - ☐ () Ao acordar
 - ☐ () Durante o dia
 - ☐ () Final do dia
 - ☐ () Durante/ logo após o treino
- Tipo de dor (assinale):
 - ☐ () Peso
 - ☐ () Aperto
 - ☐ () Pontada

- () Queimação
- () Choque
- () Dor em pressão
- () Outro:

4. Intensidade da dor:

Escala linear de 0 a 10, sendo:

0 = "Nenhuma dor" 10 = "Muita dor"

- Dor média na última semana:
- Pior dor na última semana:
- Dor em repouso:
- Dor durante treino de força:
- Dor ao acordar:

5. Fatores que pioram a dor (assinale):

- () Treinos pesados / levantamento de cargas
- () Próximo da falha muscular / exaustão
- () Mastigação de alimentos duros

- ☐ () Mastigar de um lado só
- ☐ () Falar muito / cantar
- ☐ () Bocejar
- ☐ () Estresse emocional
- ☐ () Ansiedade
- ☐ () Sono ruim / dormir pouco
- ☐ () Postura prolongada (computador, celular)
- ☐ () Outros:

6. Fatores que aliviam a dor:

- ☐ () Medicação
- ☐ () Massagem
- ☐ () Calor local
- ☐ () Frio local
- ☐ () Redução da carga de treino
- ☐ () Placa / protetor bucal
- ☐ () Pausa no treino

- () Outros:

4.2. Função mandibular

1. Sente dificuldade para abrir a boca completamente?

- () Não
- () Sim →
 - () Limitação de abertura
 - () Travamento
 - () Desvio ao abrir

2. Sente dor ou desconforto ao:

- Mastigar? () Não () Sim
- Falar muito? () Não () Sim
- Bocejar? () Não () Sim
- Rir ou cantar? () Não () Sim
- Mastigar alimentos mais duros (carne, castanhas, etc.)? () Não () Sim

3. Sente cansaço na mandíbula ao falar, mastigar ou treinar?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim, leve
- ☐ () Sim, moderado
- ☐ () Sim, intenso

4. Percepção de estalos/cliques na ATM:

- ☐ () Nunca
- ☐ () Ocasionalmente
- ☐ () Frequentes
- ☐ Estalos associados à dor? () Sim () Não

5. Sente sensação de “encaixe errado” da mordida ou mudança recente na oclusão?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim → há quanto tempo aproximadamente?

4.3. Impacto na performance e no treino

1. Relata apertar os dentes durante os treinos?

- ☐ () Não
- ☐ () Sim, percebo conscientemente
- ☐ () Não percebo, mas já me falaram / vejo em vídeos
- ☐ () Tenho dúvida

2. Em quais momentos do treino sente maior tensão em mandíbula/pescoço?

- ☐ () Próximo da exaustão/falha muscular
- ☐ () Em grandes levantamentos (agachamento, levantamento terra, supino, etc.)
- ☐ () Em exercícios específicos (quais?):
- ☐ () Em treinos de alta intensidade (HIIT, crossfit, etc.)
- ☐ () Em todo o treino

3. Já precisou interromper ou reduzir treino por dor em mandíbula/pescoço/cabeça?

- ☐ () Nunca
- ☐ () Algumas vezes ao mês
- ☐ () Quase toda semana
- ☐ () Em praticamente todos os treinos

4. Em uma escala de 0–10, quanto a dor ou desconforto orofacial/cervical impacta:

Escala linear de 0 a 10, sendo:
0 = "Nenhuma dor" 10 = "Muita dor"

- ☐ Seu desempenho no treino:
 - ☐ Sua motivação para treinar:
 - ☐ Sua constância / frequência de treino:
5. Nos últimos 3 meses, quantos treinos você estima ter perdido por causa de dor em mandíbula, cabeça ou pescoço?
- ☐ () Nenhum
 - ☐ () 1–3
 - ☐ () 4–8
 - ☐ () > 8

5. HÁBITOS DE VIDA (Essas informações ajudam a entender fatores que podem influenciar sua dor e performance)

1. Nicotina:

- ☐ () Não fuma
- ☐ () Fuma esporadicamente
- ☐ () Fuma diariamente → quantidade/dia:

2. Álcool:

- Frequência de consumo:
- Padrão principal: () Nenhum () Social leve () Moderado () Alto

3. Cafeína / Estimulantes (café, pré-treino, energéticos):

- Dose diária aproximada (xícaras / latas):
- Horário de maior consumo (manhã, tarde, noite):

4. Nível de estresse percebido (0–10):

5. Sono:

- Horas médias de sono/noite:
- Qualidade subjetiva do sono (0–10):

6. Posição de trabalho predominante:

- () Sentado várias horas (computador, escritório, etc.)
- () Em pé
- () Misto
- () Trabalho físico pesado

Seção 4 - Sobre a **NEXOR** e o dispositivo bucal **BITEPLANER** – caso usuário novo

1. Como conheceu inicialmente o dispositivo bucal **BITEPLANER** da NEXOR? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Através de um amigo / conhecido
- ☐ Através do instrutor da academia
- ☐ Através do personal trainer
- ☐ Através do treinador
- ☐ Através do fisioterapeuta
- ☐ Através do médico
- ☐ Através do dentista
- ☐ Através da academia / clube / instituto / centro de treinamento
- ☐ Através de visita do representante NEXOR /palestra na academia
- ☐ Através do representante NEXOR / palestra em um evento esportivo
- ☐ Através de material promocional NEXOR | BITEPLANER
- ☐ Através de redes sociais
- ☐ Através de mensagem (WhatsApp, Telegram etc)
- ☐
- ☐

Através de e-mail marketing

Através de pesquisa na Internet

Outro:

2. Motivação inicial para buscar o BITEPLANER:

- ☐ () Prevenção
- ☐ () Performance
- ☐ () Curiosidade
- ☐ () Recomendação de terceiros
- ☐ () Dor
- ☐ () Outros:

3. O que achou da proposta inicial do dispositivo bucal personalizado* **BITEPLANER** da NEXOR?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Muito	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Muito boa!

4. O que MAIS te interessou na proposta do dispositivo bucal **BITEPLANER** *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Aumento de PERFORMANCE durante a atividade física / esporte
- ☐ SEGURANÇA dos dentes durante atividade física / esporte
- ☐ SEGURANÇA da ATM (Articulação Temporomandibular) durante atividade física / esporte
- ☐ CONFORTO da articulação durante o esforço
- ☐ BEM ESTAR da articulação pós atividade física / esporte
- ☐ PREVENÇÃO de problemas dentais durante atividade física / esporte
- ☐
- ☐ Outro:

PREVENÇÃO de problemas na ATM (Articulação Temporomandibular)

5. Expectativa com o uso de um dispositivo bucal durante o treino:

- ☐ () Redução de dor
- ☐ () Prevenção de lesões
- ☐ () Melhorar performance (carga, estabilidade, foco)
- ☐ () Evitar interrupções nos treinos
- ☐ () Melhor controle de apertamento mandibular
- ☐ () Outros:

6. Barreiras imaginadas ao uso de um dispositivo bucal:

- ☐ () Desconforto
- ☐ () Prejuízo na respiração
- ☐ () Prejuízo na fala
- ☐ () Aparência / estética
- ☐ () Custo
- ☐ () Dúvida sobre eficácia
- ☐ () Medo de engasgar / soltar durante o treino
- ☐ () Outros:

Seção 4 - Sobre a **NEXOR** e o dispositivo bucal **BITEPLANER** – caso já usuário do dispositivo (aberto a visualização do dentista selecionado)

USO DO BITEPLANER (essas questões ajudam a alinharmos expectativas do uso e desempenho):

(Preencher apenas se o cliente já utiliza o **BITEPLANER**.)

1. Tempo de uso:

- ☐ Data de início de uso: (pré-preenchido dados sistema não editável)
- ☐ Média de sessões/semana em que utiliza o BITEPLANER:

2. Tempo de uso por sessão de treino:

- ☐ Em todo o treino
- ☐ Somente em exercícios específicos (quais?)
- ☐ Somente nas séries mais pesadas

3. Adaptação inicial: (aberto à edição do dentista selecionado)

- Teve desconforto inicial? ☐ Não ☐ Sim →

- Tipo de desconforto:

- ☐ Aumento de salivação
- ☐ Dificuldade de fala
- ☐ Náusea / ânsia
- ☐ Pressão em dentes específicos
- ☐ Irritação em gengiva/mucosa
- ☐ Outro:
- Tempo até sentir-se confortável (dias/semanas):

4. Percepção de mudanças com uso do BITEPLANER: (aberto à edição do dentista selecionado)

- Dor média antes do uso (0–10):

Escala linear de 0 a 10, sendo:

0 = "Nenhuma dor" 10 = "Muita dor"

- Dor média após X semanas de uso (0–10):

Escala linear de 0 a 10, sendo:

0 = "Nenhuma dor" 10 = "Muita dor"

- Redução de episódios de dor:

- () Nenhuma

- () Leve

- () Moderada

- () Intensa

- Impacto no desempenho percebido:

- () Sinto mais estabilidade / segurança nos levantamentos

- () Melhora na concentração

- () Menos pausas ou interrupções por dor

- () Não percebo diferença

- () Percebo piora (descrever):

5. Adesão e conforto:

- Conforto geral com o BITEPLANER (0–10):

- Facilidade de uso (colocar/retirar, transportar) (0–10):
- Facilidade de limpeza (0–10):
- Frequência de uso em treinos de alta intensidade:
 - () Em quase todos os treinos
 - () Em mais da metade
 - () Em menos da metade
 - () Raramente
- Incidência de feridas, irritações ou pontos de pressão? (aberto à edição do dentista selecionado)
 - () Não
 - () Sim → Localização e intensidade:

6. Ajustes necessários:

- Já precisou de ajustes no BITEPLANER? () Não () Sim →
- Tipo de ajuste (espessura, forma, retenção, conforto, etc.): (aberto à edição do dentista selecionado)

7. Feedback aberto para P&D da NEXOR:

- O que mais gosta no BITEPLANER?
- O que menos gosta?
- Que melhorias gostaria de ver (forma, material, integração com app, sensores, etc.)?

Seção 5 – Feedback Final

8. Tem alguma dúvida, preocupação ou sugestão que não perguntamos? (Não inclua dados pessoais de outras pessoas neste campo)

Opcional - Campo aberto para o que você desejar falar

Seção 6 - Final: Mensagem de Encerramento

Agradecemos sua disponibilidade e confiança.

Conte conosco,
Equipe **NEXOR**