

Apuntes de Lógica Matemática

Saúl Rodríguez Martín
Miguel Muñoz Pérez
Eduardo González Vaquero

27 de marzo de 2020

Índice general

1. Lógica proposicional	1
1.1. Introducción	1
1.2. Inducción estructural y recursión	4
1.3. Eliminación de paréntesis	6
1.4. Asignaciones de verdad	7
1.5. Equivalencia lógica	12
1.6. Sustitución	14
1.7. Completitud funcional	17
1.8. Método de los <i>tableaux</i>	20
1.8.1. Nociones básicas y ejemplos	21
1.8.2. Corrección	29
1.8.3. Completitud	31
2. Lógica de primer orden	34
2.1. Introducción	34
2.2. Inducción estructural y recursión	37
2.3. Variables libres y ligadas	39
2.4. Álgebras e interpretaciones	40
2.4.1. Axiomas de Peano	45
2.5. Sustitución	45
2.6. Lema de coincidencia	47
2.7. Isomorfía	50
2.8. Lema de sustitución	52
2.9. Equivalencia lógica	54
2.10. Método de los <i>tableaux</i>	59
2.10.1. Nociones básicas y ejemplos	59
2.10.2. Corrección	64
2.10.3. Completitud	68

1 | Lógica proposicional

1.1. Introducción

Antes de comenzar con definiciones rigurosas, conviene dar una breve explicación sobre la motivación de la lógica proposicional, a la que dedicaremos este capítulo. Un aspecto común de los lenguajes naturales (como el español o el chino) es la ambigüedad de ciertas expresiones, lo cual dificulta las intenciones usuales de la ciencia, a saber, la precisión en la comunicación y la distinción clara de aquello que se comunica. De aquí nace una necesidad evidente, que es cubierta por los lenguajes artificiales y, entre ellos, la lógica formal.

Debemos aclarar entonces cuál es nuestro objeto de estudio. Fijémonos en lo siguiente: existen ciertos elementos del lenguaje que no cambian si los traducimos a otro idioma, por ejemplo. Nos referimos a lo que se denomina como *conectivas lógicas*, es decir, ‘no’ (negación), ‘o’ (disyunción), ‘y’ (conjunción), ‘si... entonces’ (implicación material) y ‘si y solo si’ (equivalencia). Obviamente, podemos usar múltiples expresiones distintas para referirnos a cada una de ellas, pero su función en el lenguaje natural no cambia. Por esto mismo podemos formalizarlas y estudiarlas desde el punto de vista matemático.

Ahora bien, a fin de sistematizar nuestro lenguaje, introducimos una serie de símbolos que se referirán a las entidades correspondientes del lenguaje natural. Conviene puntualizar de nuevo que estas traducciones, es decir, estas ‘asignaciones de significados’ *no* son únicas. Esto lo veremos más adelante. Entonces tenemos: \neg (negación), \vee (disyunción), \wedge (conjunción), \rightarrow (implicación material) y \leftrightarrow (equivalencia).

Los otros elementos básicos que constituirán nuestro lenguaje formal son las *proposiciones*. Con el fin de no entrar en cuestiones semánticas que exceden nuestro estudio, establecemos la siguiente:

Definición 1.1. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso.

Como con las conectivas, introducimos una serie de *símbolos de proposición* para referirnos formalmente a las proposiciones. Denotamos por SP al conjunto

de todos estos símbolos.

Así, el enunciado ‘Todos los solteros son hombres no casados’ es una proposición, mientras que ‘¿Va a llover mañana?’ no lo es. Por otro lado, ‘César conquistó las Galias y combatió contra Vercingétorix’ admite una descomposición como conjunción de dos proposiciones. Evidentemente, esta reducción a proposiciones más simples tiene que parar eventualmente; así llegamos a lo que denominamos *proposiciones atómicas*. Esto nos permitirá, una vez determinada la verdad o falsedad de estas proposiciones atómicas, hallar la de todas las proposiciones que se compongan de ellas mediante la aplicación de las conectivas lógicas (antiguamente llamadas *proposiciones moleculares*).

Las proposiciones atómicas se representan entonces por los elementos de SP . Añadimos, por motivos que serán aclarados más adelante, dos elementos \top y \perp , que se refieren a la *proposición idénticamente verdadera* y a la *proposición idénticamente falsa*, respectivamente¹. Es decir,

Definición 1.2. Definimos el conjunto de las proposiciones atómicas como:

$$AT := SP \cup \{\top, \perp\}$$

Definición 1.3. (Alfabeto) Dado un conjunto de símbolos de proposiciones SP , se denomina alfabeto a:

$$A_{SP} = SP \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,), \top, \perp\},$$

obtenido añadiendo a SP los símbolos \top y \perp , las conectivas lógicas $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, y los paréntesis, $(,)$.

Definición 1.4. (Cierre de Kleene) Dado un conjunto de símbolos A , definimos el cierre de Kleene de A , A^* , como el conjunto de las concatenaciones de elementos de A junto con ϵ , el *espacio vacío* o en blanco.

Ejemplo 1.5. Dado $A = \{a, b\}$, le corresponde

$$A^* = \{\epsilon, a, b, ab, ba, aab, baa, aba, \dots\}$$

Ejemplo 1.6. A_{SP}^* será el conjunto de todas las concatenaciones de elementos de A_{SP} , junto con ϵ .

Una vez que disponemos de los elementos básicos de la sintaxis del lenguaje y sus sucesivas combinaciones, nos interesa definir las expresiones que están ‘bien formadas’, es decir, queremos excluir de nuestro lenguaje concatenaciones de símbolos como ‘)) $\leftrightarrow \varphi$ ’.

Definición 1.7. (Proposiciones posibles) Se define el conjunto de proposiciones posibles, $PROP_{SP}$, como la intersección de todos los subconjuntos de A_{SP}^* que verifican:

¹En realidad, como veremos, al igual que $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ y \leftrightarrow son conectivas binarias, \top y \perp pueden considerarse conectivas 0-arias.

1. $SP \subseteq PROP_{SP}$.
2. Si $\phi \in PROP_{SP}$, entonces $(\neg\phi) \in PROP_{SP}$.
3. Si $\phi_1, \phi_2 \in PROP_{SP}$ y $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, entonces $(\phi_1 \square \phi_2) \in PROP_{SP}$.

Es fácil comprobar que $PROP_{SP}$ también cumple estas tres propiedades, por tanto decimos que es el mínimo subconjunto que las verifica. También podemos obtener $PROP_{SP}$ de forma constructiva:

Proposición 1.8. *Se define $P_0 := AT$ y para cada $n \in \mathbb{N}$:*

$$P_n := P_{n-1} \cup \{(\neg\phi) : \phi \in P_{n-1}\} \cup \{(\phi_1 \square \phi_2) : \phi_1, \phi_2 \in P_{n-1}, \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}\}.$$

Entonces $P := \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n$ coincide con $PROP_{SP}$.

Demostración. Comenzamos comprobando $P \subseteq PROP_{SP}$. Para ello, comprobamos por inducción que $P_n \subseteq PROP_{SP}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Está claro que $P_0 \subseteq PROP_{SP}$, ya que $PROP_{SP}$ cumple la propiedad 1. Ahora, suponiendo que $P_n \subseteq PROP_{SP}$, por las propiedades 2 y 3, $\{(\neg\phi) : \phi \in P_{n-1}\} \cup \{(\phi_1 \square \phi_2) : \phi_1, \phi_2 \in P_{n-1}, \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}\}$ también estarán contenidos en $PROP_{SP}$. Por tanto, $P_{n+1} \subseteq PROP_{SP}$, y hemos acabado la inducción.

Veamos ahora que $PROP_{SP} \subseteq P$. Para ello nos basta comprobar que P cumple las tres propiedades de la definición 1.7. La propiedad 1 es directa, pasamos a comprobar las propiedades 2 y 3.

Dado $\varphi \in P$, existe $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ tal que $\varphi \in P_n$ luego $(\neg\varphi) \in P_{n+1}$ por lo que $(\neg\varphi) \in P$.

Sean $\varphi_1, \varphi_2 \in P$ y sea $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$. Tomamos $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_1, \varphi_2 \in P_n$ (para cada uno existe al menos un natural: basta tomar el mayor). Luego $(\varphi_1 \square \varphi_2) \in P_{n+1}$ y por lo tanto también pertenece a P .

□

A partir de ahora, usaremos para mayor brevedad el símbolo \square como intercambiabile por $\wedge, \vee, \rightarrow$ o \leftrightarrow a no ser que se indique lo contrario.

Básicamente, el resultado anterior nos dice que podemos construir cualquier proposición partiendo de proposiciones atómicas y creando proposiciones más complicadas a partir de ellas usando las conectivas. Esta forma de verlo da lugar al siguiente concepto:

Definición 1.9. (Secuencia de formación) Definimos una *secuencia de formación* para cierto $\varphi \in A_{SP}^*$ como una sucesión finita $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ de elementos de A_{SP}^* tal que $\varphi_n = \varphi$ y para cada $i \leq n$, se da alguna de estas tres opciones:

- $\varphi_i \in AT$.
- $\varphi_i = (\neg\varphi_j)$, para cierto $j < i$.
- $\varphi_i = (\varphi_j \Box \varphi_k)$, para ciertos $j, k < i$.

Como veremos en los ejercicios, toda proposición puede construirse mediante una secuencia de formación, y recíprocamente si φ tiene una secuencia de formación, entonces $\varphi \in PROP_{SP}$.

1.2. Inducción estructural y recursión

Análogamente al método de inducción en los naturales, el método de inducción estructural nos servirá para demostrar que todas las fórmulas cumplen una *propiedad*² en dos pasos: demostrar que todas las proposiciones atómicas cumplen dicha propiedad, y demostrar que si dos proposiciones φ_1, φ_2 cumplen una propiedad, entonces $(\neg\varphi_1)$ y $(\varphi_1 \Box \varphi_2)$ también la cumplen.

Proposición 1.10. (*Inducción estructural*) Supongamos que queremos probar $P(\varphi)$ ³ para todo $\varphi \in PROP_{SP}$ (siendo P una propiedad cualquiera). Entonces basta comprobar que:

1. $P(\varphi)$ para toda $\varphi \in AT$.
2. Si $P(\varphi)$ entonces $P((\neg\varphi))$.
3. Si $P(\varphi_1)$ y $P(\varphi_2)$ entonces $P((\varphi_1 \Box \varphi_2))$.

Demostración. Si una propiedad P cumple 1, 2 y 3, entonces el conjunto de proposiciones que cumplen P cumple las tres propiedades de 1.7, por tanto contiene a $PROP_{SP}$. □

Ejemplo 1.11. Definamos $P(\varphi)$ como la propiedad de $|\varphi|_) = |\varphi|_()$, siendo $|\varphi|_)$ el número de símbolos $)$ en la fórmula φ y $|\varphi|_()$ el número de $($ ⁴. Vamos a comprobar por inducción estructural que todas las proposiciones cumplen esta propiedad:

1. Para cualquier $\varphi \in AT$ se verifica trivialmente $|\varphi|_() = |\varphi|_() = 0$, luego $P(\varphi)$.
2. Supongamos $P(\varphi)$ con $\varphi \in PROP_{SP}$, entonces $|\varphi|_() = |\varphi|_()$ y por tanto:

$$|(\neg\varphi)|_() = |\varphi|_() + 1 = |\varphi|_() + 1 = |(\neg\varphi)|_()$$

luego $P((\neg\varphi))$.

²No hemos definido rigurosamente el concepto de "propiedad", pero esencialmente significa algo que las proposiciones pueden cumplir o no. Una forma rigurosa de definir propiedad consiste en definirla como un subconjunto $P \subseteq PROP_{SP}$, de modo que decimos que una proposición cumple la propiedad P si y solo si pertenece a P .

³Usamos la notación $P(\varphi)$ para decir que la fórmula φ cumple la propiedad p .

⁴En general, siendo $*$ un símbolo, podemos denotar $|\varphi|_*$ al número de símbolos $*$ en la fórmula φ .

3. Supongamos $P(\varphi), P(\psi)$ con $\varphi, \psi \in PROP_{SP}$, entonces:

$$|(\varphi \Box \psi)|_{\zeta} = |\varphi|_{\zeta} + |\psi|_{\zeta} + 1 = |\varphi|_{\zeta} + |\psi|_{\zeta} + 1 = |(\varphi \Box \psi)|_{\zeta}$$

luego $P((\varphi \Box \psi))$.

Definición 1.12. (Prefijos) Sea A un alfabeto y sea $w \in A^*$. Decimos que w' es prefijo de w si existe w'' tal que $w = w'w''$, es decir, si $w = w_1w_2...w_n$ entonces existe $0 \leq k \leq n$ tal que $w' = w_1...w_k$.

Decimos además que un prefijo w' es prefijo propio de w si es distinto de w y ϵ .

Ejemplo 1.13. Sea $A := \{a, b\}$ y sea $w := aababb$. Entonces sus prefijos son $\epsilon, a, aa, aab, aaba, aabab, aababb$, correspondientes a $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, respectivamente, y sus prefijos propios son $a, aa, aab, aaba, aabab$.

Proposición 1.14. Si φ' es prefijo propio de φ , entonces $|\varphi'|_{\zeta} < |\varphi|_{\zeta}$.

Demostración. Se demuestra por inducción estructural.

1. Si $\varphi \in AT$ no tiene prefijos propios luego se cumple la afirmación.
2. Sea $\varphi \in PROP_{SP}$ cumpliendo la propiedad del enunciado y sea φ' un prefijo propio de $(\neg\varphi)$. Existen cuatro casos:

- a) $\varphi' = ($, entonces $|\varphi'|_{\zeta} = 1 > 0 = |\varphi'|_{\zeta}$ -
- b) $\varphi' = (\neg$, ocurre lo mismo que antes.
- c) $\varphi' = (\neg\varphi''$ con φ'' prefijo propio de φ entonces por inducción se verifica $|\varphi''|_{\zeta} < |\varphi|_{\zeta}$. Ahora bien, $|\varphi'|_{\zeta} = |\varphi''|_{\zeta} + 1$ y $|\varphi'|_{\zeta} = |\varphi''|_{\zeta}$ luego:

$$|\varphi'|_{\zeta} < |\varphi'|_{\zeta}$$

- d) $\varphi' = (\neg\varphi$, que es directo.

3. Se hace de forma similar al apartado anterior. Basta probar con los prefijos $(, (\varphi'_1, (\varphi_1, (\varphi_1 \Box, (\varphi_1 \Box \varphi'_2$ y $(\varphi_1 \Box \varphi_2$.

□

En próximas secciones será útil, dado un conjunto A , definir una función $H : PROP_{SP} \rightarrow A$ conociendo su restricción a AT , y suponiendo que podemos calcular $H((\neg\varphi))$ y $H((\varphi \Box \psi))$ en función de $H(\varphi)$ y $H(\psi)$. Si la función H queda bien definida así, diremos que está *definida de forma recursiva*. La siguiente proposición nos garantiza que podemos definir funciones de esta forma:

Proposición 1.15. El esquema de definición recursiva da como resultado una única función, es decir, dadas:

1. $H_{AT} : AT \rightarrow A$.
2. $H_{\neg} : A \rightarrow A$.

$$3. H_{\square} : A \times A \rightarrow A.$$

existe una única función $H : PROP_{SP} \rightarrow A$ tal que:

1. $H(\varphi) = H_{AT}(\varphi)$, para toda $\varphi \in AT$.
2. $H((\neg\varphi)) = H_{\neg}(H(\varphi))$.
3. $H((\varphi_1 \square \varphi_2)) = H_{\square}(H(\varphi_1), H(\varphi_2))$, para cada $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

Demostración. Se omite la demostración. \square

Ejemplo 1.16. Sea $H : PROP_{SP} \rightarrow \mathbb{N}$ la función $|\cdot|_{\square}$ definida anteriormente. Podemos definirla de manera recursiva:

1. $H(\varphi) = 0$, para toda $\varphi \in AT$.
2. $H((\neg\varphi)) = H(\varphi) + 1$.
3. $H((\varphi_1 \square \varphi_2)) = H(\varphi_1) + H(\varphi_2) + 1$.

Nótese como en ocasiones omitimos las funciones auxiliares y usamos la notación H para referirnos a H , H_{AT} , H_{\neg} y H_{\square} . Este abuso de notación no suele dar lugar a confusión.

Ejemplo 1.17. Podemos definir recursivamente una función que nos lleve cada fórmula al conjunto de todas sus subfórmulas, es decir, $SUB : PROP_{SP} \rightarrow \mathcal{P}(PROP_{SP})^5$ tal que:

1. $SUB(\varphi) = \{\varphi\}$, para toda $\varphi \in AT$.
2. $SUB((\neg\varphi)) = SUB(\varphi) \cup \{(\neg\varphi)\}$.
3. $SUB((\varphi_1 \square \varphi_2)) = SUB(\varphi_1) \cup SUB(\varphi_2) \cup \{(\varphi_1 \square \varphi_2)\}$.

1.3. Eliminación de paréntesis

Para conseguir una notación más compacta, podemos establecer una notación que use menos paréntesis cuando nos convenga. Sin embargo, la omisión de paréntesis puede dar lugar a ambigüedades en las fórmulas, por ejemplo,

$$p \rightarrow q \rightarrow r$$

podría simbolizar dos fórmulas distintas:

- $((p \rightarrow q) \rightarrow r)$
- $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

⁵Dado un conjunto X , denotamos por $\mathcal{P}(X)$ a su potencia, es decir, el conjunto de subconjuntos de X .

Para evitar este tipo de situaciones, necesitamos las siguientes reglas de omisión de paréntesis:

1. Los paréntesis externos pueden omitirse. Esto no da lugar a ambigüedad.
2. Las conectivas se aplicarán en este orden: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
3. Cuando hay varias conectivas del mismo tipo seguidas, se asocia siempre por la izquierda.

Algunos ejemplos de aplicación de estas reglas:

$$\begin{array}{ll}
\neg p \vee p & \text{es} \quad ((\neg p) \vee p) \\
\neg p \wedge q \vee s \rightarrow t \leftrightarrow r & \text{es} \quad (((((\neg p) \wedge q) \vee s) \rightarrow t) \leftrightarrow r) \\
p \rightarrow q \rightarrow s & \text{es} \quad ((p \rightarrow q) \rightarrow s) \\
p \wedge q \leftrightarrow \neg s \rightarrow t \vee r & \text{es} \quad ((p \wedge q) \leftrightarrow ((\neg s) \rightarrow (t \vee r))) \\
t \leftrightarrow p \rightarrow \neg q \vee p \rightarrow s & \text{es} \quad (t \leftrightarrow ((p \rightarrow ((\neg q) \vee p)) \rightarrow s))
\end{array}$$

Comprobaremos que las conectivas \wedge y \vee son asociativas y conmutativas, por tanto, en ese sentido, no importa el orden en que se asocien. De modo que, cuando una conectiva se repita varias veces seguidas, podemos usar la siguiente notación:

$$\begin{aligned}
\bigwedge_{i \in I} p_i &:= p_{i_1} \wedge \cdots \wedge p_{i_n} \\
\bigvee_{i \in I} p_i &:= p_{i_1} \vee \cdots \vee p_{i_n},
\end{aligned}$$

siendo $I = \{i_1, \dots, i_n\}$ un conjunto finito de índices. Establecemos además el siguiente convenio,

$$\begin{aligned}
\bigwedge_{i \in \emptyset} p_i &:= \top \\
\bigvee_{i \in \emptyset} p_i &:= \perp,
\end{aligned}$$

que será consistente con el comportamiento semántico de \vee y \wedge .

1.4. Asignaciones de verdad

Hasta ahora hemos venido considerando cuestiones sintácticas sobre las fórmulas. Lo que queremos ahora es abordar su semántica, esto es, su comportamiento cuando les damos una interpretación determinada. Nos interesa, por tanto, estudiar qué significa que una proposición se siga de otra independientemente de la traducción que hagamos al lenguaje natural, esto es, la noción de *consecuencia lógica*. Así, por ejemplo, queremos que q se siga de $p \wedge (p \rightarrow q)$ independientemente de cómo se traduzcan p y q informalmente. Es decir, exigimos que, sea cual sea la traducción de $p \wedge (p \rightarrow q)$, si es verdadera entonces la de q tiene que serlo también. Siguiendo la definición 1.1,

Definición 1.18. Definimos el conjunto de valores de verdad, $Bool = \{V, F\}$, donde V es la verdad y F es la falsedad⁶.

Una vez que disponemos de $Bool$ podemos definir la aplicación que nos lleva cada proposición a su valor de verdad correspondiente. Vamos a definir esta aplicación de forma recursiva, es decir, primero lo haremos para las fórmulas atómicas y después describiremos reglas para deducirla en el resto de fórmulas.

Definición 1.19. (Valoración) Sea el conjunto $Bool = \{V, F\}$. Una valoración o evaluación es una función $v : SP \rightarrow Bool$.

Un alfabeto de n letras tiene 2^n valoraciones distintas.

Para definir la valoración de proposiciones, vamos a necesitar una forma de interpretar las conectivas. Con este fin, a cada conectiva le asociaremos una aplicación, que definiremos caso a caso en formato de tabla de verdad:

1. $v_{\neg} : Bool \rightarrow Bool$;

φ	$v_{\neg}(\varphi)$
V	F
F	V

2. $v_{\wedge}, v_{\vee}, v_{\rightarrow}, v_{\leftrightarrow} : Bool \times Bool \rightarrow Bool$;

φ_1	φ_2	$v_{\wedge}(\varphi_1, \varphi_2)$	$v_{\vee}(\varphi_1, \varphi_2)$	$v_{\rightarrow}(\varphi_1, \varphi_2)$	$v_{\leftrightarrow}(\varphi_1, \varphi_2)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Decimos que la conectiva binaria \wedge es un operador conmutativo ya que $v_{\wedge}(V, F) = v_{\wedge}(F, V)$. \vee y \leftrightarrow también son conmutativas.

Definición 1.20. (Extensión) Dada la valoración $v : SP \rightarrow Bool$, definimos recursivamente su *extensión*, $\hat{v} : PROP_{SP} \rightarrow Bool$:

1. $\hat{v}(\perp) = F$.

2. $\hat{v}(\top) = V$.⁷

⁶Nada nos impide considerar casos en que $Bool$ sea infinito numerable, o incluso no numerable, pero la lógica concebida clásicamente es bivalente, esto es, solo consta de dos valores de verdad.

⁷Aquí es donde hemos dado sentido a la definición que dimos de \top y \perp en 1.2.

3. $\hat{v}(\varphi) = v(\varphi)$, para toda $\varphi \in SP$.
4. $\hat{v}(\neg\varphi) = v_{\neg}(\hat{v}(\varphi))$.
5. $\hat{v}((\varphi_1 \Box \varphi_2)) = v_{\Box}(\hat{v}(\varphi_1), \hat{v}(\varphi_2))$.

La propia definición nos da un método para calcular los valores de verdad de fórmulas en función de los de sus símbolos:

Ejemplo 1.21. Encontremos el valor de verdad de $p \wedge \neg q \rightarrow r \vee s$, siendo v una valoración que cumple $v(p) = v(q) = V, v(r) = v(s) = F$:

1. $\hat{v}(\neg q) = v_{\neg}(\hat{v}(q)) = v_{\neg}(V) = F$.
2. $\hat{v}(p \wedge \neg q) = v_{\wedge}(\hat{v}(p), \hat{v}(\neg q)) = v_{\wedge}(V, F) = F$.
3. $\hat{v}(r \vee s) = v_{\vee}(\hat{v}(r), \hat{v}(s)) = v_{\vee}(F, F) = F$.
4. Finalmente, $\hat{v}(p \wedge \neg q \rightarrow r \vee s) = v_{\rightarrow}(\hat{v}(p \wedge \neg q), \hat{v}(r \vee s)) = v_{\rightarrow}(F, F) = V$.

Definición 1.22. (satisfactibilidad) Dada $v : SP \rightarrow Bool$ y $\varphi \in PROP_{SP}$ se dice que v satisface φ , y se escribe como $v \models \varphi$, si y solo si $\hat{v}(\varphi) = V$. Si $\hat{v}(\varphi) = F$, escribimos $v \not\models \varphi$.

En virtud de la definición anterior, podemos clasificar cada fórmula φ como:

- *Satisfactible*, si existe alguna valoración v tal que $v \models \varphi$.
 - *Tautología*, si $v \models \varphi$ para toda valoración v .
 - *Contingencia*, si es satisfactible pero no tautología.
- *Contradicción*, si no es satisfactible.

Ejemplo 1.23. La fórmula $p \wedge q \rightarrow r \leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$ es contingencia. Invitamos al lector a que realice la tabla de verdad correspondiente.

Definición 1.24. (Conjunto de modelos) Dado $\Phi \subseteq PROP_{SP}$, el conjunto de modelos de Φ se define como:

$$Mod(\Phi) := \{v : SP \rightarrow Bool \mid \text{para toda } \varphi \in \Phi \ v \models \varphi\}$$

Definición 1.25. (Satisfactibilidad) Sea $\Phi \subseteq PROP_{SP}$.

Φ se dice satisfactible, y se escribe $Sat(\Phi)$, si $Mod(\Phi) \neq \emptyset$.

Φ se dice insatisfactible, y se escribe $Insat(\Phi)$, si $Mod(\Phi) = \emptyset$.

Ahora llegamos a la definición del concepto que ha motivado nuestro estudio inicial de la semántica.

Definición 1.26. (Consecuencia lógica) Sea $\varphi \in PROP_{SP}$, $\Phi \subseteq PROP_{SP}$. Decimos que φ es consecuencia lógica de Φ , $\Phi \models \varphi$, si y solo si $Mod(\Phi) \subseteq Mod(\{\varphi\})$.

Esto equivale a decir que toda asignación de verdad que satisface todos los elementos de Φ también satisface φ .

De ahora en adelante, escribimos $Mod(\varphi)$ en vez de $Mod(\{\varphi\})$.

Ejemplo 1.27. Dado Φ tal que $Insat(\Phi)$, se sigue de la anterior definición que $\Phi \models \varphi$, para cualquier φ .

A continuación presentamos algunos resultados básicos de semántica.

Proposición 1.28.

1. $Mod(\emptyset) = \{v | v : SP \rightarrow Bool\}$.
2. Si $\Phi = \emptyset$ y $\Phi \models \varphi$, entonces φ es tautología.
3. Demostrar que $Mod(PROP_{SP}) = \emptyset$.
4. Demostrar que $Mod(\Phi) \cap Mod(\Psi) = Mod(\Phi \cup \Psi)$.
5. Demostrar que $Mod(\Phi) \cup Mod(\Psi) \subseteq Mod(\Phi \cap \Psi)$.

Demostración.

1. En efecto, toda valoración satisface todas las proposiciones del conjunto vacío.
2. $Mod(\emptyset)$ tiene a todas las valoraciones, por tanto si $Mod(\emptyset) \subseteq Mod(\varphi)$, cualquier valoración satisface φ .
3. Dada una valoración v , y cualquier proposición φ , no podemos tener a la vez $\hat{v}(\varphi) = T$ y $\hat{v}(\neg\varphi) = T$. Por tanto v no satisface todos los elementos de $PROP_{SP}$.
4. Comprobamos los dos contenidos:
 \subseteq : Si una valoración v está en $(\Phi) \cap Mod(\Psi)$, satisface todos los elementos de Φ y de Ψ , por tanto satisface todos los elementos de $\Phi \cup \Psi$.
 \supseteq : Si v está en $Mod(\Phi \cup \Psi)$, v satisface todos los elementos de $\Phi \cup \Psi$, por tanto satisface todos los elementos de Φ y todos los de Ψ , es decir, $v \in Mod(\Phi) \cap Mod(\Psi)$.
5. Dada $v \in Mod(\Phi) \cup Mod(\Psi)$, o bien v verifica todos los elementos de Φ o los de Ψ . En ambos casos, v verifica los elementos de $\Phi \cap \Psi$.

En 5, el contenido opuesto no se cumple. Poniendo por ejemplo $\Phi = \{p\}$, $\Psi = \{p \wedge p\}$, siendo $p \in SP$, tenemos $\Phi \cap \Psi = \emptyset$, por tanto $Mod(\Phi \cap \Psi)$ contiene a todas las valoraciones, pero cualquier valoración v que cumpla $v(p) = F$ no estará en $Mod(\Phi) \cup Mod(\Psi)$. \square

Proposición 1.29. $\Phi \cup \{\varphi\} \models \psi$ si y solo si $\Phi \models \varphi \rightarrow \psi$.

Demostración. Veamos que $Mod(\Phi) \subseteq Mod(\varphi \rightarrow \psi)$ suponiendo que $Mod(\Phi \cup \{\varphi\}) \subseteq Mod(\psi)$. Sea $v \in Mod(\Phi)$. Si $\hat{v}(\varphi) = V$ entonces $v \in Mod(\varphi)$. Por hipótesis, $v \in Mod(\psi)$, luego $\hat{v}(\psi) = V$ y entonces $\hat{v}(\varphi \rightarrow \psi) = V$, es decir, $v \in Mod(\varphi \rightarrow \psi)$. Si $\hat{v}(\varphi) = F$, $\hat{v}(\varphi \rightarrow \psi) = V$ y de nuevo $v \in Mod(\varphi \rightarrow \psi)$.

Recíprocamente, si $v \in Mod(\Phi \cup \{\varphi\})$, entonces $\hat{v}(\varphi) = V$. Por hipótesis, al ser $v \in Mod(\Phi)$, $v \in Mod(\varphi \rightarrow \psi)$, es decir, $\hat{v}(\varphi \rightarrow \psi) = V$, luego $\hat{v}(\psi) = V$ y $v \in Mod(\psi)$. \square

Proposición 1.30. $\Phi \models \varphi$ si y solo si $Insat(\Phi \cup \{\neg\varphi\})$

Demostración. Supongamos que $\Phi \models \varphi$, esto es, que $Mod(\Phi) \subset Mod(\varphi)$. Sea $v \in Mod(\Phi \cup \{\neg\varphi\})$. Entonces, por definición, $v \models \chi$, para toda $\chi \in \Phi \cup \{\neg\varphi\}$. Luego en especial, $v \models \neg\varphi$, lo que contradice que $v \in Mod(\varphi)$ (¿por qué?).

Recíprocamente, si $Mod(\Phi \cup \{\neg\varphi\}) = \emptyset$, sea $v \in Mod(\Phi)$. Entonces $v \notin Mod(\neg\varphi)$, por tanto $\hat{v}(\neg\varphi) = F$, pero como $\hat{v}(\neg\varphi) = v_{\neg}(\hat{v}(\varphi))$, tenemos que $F = v_{\neg}(\hat{v}(\varphi))$, es decir, $\hat{v}(\varphi) = V$, así que $v \in Mod(\varphi)$. Como esto lo cumple cualquier $v \in Mod(\Phi)$, tenemos, como queríamos, que $Mod(\Phi) \subseteq Mod(\varphi)$ \square

De ahora en adelante, escribiremos $\Phi, \varphi \models \psi$ en vez de $\Phi \cup \{\varphi\} \models \psi$.

Dada una valoración v , para cualesquiera fórmulas φ_1, φ_2 en que aparecen los símbolos p_1, \dots, p_n y q_1, \dots, q_m , respectivamente, está claro, por cómo hemos definido las valoraciones, que $\hat{v}(\varphi_1)$ depende de $v(p_1), \dots, v(p_n)$, y $\hat{v}(\varphi_2)$ depende de $v(q_1), \dots, v(q_m)$. De modo que para comprobar que $\varphi_1 \models \varphi_2$ nos basta con comprobar que, para cada una de las posibles valoraciones de $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m$, $\hat{v}(\varphi_2) = V$ si $\hat{v}(\varphi_1) = V$. Este es nuestro primer procedimiento para demostrar consecuencias lógicas entre fórmulas, que resumiremos gráficamente en tablas de verdad.

Ejemplo 1.31. Consideremos $\Phi = \{\neg p \wedge q \rightarrow r, \neg p, \neg r\}$, $\varphi = \neg q$. Para demostrar que $\Phi \models \varphi$ basta realizar la tabla de verdad correspondiente y comparar los valores de verdad de las premisas del conjunto Φ con los de φ . En Φ y φ aparecen los símbolos p, q y r , por tanto tenemos la siguiente tabla de verdad:

p	q	r	$(\neg p \wedge q) \rightarrow r$	$\neg p$	$\neg r$	$\neg q$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	V	F
V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

En efecto, solo hay un caso en que se cumplen todas las proposiciones de Φ (la última fila) y en ese caso se cumple φ . Por tanto, $\Phi \models \varphi$.

1.5. Equivalencia lógica

El método descrito de las tablas de verdad aumenta de complejidad a medida que lo hace el número de proposiciones que estudiamos. Por ello, investigamos relaciones formales entre las fórmulas que simplifiquen tales cuestiones. Comenzamos por las proposiciones atómicas:

Definición 1.32. (Equivalencia lógica) Sean $\varphi, \psi \in PROP_{SP}$. φ se dice lógicamente equivalente a ψ , $\varphi \sim \psi$, si para toda valoración v , $\hat{v}(\varphi) = \hat{v}(\psi)$.

Esto equivale a decir que $\varphi_1 \models \varphi_2$ y $\varphi_2 \models \varphi_1$.

Proposición 1.33. \sim es relación de equivalencia. Además, \sim es congruencia respecto de las conectivas lógicas, es decir:

1. Si $\varphi \sim \psi$, entonces $\neg\varphi \sim \neg\psi$.
2. Si $\varphi_1 \sim \varphi_2$ y $\psi_1 \sim \psi_2$, entonces $\varphi_1 \Box \psi_1 \sim \varphi_2 \Box \psi_2$.

Demostración. Que es relación de equivalencia es directo.

Supongamos $\varphi \sim \psi$, y sea v cualquier valoración. Entonces

$$\hat{v}(\neg\varphi) = v_{\neg}(\hat{v}(\varphi)) = v_{\neg}(\hat{v}(\psi)) = \hat{v}(\neg\psi).$$

De igual manera, supongamos $\varphi_1 \sim \varphi_2$ y $\psi_1 \sim \psi_2$, sea v cualquier valoración. Entonces

$$\hat{v}(\varphi_1 \Box \psi_1) = v_{\Box}(\hat{v}(\varphi_1), \hat{v}(\psi_1)) = v_{\Box}(\hat{v}(\varphi_2), \hat{v}(\psi_2)) = \hat{v}(\varphi_2 \Box \psi_2).$$

□

Las siguientes reglas nos ayudarán a demostrar equivalencias entre fórmulas:

Teorema 1.34. (*Leyes de equivalencia lógica*)

1. *Conmutatividad:*

$$p \wedge q \sim q \wedge p, \quad p \vee q \sim q \vee p, \quad p \leftrightarrow q \sim q \leftrightarrow p$$

2. *Asociatividad:*

$$(p \vee q) \vee r \sim p \vee (q \vee r), \quad (p \wedge q) \wedge r \sim p \wedge (q \wedge r)$$

3. *Idempotencia:*

$$p \wedge p \sim p, \quad p \vee p \sim p$$

4. *Distributiva:*

$$p \wedge (q \vee r) \sim (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad p \vee (q \wedge r) \sim (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

5. *Absorción:*

$$p \wedge (p \vee q) \sim p, \quad p \vee (p \wedge q) \sim p$$

6. *Cero y unidad:*

$$p \wedge \top \sim p, \quad p \vee \top \sim \top, \quad p \wedge \perp \sim \perp, \quad p \vee \perp \sim p$$

7. *Contradicción:*

$$p \wedge \neg p \sim \perp$$

8. *Tercio excluso:*

$$p \vee \neg p \sim \top$$

9. *Negación:*

$$\neg \neg p \sim p$$

10. *Leyes de De Morgan:*

$$\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \sim \neg p \wedge \neg q$$

11. *Simplificación de los condicionales:*

$$p \rightarrow q \sim \neg p \vee q, \quad p \leftrightarrow q \sim (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Demostración. Las demostraciones de equivalencia consisten simplemente en comprobar que coinciden las tablas de verdad. Comprobamos las tres primeras:

1. Conmutatividad:

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

2. Asociatividad:

p	q	r	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee (q \vee r)$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	F

3. Idempotencia:

p	$p \wedge p$	$p \vee p$
V	V	V
F	F	F

□

1.6. Sustitución

Pasamos a estudiar los lemas de sustitución, que entre otras cosas nos permitirán generalizar las leyes de equivalencia lógica. Para ello es necesario estudiar el concepto de *sustitución*:

Definición 1.35. (Sustitución) Sean $\varphi, \psi \in PROP_{SP}$ y sea $p \in SP$. Llamamos $\psi[\varphi/p]$ a la fórmula que resulta de sustituir en ψ cada aparición de p por φ . Dados φ y p , podemos definir $\psi[\varphi/p]$ recursivamente del siguiente modo:

1. $p[\varphi/p] = \varphi$.
2. $q[\varphi/p] = q$, para cualquier $q \in SP \setminus \{p\}$.

3. $\top[\varphi/p] = \top$.
4. $\perp[\varphi/p] = \perp$.
5. $(\neg\psi)[\varphi/p] = \neg(\psi[\varphi/p])$.
6. $(\psi_1 \Box \psi_2)[\varphi/p] = (\psi_1[\varphi/p] \Box \psi_2[\varphi/p])$.

Ejemplo 1.36. Si usamos las fórmulas $\psi = p \wedge q \rightarrow p$ y $\varphi = p_1 \vee \neg p_2$, al sustituir p por φ en ψ obtenemos la fórmula:

$$\psi[\varphi/p] = (p_1 \vee \neg p_2) \wedge q \rightarrow (p_1 \vee \neg p_2).$$

Introducimos la siguiente notación que será de utilidad: dada una función $f : A \rightarrow B$ y dados $a \in A$, $b \in B$, denotamos respectivamente por $f[b/a](x)$ a $f(x)$, si $x \neq a$, y a b , si $x = a$.

Ejemplo 1.37. Sea $X \in \{V, F\}$. Si con la notación anterior usamos como función una valoración v , $v[X/p]$ es una valoración de verdad que cumple:

- $v[X/p](q) = v(q)$ si $q \neq p$
- $v[X/p](p) = X$.

La siguiente proposición muestra que obtenemos el mismo resultado tanto si sustituimos y posteriormente asignamos un valor de verdad como si hacemos el proceso inverso:

Proposición 1.38. Sean $\varphi, \psi \in PROP_{SP}$, $p \in SP$ y $v : SP \rightarrow Bool$ valoración. Entonces:

$$\hat{v}(\psi[\varphi/p]) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi)$$

Demostración. Procedemos por inducción estructural. Dividimos las proposiciones atómicas en cuatro casos como en la definición 1.35:

1. Si $\psi = p$ entonces, por definición de sustitución $\psi[\varphi/p] = \varphi$. Por tanto, $\hat{v}(\psi[\varphi/p]) = \hat{v}(\varphi)$ y siguiendo la notación que hemos explicado arriba, $\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(p) = v[\hat{v}(\varphi)/p](p) = \hat{v}(\varphi)$.
2. Si $\psi = q \in SP$ y $q \neq p$ entonces $\psi[\varphi/p] = q$, con lo que $\hat{v}(\psi[\varphi/p]) = \hat{v}(q)$ y, como antes, $\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(q) = v[\hat{v}(\varphi)/p](q) = \hat{v}(q)$.
3. Si $\psi = \top$, $\psi[\varphi/p] = \top$, y $\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\top) = v(\top) = V$.
4. Si $\psi = \perp$, $\psi[\varphi/p] = \perp$, y $\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\perp) = v(\perp) = F$.
5. Si $\psi = \neg\psi_1$, entonces $\hat{v}((\neg\psi_1)[\varphi/p]) = \hat{v}(\neg(\psi_1[\varphi/p])) = v_{\neg}(\hat{v}(\psi_1[\varphi/p]))$, por las definiciones de sustitución y extensión de la valoración v . Aplicando la hipótesis de inducción, lo anterior es igual a

$$v_{\neg}(\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]})(\psi_1) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\neg\psi_1).$$

6. Si $\psi = \psi_1 \square \psi_2$, entonces

$$\hat{v}(\psi[\varphi/p]) = \hat{v}((\psi_1[\varphi/p] \square \psi_2[\varphi/p])) = v_{\square}(\hat{v}(\psi_1[\varphi/p]), \hat{v}(\psi_2[\varphi/p])).$$

Aplicando la hipótesis de inducción, esto es igual a

$$v_{\square}(\widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi_1), \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi_2)) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi_1 \square \psi_2).$$

□

Lema 1.39. (De sustitución) Sean $\varphi, \varphi', \psi \in PROP_{SP}$, $p \in SP$. Si $\varphi \sim \varphi'$, $\psi[\varphi/p] \sim \psi[\varphi'/p]$.

Demostración. Sea v valoración. Entonces, al ser $\hat{v}(\varphi) = \hat{v}(\varphi')$, se obtiene que

$$\hat{v}(\psi[\varphi/p]) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi')/p]}(\psi) = \hat{v}(\psi[\varphi'/p])$$

Como esto sucede para cualquier valoración v , $\psi[\varphi/p] \sim \psi[\varphi'/p]$. □

Acabamos de ver que sustituir fórmulas equivalentes en una misma fórmula nos lleva a fórmulas equivalentes. A continuación vemos que sustituir la misma fórmula en fórmulas equivalentes da como resultado fórmulas equivalentes.

Lema 1.40. (De sustitución) Sean $\varphi, \psi_1, \psi_2 \in PROP_{SP}$, $p \in SP$. Si $\psi_1 \sim \psi_2$, entonces $\psi_1[\varphi/p] \sim \psi_2[\varphi/p]$.

Demostración. Sea v cualquier valoración. Tenemos que:

$$\hat{v}(\psi_1[\varphi/p]) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi_1) = \widehat{v[\hat{v}(\varphi)/p]}(\psi_2) = \hat{v}(\psi_2[\varphi/p])$$

Lo que nos da el resultado. □

El lema 1.40 nos permite probar una versión más general de las leyes de equivalencia lógica, 2.59, en las que en vez de símbolos de proposición podemos sustituir cualquier fórmula. En el siguiente ejemplo probamos la primera:

Ejemplo 1.41. Consideremos las dos fórmulas $\psi_1 = p \vee q$ y $\psi_2 = q \vee p$. Sabemos que son equivalentes, luego si consideramos $\varphi, \chi \in PROP_{SP}$ tenemos que, por el lema 1.40, $\psi_1[\varphi/p]$ y $\psi_2[\varphi/p]$, es decir, $\varphi \vee q$ y $q \vee \varphi$, son equivalentes. Aplicando una vez más 1.40 para sustituir q por χ , obtenemos que $\varphi \vee \chi$ y $\chi \vee \varphi$ son equivalentes.

Ejemplo 1.42. Supongamos que queremos demostrar la equivalencia de estas dos fórmulas:

- $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow p_4 \wedge (p_5 \vee p_6)$
- $\neg((p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6)) \rightarrow \neg(p_1 \vee p_2 \vee p_3)$

Desde luego podríamos hacerlo usando tablas de verdad, pero está claro que tardaríamos demasiado. Una forma más sencilla de hacerlo usando las leyes de equivalencia y los lemas de sustitución es comprobar las dos equivalencias lógicas:

1. $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow p_4 \wedge (p_5 \vee p_6) \sim p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow (p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6)$
2. $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow (p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6) \sim \neg((p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6)) \rightarrow \neg(p_1 \vee p_2 \vee p_3)$

En efecto:

- 1 se obtiene aplicando el lema 1.39 con $\psi = p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow p$, $\varphi_1 = p_4 \wedge (p_5 \vee p_6)$, $\varphi_2 = (p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6)$.
- 2 se obtiene en dos pasos:
Aplicando el lema 1.40 con $\psi_1 = p \rightarrow q$, $\psi_2 = \neg q \rightarrow \neg p$ y $p = p_1 \vee p_2 \vee p_3$, obtenemos: $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow q \sim \neg q \rightarrow \neg(p_1 \vee p_2 \vee p_3)$.
Y aplicando de nuevo el lema 1.40 con $\psi_1 = p_1 \vee p_2 \vee p_3 \rightarrow q$, $\psi_2 = \neg q \rightarrow \neg(p_1 \vee p_2 \vee p_3)$ y $q = (p_4 \vee p_5) \wedge (p_4 \vee p_6)$, obtenemos 2.

1.7. Completitud funcional

En 1.20 definimos recursivamente una serie de asignaciones de verdad que correspondían a los símbolos de las conectivas lógicas, $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$. En general, a cualquier tabla de verdad dada por $v_{\S} : Bool^n \rightarrow Bool$ podemos asignarle un símbolo de conectiva n -aria⁸, $\$(p_1, \dots, p_n)$ ⁹. Según esta definición, podemos interpretar los símbolos \top, \perp como conectivas 0-arias, dadas por las tablas de verdad:

\top	\perp
V	F

Analizando con mayor detenimiento las conectivas binarias, es fácil observar que existen 16 de ellas distintas, una asociada a cada tabla de verdad¹⁰. Por ejemplo, podemos definir mediante tablas de verdad las conectivas:

⁸Decimos que una conectiva es n -aria si se escribe con n símbolos de proposición, por ejemplo, las conectivas $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ son binarias (2-arias) y la conectiva \neg es 1-aria.

⁹Aunque sintácticamente escribiremos las conectivas como $\$(p_1, \dots, p_n)$, semánticamente el valor de verdad de $\$(p_1, \dots, p_n)$ solo dependerá de los valores de verdad de p_1, \dots, p_n , no de p_1, \dots, p_n , al igual que con las conectivas conocidas anteriormente.

¹⁰Decimos que dos conectivas n -arias son distintas cuando tienen distinta tabla de verdad. Para cada n , hay 2^{2^n} conectivas n -arias distintas.

p	q	$p \downarrow q$	$p \uparrow q$	$p \downarrow q$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

\downarrow se conoce como *disyunción excluyente*, mientras que \uparrow y \downarrow se llaman *NAND* y *NOR*, respectivamente.

Sin embargo, en cierto sentido, estas nuevas conectivas son redundantes, ya que podemos expresarlas en función de nuestras cinco conectivas iniciales:

- $p \downarrow q \sim \neg(p \leftrightarrow q)$
- $p \uparrow q \sim \neg(p \wedge q)$
- $p \downarrow q \sim \neg(p \vee q)$

Es natural, por tanto, preguntarse si cualquier conectiva n -aria será expresable en función de nuestras conectivas, como lo son \downarrow, \uparrow y \uparrow . Para formalizar esta cuestión, introducimos dos nociones de gran importancia:

Definición 1.43. Una conectiva n -aria $\$$ dada por $v_{\$} : Bool^n \rightarrow Bool$ se dice expresable en términos de un conjunto de conectivas C si existe una fórmula φ que tiene por conectivas a elementos de C y por símbolos de proposición a p_1, \dots, p_n , tal que $\varphi \sim \$(p_1, \dots, p_n)$.

Definición 1.44. (Completitud funcional) Un conjunto de conectivas C se dice funcionalmente completo si cualquier conectiva $\$$ dada por $v_{\$} : Bool^n \rightarrow Bool$ es expresable en términos de C .

Ejemplo 1.45. Si C es funcionalmente completo, cualquier proposición φ con símbolos p_1, \dots, p_n y cualesquiera conectivas $\$, \dots, \$_m$ es equivalente a una expresión con símbolos p_1, \dots, p_n y conectivas en C .

En efecto, φ tiene una tabla de verdad en función de p_1, \dots, p_n , de modo que se puede expresar como una conectiva n -aria $\$_\varphi$ con esa misma tabla de verdad, es decir, $\$_\varphi(p_1, \dots, p_n) \sim \varphi$. Ahora, como C es funcionalmente completo, $\$_\varphi$ es expresable en términos de C , por tanto hay una expresión ψ de conectivas elementos de C y símbolos de proposición p_1, \dots, p_n tal que $\psi \sim \$_\varphi \sim \varphi$.

Ahora ya podemos dar respuesta a la pregunta que nos formulamos antes:

Proposición 1.46. $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es funcionalmente completo.

Demostración. Sea $\$$ conectiva n -aria. Procedamos por inducción sobre n .

Si $n = 1$, es fácil comprobar que tenemos cuatro conectivas posibles, y que éstas corresponden a la identidad (es decir, $\$(p) \sim p$), \neg , $\top \sim p \vee \neg p$ y $\perp \sim p \wedge \neg p$,

con lo que se verifica el enunciado.

Supongamos que es válido para $n - 1$ y veámoslo para n . Sea $\$(p_1, \dots, p_n)$ una conectiva dada por la siguiente tabla de verdad:

p_n	p_1	\dots	p_{n-1}	$\$(p_1, \dots, p_n)$
V	$X(1)$
...
V	$X(2^{n-1})$
F	$X(2^{n-1} + 1)$
...
F	$X(2^n)$

donde $X(i)$ denota el valor de verdad correspondiente a la fila i -ésima. De esta forma obtenemos dos tablas de verdad, cada una con 2^{n-1} filas: aquella en la que p_n toma V como valor de verdad (las primeras 2^{n-1} filas de la tabla anterior) y aquella en la que toma el valor F (las filas restantes). Llamamos $\$_1(p_1, \dots, p_{n-1})$ y $\$_2(p_1, \dots, p_{n-1})$ a las conectivas inducidas por estas dos tablas de verdad.

Entonces tenemos:

$$\$(p_1, \dots, p_n) \sim (p_n \wedge \$_1(p_1, \dots, p_{n-1})) \vee (\neg p_n \wedge \$_2(p_1, \dots, p_{n-1})).$$

Aplicando la hipótesis de inducción, existen fórmulas φ_1, φ_2 construidas a partir de $\{\neg, \wedge, \vee\}$ tales que $\varphi_1 \sim \$_1(p_1, \dots, p_{n-1})$ y $\varphi_2 \sim \$_2(p_1, \dots, p_{n-1})$, con lo que obtenemos que $\$(p_1, \dots, p_n)$ es expresable en términos de $\{\neg, \wedge, \vee\}$. \square

Definición 1.47. (Formas normales) Decimos que una fórmula está en *Forma Normal Conjuntiva* (FNC) si es de la forma:

$$\bigwedge_{i \leq n} \bigvee_{j \leq m_i} \varphi_{ij}$$

y se dice que está en *Forma Normal Disyuntiva* (FND) si es de la forma:

$$\bigvee_{i \leq n} \bigwedge_{j \leq m_i} \varphi_{ij}$$

donde cada φ_{ij} es una proposición atómica o la negación de una proposición atómica ¹¹.

Corolario 1.48.

¹¹Ya veremos en un ejercicio que, para cada fórmula φ , existen dos fórmulas φ^c, φ^d en FNC y en FND, respectivamente, tales que $\varphi \sim \varphi^c$ y $\varphi \sim \varphi^d$.

1. $\{\neg, \wedge\}$ es funcionalmente completo.
2. $\{\neg, \vee\}$ es funcionalmente completo.
3. $\{\rightarrow, \perp\}$ es funcionalmente completo.
4. $\{\uparrow\}$ es funcionalmente completo.
5. $\{\downarrow\}$ es funcionalmente completo.

Demostración.

1. Sabemos, por 1.46, que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es funcionalmente completo. Basta ver, entonces, que \vee es expresable en términos de \neg y \wedge . Esto es evidente por las leyes de De Morgan (2.59):

$$p \vee q \sim \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

2. Análogo al anterior, usando la otra ley de De Morgan:

$$p \wedge q \sim \neg(\neg p \vee \neg q).$$

3. Basta ver que \neg, \vee son expresables en términos de \rightarrow, \perp . Esto se sigue de estas afirmaciones que se pueden comprobar con tablas de verdad:

$$\neg p \sim p \rightarrow \perp.$$

$$p \vee q \sim (p \rightarrow \perp) \rightarrow q.$$

4. Expresamos \neg, \wedge en términos de \uparrow :

$$\neg p \sim p \uparrow p.$$

$$p \wedge q \sim (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q).$$

5. Expresamos \neg, \vee en términos de \downarrow :

$$\neg p \sim p \downarrow p$$

$$p \vee q \sim (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q).$$

□

1.8. Método de los *tableaux*

Dado un conjunto finito de fórmulas Ψ , nos interesa encontrar un método sistemático para determinar si $Insat(\Psi)$. Este procedimiento nos permitirá también deducir si, dados un conjunto de fórmulas $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ y una fórmula φ , $\Phi \models \varphi$, pues por 1.30 esto es equivalente a $Insat(\Phi \cup \{\neg\varphi\})$ o, alternatively, a que $\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i \wedge \neg\varphi \sim \perp$. Es decir, aplicaremos el método a $\Psi := \Phi \cup \{\neg\varphi\}$.


1.8.1. Nociones básicas y ejemplos

Nuestro objetivo es tomar los datos anteriores como vértices de un grafo y construir un *árbol*, es decir, un diagrama (llamado '*tableau*') en el que conectaremos las distintas fórmulas mediante aristas, formando *ramas* y de modo que, dados dos elementos del árbol, si pertenecen a la misma rama entonces se encuentran en conjunción y, si son de ramas distintas, se encuentran en disyunción. De esta forma, y a partir de una serie de reglas de construcción, el problema de la insatisfactibilidad de Ψ quedará reducido a comprobar que un *tableau* suyo tiene todas las ramas *cerradas*, esto es, contienen una contradicción.


Construiremos nuestro diagrama de árbol, cuyos vértices serán proposiciones, de arriba hacia abajo. Llamamos al vértice de arriba del todo *raíz*. Llamaremos *hojas* a los vértices v tales que no haya ningún vértice v' debajo de v y unido por una arista a v . Llamaremos *rama* a una sucesión de vértices $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ en que:

- v_1 es la raíz.
- v_{i+1} está unido por una arista a v_i y debajo de v_i para todo i .
- v_n es una hoja.

Por ejemplo, en el diagrama:



tendríamos estas dos ramas:



Al hacer el *tableau* podemos encontrarnos fórmulas que se pueden simplificar, llamadas σ -fórmulas o *simplificables*. Estas simplificaciones se podrán hacer de acuerdo a la siguiente tabla:

σ	σ_1
$\neg \top$	\perp
$\neg \perp$	\top
$\neg \neg \varphi$	φ

Está claro que, en cada fila, $\sigma \sim \sigma_1$.

Ahora bien, en el proceso de extender el *tableau*, nos conviene distinguir dos tipos de fórmulas, que llamaremos α -fórmulas y β -fórmulas. En las siguientes tablas, la primera columna servirá como definición de α -fórmulas y β -fórmulas, es decir, habrá cuatro tipos de α -fórmulas y cuatro tipos de β -fórmulas. En las otras dos columnas aparecerán sus descomposiciones, que usaremos al construir los *tableaux*.

■ α -fórmulas:

α	α_1	α_2
$\varphi_1 \wedge \varphi_2$	φ_1	φ_2
$\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2)$	$\neg\varphi_1$	$\neg\varphi_2$
$\neg(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$	φ_1	$\neg\varphi_2$
$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$	$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$	$\varphi_2 \rightarrow \varphi_1$

■ β -fórmulas:

β	β_1	β_2
$\varphi_1 \vee \varphi_2$	φ_1	φ_2
$\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$	$\neg\varphi_1$	$\neg\varphi_2$
$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$	$\neg\varphi_1$	φ_2
$\neg(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$	$\neg(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$	$\neg(\varphi_2 \rightarrow \varphi_1)$

Podemos comprobar que para cada fila de la primera tabla, se cumple $\alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2$, y para cada fila de la segunda tabla, se cumple $\beta \sim \beta_1 \vee \beta_2$.

No es difícil probar el siguiente resultado, que justifica la anterior clasificación:

Proposición 1.49. *Sea $\varphi \in PROP_{SP}$. Entonces φ verifica una de las siguientes condiciones:*


1. *Es de la forma p , $\neg p$, \perp o \top , con $p \in SP$.*
2. *Es σ -fórmula.*
3. *Es α -fórmula.*
4. *Es β -fórmula.*

Debido a esto, nuestro método nos permitirá descomponer un conjunto de proposiciones múltiples veces hasta obtener proposiciones de tipo p_i , $\neg p_i$, \perp o

\top , con $p_i \in SP$.

Ahora pasamos a describir las reglas de construcción de *tableaux* asociados a un conjunto Ψ de proposiciones.

- *Regla inicial, R_{ini}* : Sean $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \Psi$. Entonces



es *tableau* de Ψ .

- *Regla de hipótesis, R_{hip}* : Sea





tableau de Ψ . Entonces



es *tableau* de Ψ , con $\varphi \in \Psi$.

Es decir, siempre podemos añadir un elemento de Ψ a una rama.

- *Regla σ , R_σ* : Sea





tableau de Ψ , donde σ es fórmula simplificable y σ_1 la versión simplificada de σ . Entonces



es *tableau* de Ψ .

Es decir, siempre podemos añadir a una rama una versión simplificada de cualquier elemento de la rama y seguimos teniendo un *tableau* de Ψ .

- *Regla α , R_α* : Sea





tableau de Ψ , donde α es una α -fórmula y α_1, α_2 su descomposición. Entonces



es *tableau* de Ψ .

Es decir, si hay una α -fórmula α en una rama, podemos añadir a la rama los dos elementos de su descomposición, α_1 y α_2 .

- *Regla β , R_β* : Sea





tableau de Ψ , donde β es una β -fórmula y β_1, β_2 su descomposición. Entonces



es *tableau* de Ψ .

Es decir, si hay una β -fórmula de descomposición β_1, β_2 en una rama, podemos dividir esa rama en dos ramificaciones, una que contiene a β_1 y otra que contiene a β_2 .

Precisemos las nociones que describimos al inicio de esta sección. Dado un *tableau* T y una rama r , consideremos los siguientes conjuntos:

$$\Gamma_T := \{\varphi \in PROP_{SP} \mid \varphi \text{ está en } T\}$$

$$\Gamma_r := \{\varphi \in PROP_{SP} \mid \varphi \text{ está en } r\}$$

Esto nos permite establecer la siguiente


Definición 1.50. Una rama r de un *tableau* T se dice *cerrada* si se da al menos uno de los siguientes casos:

- $\perp \in \Gamma_r$.
- Existe φ tal que $\varphi, \neg\varphi \in \Gamma_r$.

Si todas las ramas de T son cerradas, T se dice *cerrado*. Si existe un *tableau* cerrado para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$ lo denotamos por $\Phi \vdash_{tb} \varphi$.

Decimos que una rama es *abierto* cuando no es cerrada, y decimos que un tablero es *abierto* cuando no es cerrada.

Ejemplo 1.51. Supongamos que queremos comprobar $\{\neg p \wedge q \rightarrow r, \neg p, \neg r\} \models \neg q$. Como veremos en breve, para ello nos basta encontrar un *tableau* cerrado para $\Psi = \{\neg p \wedge q \rightarrow r, \neg p, \neg r, \neg\neg q\}$. Enumeremos las premisas del siguiente modo: (1) $\neg p \wedge q \rightarrow r$, (2) $\neg p$, (3) $\neg r$, (4) $\neg\neg q$. La siguiente figura muestra un *tableau* que obtenemos de Ψ , y a continuación explicamos cómo se ha desarrollado a partir de las reglas de construcción:



Recordemos que el *tableau* se construye de arriba hacia abajo. Por la regla R_{ini} , el grafo de un solo vértice $\neg p \wedge q \rightarrow r$ es un *tableau* de Ψ , ya que $\neg p \wedge q \rightarrow r \in \Psi$.

Ahora bien, $\neg p \wedge q \rightarrow r$ es una β -fórmula de tipo $\beta = \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$, de modo que, atendiendo a la tabla de las β -fórmulas, se descompone en las fórmulas $\beta_1 = \neg\varphi_1 = \neg(\neg p \wedge q)$ y $\beta_2 = \varphi_2 = r$.

Teniendo la descomposición de la β -fórmula, podemos aplicar la regla R_β , y obtenemos un *tableau* con dos ramificaciones, una con $\neg(\neg p \wedge q)$ y otra con r :

- Comenzamos con la segunda rama, que es la más sencilla. Usando la regla R_{hip} , podemos añadir a la rama cualquier elemento de Ψ , de modo que escogemos $\neg r$. Ahora bien, en esta rama tenemos las proposiciones $\neg p \wedge q \rightarrow r$, r y $\neg r$. En concreto, tenemos las proposiciones r y $\neg r$. Como en la rama hay dos proposiciones de tipo φ y $\neg\varphi$, es cerrada y hemos acabado con ella. Simbolizaremos que una rama está cerrada escribiendo $\#$ y señalando los vértices en los que se encuentran las proposiciones contradictorias.
- Fijémonos ahora la rama de $\neg(\neg p \wedge q)$. De nuevo, tenemos una β -fórmula. Usando la tabla como antes, vemos que se descompone en $\beta_1 = \neg\neg p$, $\beta_2 = \neg q$. De modo que, por la regla R_β , esta rama se divide a su vez en otras dos:
 - La primera rama tiene los elementos $\neg p \wedge q \rightarrow r$, $\neg(\neg p \wedge q)$ y $\neg\neg p$. Usando la regla R_{hip} , podemos añadir a esta rama el elemento $\neg p$ de Ψ . Ahora, dos de los elementos de esta rama son $\neg\neg p$ y $\neg p$. Es decir, tenemos las fórmulas φ y $\neg\varphi$, siendo $\varphi = \neg p$. Por tanto esta rama está cerrada.
 - La segunda rama tiene los elementos $\neg p \wedge q \rightarrow r$, $\neg(\neg p \wedge q)$ y $\neg q$. Usando la regla R_{hip} , podemos añadir a esta rama el elemento $\neg\neg q$ de Ψ . Ahora, dos de los elementos de esta rama son $\neg\neg q$ y $\neg q$. Como la rama contiene una fórmula y su negación, es cerrada.

Como todas las ramas son cerradas, el *tableau* es cerrado.


Vemos a continuación otro ejemplo en el que no se cumple que $\Phi \models \varphi$. Es decir, hay una valoración que cumple Φ y $\neg\varphi$. En estos casos, veremos que no se puede conseguir un *tableau* cerrado de $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$. Al intentar obtener un *tableau* cerrado, la complicación del método aumentará considerablemente pero también nos dará indicaciones sobre qué valoración de verdad satisface a Φ y $\neg\varphi$.

Ejemplo 1.52. Sea $\varphi = \neg(p_3 \rightarrow p_6)$ y Φ formado por estas seis proposiciones:

1. $p_1 \rightarrow (p_2 \vee p_3)$
2. $\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_4)$
3. $p_1 \rightarrow \neg p_6$
4. $\neg p_3 \rightarrow (p_4 \rightarrow p_1)$
5. $\neg(p_2 \wedge p_5)$
6. $p_2 \rightarrow p_5$

En la siguiente figura intentamos conseguir un *tableau* cerrado de $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$.

Como podemos ver, no conseguimos cerrar las ramas. En la rama que hemos indicado con flechas, no parece haber forma de encontrar una contradicción, y además tenemos en esta rama las proposiciones $\neg p_1$, $\neg p_2$, p_3 y p_6 . En este caso podemos imaginar que la rama no se puede cerrar y hay una valoración que cumple los elementos de esa rama. En efecto, solo tenemos 4 opciones en función de los valores de verdad que asociemos a p_4 y p_5 , y encontramos que la valoración dada por $v(p_1) = v(p_2) = v(p_5) = F, v(p_3) = v(p_4) = v(p_6) = V$ cumple Φ y $\neg\varphi$. Es decir, $\Phi \not\models \varphi$. Como veremos en breve, esto significa que no podemos encontrar un *tableau* cerrado para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$.



El último ejemplo muestra que hay muchas formas de intentar conseguir un *tableau* cerrado para un conjunto de fórmulas. Además, puede que dos formas distintas den lugar a *tableaux* con distinto número de proposiciones. Para obtener *tableaux* pequeños, nos conviene usar las reglas de construcción con la siguiente prioridad:

1. R_σ
2. R_α
3. R_β

Es decir, nos conviene aplicar siempre que sea posible la regla R_σ . Cuando no sea posible, aplicaremos la regla R_α . Si esta tampoco es posible, usaremos R_β .

1.8.2. Corrección

Recordemos que lo que motivó esta sección fue, dados un conjunto de fórmulas Φ y una fórmula φ , el demostrar que $\Phi \models \varphi$, usando el método de los *tableaux*. Por tanto, para que el método nos permita alcanzar este objetivo tiene que cumplir dos propiedades:

- *Compleitud*: $\Phi \models \varphi$ implica $\Phi \vdash_{tb} \varphi$. Es decir, si se cumple que $\Phi \models \varphi$, entonces podemos encontrar un *tableau* cerrado para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$.
- *Corrección*: $\Phi \vdash_{tb} \varphi$ implica $\Phi \models \varphi$. Es decir, si encontramos un *tableau* cerrado para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$, entonces se cumple que $\Phi \models \varphi$.

Comenzamos demostrando la propiedad de corrección. El siguiente resultado condensa las ideas expuestas hasta ahora:

Teorema 1.53. Sean $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ tal que $Sat(\Phi)$ y T *tableau* finito para Φ . Entonces existe una rama de T , r , tal que $Sat(\Gamma_r)$. Es más: si una valoración v cumple $v \models \Phi$, hay una rama r que cumple $v \models \Gamma_r$.

Demostración. Todo *tableau* finito T se construye partiendo de

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ | \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_k \end{array}$$

y aplican-

do las reglas de construcción de *tableaux* R_1, \dots, R_n . Nos interesa hacer inducción sobre el número de reglas empleadas, n .

Así pues, sea una valoración v tal que $v \models \Phi$.

Si $n = 0$, por la regla inicial tenemos una única rama r tal que $\Gamma_r = \{\varphi_1, \dots, \varphi_k\} \subseteq \Phi$. Como $v \models \Phi$, tenemos que $v \models \Gamma_r$.

Ahora sea $n > 0$, supongamos que el resultado se cumple para $n - 1$.

Sea Φ satisfactible, y sea T un *tableau* obtenido aplicando la regla inicial y otras reglas R_1, \dots, R_n . Es decir, T se obtiene aplicando la regla R_n al *tableau* T' obtenido aplicando las reglas R_1, \dots, R_{n-1} . Por hipótesis de inducción, tenemos una rama r de T' tal que $v \models \Gamma_r$. Al aplicar la regla R_n extendemos una rama de T' para obtener T .

Si la rama que extendemos no es r , entonces r también es una rama de T , por tanto, como dice el enunciado, $v \models \Gamma_r$ para una rama r de T .

Si la rama que extendemos es r , distinguimos los siguientes casos:

- $R_n = R_\sigma$. Para cierta fórmula $\sigma \in \Gamma_r$, añadimos σ_1 tal que $\sigma \sim \sigma_1$. Por tanto, como $v \models \Gamma_r$, en particular $v \models \sigma$ y así $v \models \sigma_1$. Entonces $v \models \Gamma_r \cup \{\sigma_1\}$, es decir, la rama r' formada al añadir σ_1 a r es la buscada.
- $R_n = R_\alpha$. Para cierta fórmula $\alpha \in \Gamma_r$, añadimos α_1, α_2 tales que $\alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2$. Por tanto, como $v \models \Gamma_r$, en particular $v \models \alpha$ y así $v \models \alpha_1$ y $v \models \alpha_2$. Entonces $v \models \Gamma_r \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$, es decir, la rama r' formada al añadir α_1 y α_2 a r es la buscada.
- $R_n = R_\beta$. Para cierta fórmula $\beta \in \Gamma_r$, añadimos β_1, β_2 tales que $\beta \sim \beta_1 \vee \beta_2$, formando dos nuevas ramas. Como $v \models \Gamma_r$, en particular $v \models \beta$. Esto quiere decir que o bien $v \models \beta_1$ o bien $v \models \beta_2$. En el primer caso, $v \models \Gamma_r \cup \{\beta_1\}$, por tanto la rama r_1 formada añadiendo β_1 a r cumple que $v \models \Gamma_{r_1}$. En el segundo caso, $v \models \Gamma_r \cup \{\beta_2\}$, por tanto la rama r_2 formada añadiendo β_2 a r cumple que $v \models \Gamma_{r_2}$. En ambos casos, tenemos una rama r' de T tal que $v \models r'$, por tanto se cumple el enunciado.
- $R_n = R_{hip}$. Añadimos a la rama r cierta $\varphi \in \Phi$. Por hipótesis, tenemos que $v \models \Phi$ y $v \models \Gamma_r$, luego en especial $v \models \Gamma_r \cup \{\varphi\}$. Es decir, la rama r' formada al añadir a r la hipótesis cumple $v \models r'$.

□

Corolario 1.54. Sea $\Phi \subseteq PROP_{SP}$. Si Φ tiene un *tableau* cerrado, entonces $Insat(\Phi)$.

Demostración. Se trata de la forma contrapositiva del enunciado 1.53. □

Corolario 1.55. (Corrección) Sean $\Phi \subseteq PROP_{SP}, \varphi \in PROP_{SP}$. Si $\Phi \vdash_{tb} \varphi$, entonces $\Phi \models \varphi$.

Demostración. Si $\Phi \vdash_{tb} \varphi$ entonces $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$ tiene un *tableau* cerrado. Por 1.54 se sigue que $Insat(\Phi \cup \{\neg\varphi\})$, es decir, aplicando 1.30, $\Phi \models \varphi$. □

1.8.3. Completitud

Ahora pasamos a estudiar la completitud. Para ello es necesario introducir previamente varias nociones:

Definición 1.56. $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ se dice *coherente* si no existe φ tal que $\varphi, \neg\varphi \in \Phi$ y $\perp \notin \Phi$.

Definición 1.57. $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ se dice *saturado* si, usando la notación de las σ , α y β -fórmulas:

- $\sigma \in \Phi$ implica que $\sigma_1 \in \Phi$.
- $\alpha \in \Phi$ implica que $\alpha_1, \alpha_2 \in \Phi$.
- $\beta \in \Phi$ implica que $\beta_1 \in \Phi$ o $\beta_2 \in \Phi$.

Por ejemplo, si a un *tableau* T no le podemos aplicar más reglas de forma que se añadan nuevas proposiciones al *tableau*, entonces Γ_T es saturado.

Definición 1.58. $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ se dice *de Hintikka* si es coherente y saturado.

En relación a los *tableaux*, nos gustaría poder tratar la ‘complejidad’ de las distintas fórmulas. Esto nos lleva a la siguiente:

Definición 1.59. Definimos la norma $||\cdot|| : PROP_{SP} \rightarrow \mathbb{N}$ dada recursivamente por:

- $||\varphi|| = 0$, para toda $\varphi \in AT$.
- $||\neg\varphi|| = 1 + ||\varphi||$.
- $||\varphi_1 \wedge \varphi_2|| = 1 + ||\varphi_1|| + ||\varphi_2||$.
- $||\varphi_1 \vee \varphi_2|| = 1 + ||\varphi_1|| + ||\varphi_2||$.
- $||\varphi_1 \rightarrow \varphi_2|| = 2 + ||\varphi_1|| + ||\varphi_2||$.
- $||\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2|| = 5 + 2||\varphi_1|| + 2||\varphi_2||$.

La siguiente proposición es fácil de demostrar por casos y justifica nuestro tratamiento de las descomposiciones de las σ , α y β -fórmulas como expresiones reducidas de las fórmulas originales:

Proposición 1.60. Sean σ , α y β σ , α y β -fórmulas, respectivamente, con $\sigma \sim \sigma_1$, $\alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2$, $\beta \sim \beta_1 \vee \beta_2$. Entonces:

1. $||\sigma|| > ||\sigma_1||$.
2. $||\alpha|| > ||\alpha_1||$ y $||\alpha|| > ||\alpha_2||$.
3. $||\beta|| > ||\beta_1||$ y $||\beta|| > ||\beta_2||$.

Definición 1.61. (Valoración de Hintikka) Sea $H \subseteq PROP_{SP}$ de Hintikka. Definimos la valoración $v_H : SP \rightarrow \{V, F\}$ como:

- $v_H(p) = V$, si $p \in H$.
- $v_H(p) = F$, si $\neg p \in H$.

En caso de que $p, \neg p \notin H$, va a ser para nuestros propósitos indiferente el valor que toma v_H . Para que v_H esté bien definida, podemos suponer por ejemplo $v_H(p) = V$ si $p, \neg p \notin H$.

Proposición 1.62. Si $H \subseteq PROP_{SP}$ es de Hintikka, $v_H \models H$. En particular, H es satisfactible.

Demostración. Tenemos que demostrar que para toda $\varphi \in H$, $v_H \models \varphi$. Para ello procedemos por inducción sobre $\|\varphi\|$. Es necesario distinguir dos casos base primero.

Si $\|\varphi\| = 0$ entonces $\varphi \in AT$ y, al ser H coherente, $\varphi \in SP$ o $\varphi = \top$. Si se da lo primero, entonces se da el resultado por la definición de v_H . Lo segundo es trivial, porque toda valoración satisface a \top .

Si $\|\varphi\| = 1$ entonces solo puede ocurrir, por la coherencia de H , que $\varphi = \neg p$, para $p \in SP$; o que $\varphi = \top \vee \perp$. En el primer caso obtenemos que $v_H(p) = F$ y por tanto que $\hat{v}_H(\neg p) = V$. En el segundo caso se tiene claramente que $\hat{v}_H(\top \vee \perp) = V$.

Sea φ con $\|\varphi\| > 1$, supongamos que el resultado se cumple para todo $n < \|\varphi\|$. Por la proposición 1.49 tenemos las siguientes posibilidades:

- $\varphi = \sigma$ es σ -fórmula, con $\sigma \sim \sigma_1$. Al ser H saturado, $\sigma_1 \in H$. Sabemos de 1.60 que $\|\sigma\| > \|\sigma_1\|$, luego podemos aplicar la hipótesis de inducción y así $\hat{v}_H(\sigma_1) = V$, de lo que se sigue que $\hat{v}_H(\sigma) = \hat{v}_H(\sigma_1) = V$.
- $\varphi = \alpha$ es α -fórmula, con $\alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2$. Al ser H saturado, $\alpha_1, \alpha_2 \in H$ y, por 1.60, $\|\alpha\| > \|\alpha_1\|$ y $\|\alpha\| > \|\alpha_2\|$. Aplicando la hipótesis de inducción, $\hat{v}_H(\alpha_1) = \hat{v}_H(\alpha_2) = V$, luego $\hat{v}_H(\alpha) = \hat{v}_H(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = V$.
- $\varphi = \beta$ es β -fórmula, con $\beta \sim \beta_1 \vee \beta_2$. Por 1.60, $\|\beta\| > \|\beta_1\|$ y $\|\beta\| > \|\beta_2\|$. Además, como H es saturado, o bien $\beta_1 \in H$ y, por hipótesis de inducción, $\hat{v}(\beta_1) = V$, o bien $\beta_2 \in H$ y, por hipótesis de inducción, $\hat{v}(\beta_2) = V$. En ambos casos, $\hat{v}(\beta) = \hat{v}(\beta_1 \vee \beta_2) = V$.

□

Corolario 1.63. Sean $\Phi \subseteq PROP_{SP}$, T tableau abierto de Φ . Si:

1. Existe una rama abierta de T , r , tal que $\Phi \subseteq \Gamma_r$.
2. Γ_r es de Hintikka.

entonces Φ es satisfactible.

Demostración. Como Γ_r es de Hintikka, por 1.62 es satisfactible, por tanto como $\Phi \subseteq \Gamma_r$, Φ es satisfactible. □

Esto motiva la siguiente definición:

Definición 1.64. Sean $\Phi \subseteq PROP_{SP}$, T *tableau* de Φ . T se dice *completo* si toda rama abierta de T , r , verifica:

- $\Phi \subseteq \Gamma_r$.
- Γ_r es de Hintikka.

Proposición 1.65. Sea $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ *finito*¹². Entonces existe un *tableau* completo para Φ .

Demostración. En el siguiente capítulo probaremos una generalización de este teorema. □

Corolario 1.66. (*Completitud*) Sea $\Phi \subseteq PROP_{SP}$ *finito*. Si $\Phi \models \varphi$ entonces $\varphi \vdash_{tb} \varphi$.

Demostración. $\Phi \models \varphi$ equivale por 1.30 a $Insat(\Phi \cup \{\neg\varphi\})$. Se sigue de 1.65 que podemos considerar un *tableau* T completo para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$. Veamos que T no puede tener ramas abiertas:

Si T tiene una rama abierta r , por definición de *tableau* completo, $\Phi \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Gamma_r$ y Γ_r es de Hintikka. Pero entonces, por el corolario 1.63, $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$ sería satisfactible, lo cual contradice el enunciado.

Por tanto el *tableau* es cerrado, es decir, $\Phi \vdash_{tb} \varphi$. □

¹²Se puede prescindir de esta hipótesis, es decir, el enunciado sigue siendo cierto si Φ es infinito.

2 | Lógica de primer orden

2.1. Introducción

En el anterior capítulo, construimos con éxito un lenguaje formal que nos permitía traducir frases informales del español a expresiones formales, además de formalizar los conceptos de implicación y equivalencia lógica. Sin embargo, se puede reprochar que la lógica proposicional es demasiado *simple* en el sentido siguiente:

Consideremos el silogismo:

Todo hombre es mortal
Sócrates es un hombre.

Sócrates es mortal \therefore

En este caso, podríamos pensar que la consecuencia lógica se trata de una del tipo $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$. Pero, por otro lado, parece evidente que depende de elementos más básicos que los símbolos de proposición. Sería, entonces, más conveniente una formalización del tipo:

Para todo x , si x es hombre entonces es mortal
Sócrates es hombre.

Sócrates es mortal \therefore

Hemos empleado los términos ‘hombre’, ‘mortal’ y ‘para todo’ en un sentido puramente formal. Como ocurría con las proposiciones, existen múltiples frases y expresiones informales distintas que corresponden al silogismo que acabamos de exponer.

A continuación vamos a definir, igual que en lógica proposicional, el alfabeto que usaremos para construir fórmulas en los lenguajes de primer orden. Pero

además, en este caso, habrá múltiples lenguajes de primer orden, y cada uno tendrá unos ciertos elementos que lo caractericen, que resumimos en el concepto de ‘signatura’:

Definición 2.1. Una *signatura* S es una tupla $\langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ donde:

- Ct_S es el conjunto de símbolos de constante.
- Fn_S es el conjunto de símbolos de función con determinada aridad¹.
- Pd_S es el conjunto de símbolos de predicado con determinada aridad.

Dado un símbolo Γ de función o predicado, denotamos por $\Gamma|_n$ que es n -ario.

Ejemplo 2.2. La *signatura* $Nat := \langle \{0\}, \{+|_2, s|_1\}, \{<|_2\} \rangle$ para los números naturales. Es decir:

- Hay un símbolo de constante, 0.
- Los símbolos de función serán el símbolo de función binaria $+$, que llamaremos ‘suma’, y el símbolo de función 1-aria, s , que llamaremos ‘sucesor’.
- Tenemos un símbolo de predicado 2-ario, $<$.

A veces en la *signatura* Nat incluiremos un otro símbolo de función 2-aria, $*$, que llamaremos ‘producto’.

Definición 2.3. Dada la *signatura* S , definimos el alfabeto asociado como:

$$A_S := Ct_S \cup Fn_S \cup Pd_S \cup Var \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \top, \perp\} \cup \{(\,, \,)\} \cup \{\exists, \forall\} \cup \{=\},$$

donde:

- Ct_S, Fn_S, Pd_S vienen dados por 2.1.
- Var son los símbolos de variable: $\{x, y, z, x_1, \dots\}$.
- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \top, \perp, (\,, \,)$ son los símbolos de conectiva y los paréntesis, al igual que en lógica proposicional.
- \exists (para todo) y \forall (existe) son los *cuantificadores lógicos*. Llamamos a \forall *cuantificador universal* y a \exists *cuantificador existencial*.
- $=$, el símbolo de igualdad. Usamos \doteq en vez de $=$ para distinguirlo de la igualdad de fórmulas. Por ejemplo, si escribimos $\varphi = t \doteq s$ queremos decir que φ es igual a $t \doteq s$.

Como ocurría con las proposiciones, nos interesa distinguir las expresiones del alfabeto anterior que están bien formadas. Para ello, primero necesitaremos definir los *términos*, que podemos interpretar como las expresiones que usaremos para nombrar objetos, y después las *fórmulas*, expresiones que usaremos para denotar afirmaciones sobre los objetos.

¹Por ahora, nos referimos por *aridad* de un símbolo de función o de predicado como el número de argumentos que admite. Más adelante especificaremos lo que significa esta idea.

Definición 2.4. Dada la signatura S , el *conjunto de términos* de S , $TERM_S$, es el menor subconjunto de A_S^* que verifica:²

1. $Ct_S \subseteq TERM_S$.
2. $Var \subseteq TERM_S$.
3. Si $f|_n \in Fn_S$ y $t_1, \dots, t_n \in TERM_S$, entonces $f(t_1, \dots, t_n) \in TERM_S$.

Si f es una función 2-aria, a veces usaremos la notación tradicional xfy en vez de $f(x, y)$. Por ejemplo, en Nat diremos $x + y$ en vez de $+(x, y)$.

Ejemplo 2.5. Siguiendo con la signatura Nat , algunos ejemplos de elementos de $TERM_{NAT}$ serían $0, s(s(0)), x, y, z, +(s(s(0)), s(0))$ y $s(+(x, s(s(s(0)))))$.

La siguiente proposición nos da una definición constructiva de $TERM_S$:

Proposición 2.6. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Definimos los conjuntos:

$$T_S^0 := Ct_S \cup Var$$

$$T_S^{n+1} := T_S^n \cup \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{f(t_1, \dots, t_k) \mid t_1, \dots, t_k \in T_S^n, f|_k \in Fn_S\}$$

Entonces $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} T_S^i = TERM_S$.

Demostración. La demostración es análoga a la de 1.8. □

Ahora podemos construir fórmulas a partir de estos elementos básicos que ya hemos definido. Comenzamos por

Definición 2.7. Dada la signatura S , el *conjunto de fórmulas atómicas* de S , $FORMAT_S$, es el menor subconjunto de A_S^* que verifica:

1. Si $t_1, t_2 \in TERM_S$, $t_1 \doteq t_2 \in FORMAT_S$.
2. Si $R|_n \in Pd_S$ y $t_1, \dots, t_n \in TERM_S$, $R(t_1, \dots, t_n) \in FORMAT_S$.
3. $\top, \perp \in FORMAT_S$.

Si R es un predicado 2-ario, a veces usaremos la notación tradicional xRy en vez de $R(x, y)$. Por ejemplo, en Nat diremos $x < y$ en vez de $<(x, y)$.

Definición 2.8. Dada la signatura S , el *conjunto de fórmulas* de S , $FORM_S$, es el menor subconjunto de A_S^* que verifica:

1. $FORMAT_S \subseteq FORM_S$.
2. Si $\varphi_1, \varphi_2 \in FORM_S$, $(\neg\varphi_1), (\varphi_1 \Box \varphi_2) \in FORM_S$.
3. Si $x \in Var$ y $\varphi \in FORM_S$, $(Qx\varphi) \in FORM_S$, siendo $Q \in \{\forall, \exists\}$

²Recordemos que A_S^* es el cierre de Kleene de A_S , como definimos en 1.4.

A partir de ahora, usaremos para mayor brevedad el símbolo Q como intercambiable por \forall o \exists a no ser que se indique lo contrario.

Damos una definición constructiva de $FORM_S$:

Proposición 2.9. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ *signatura*. Definimos los conjuntos:

$$F_S^0 := FORMAT_S$$

$$F_S^{n+1} := F_S^n \cup \{(\neg\varphi) \mid \varphi \in F_S^n\} \cup \{(\varphi \Box \psi) \mid \varphi, \psi \in F_S^n\} \cup \{(Qx\varphi) \mid x \in Var, \varphi \in F_S^n\}$$

$$\text{Entonces } \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_S^i = FORM_S.$$

Demostración. De nuevo, la demostración es análoga a la de 1.8. \square

2.2. Inducción estructural y recursión

Tal y como ocurría con la lógica proposicional, la recursión y la inducción estructural son las dos principales herramientas empleadas en las definiciones y demostraciones de la lógica de primer orden. Sin embargo, ahora tenemos que tratar separadamente los conjuntos $TERM_S$ y $FORM_S$ asociados a cierta *signatura* S .

Comenzamos con los teoremas de inducción estructural y recursión para $TERM_S$, dada una *signatura* $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$:

Proposición 2.10. (*Inducción estructural*) Sean $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ una *signatura* y P una *propiedad*. Si se cumple que:

1. P es válida para todo elemento de T_S^0 .
2. Sea $f|_k \in Fn_S$. Si P es válida para todo elemento de T_S^n , entonces es válida para $f(t_1, \dots, t_k)$, con $t_1, \dots, t_k \in T_S^n$.

Entonces P es válida para todo elemento de $TERM_S$.

Demostración. Si la propiedad P cumple 1, 2 y 3, entonces el conjunto de términos que cumplen P cumple las tres propiedades de la definición 2.4, por tanto contiene a $TERM_S$. \square

Proposición 2.11. El *esquema de definición recursiva* da como resultado una *única función*, es decir, dadas:

1. $F_0 : Ct_S \cup Var \rightarrow A$.
2. $F_f : A^k \rightarrow A$, para cada función $f|_k \in Fn_S$.

existe una *única función* $F : TERM_S \rightarrow A$ tal que:

1. $F(t) = F_0(t)$, para todo $t \in Ct_S \cup Var$.

2. $F(f(t_1, \dots, t_k)) = F_f(F(t_1), \dots, F(t_k))$, para cada $f|_k \in Fn_S$ y $t_1, \dots, t_k \in TERM_S$.

Demostración. Se omite la demostración. \square

Ejemplo 2.12. Una función que nos será de utilidad será var , que nos lleva cada elemento de $TERM_S$ al conjunto de variables que aparecen en él. La definimos recursivamente como:

1. Caso base: $var_0 : Ct_S \cup Var \rightarrow \mathcal{P}(Var)$, dada por $var_0(c) = \emptyset$ si $c \in Ct_S$ y $var(x) = \{x\}$ si $x \in Var$.
2. Caso recursivo: Dado $f|_k \in Fn_S$, $var_f : (\mathcal{P}(Var))^k \rightarrow \mathcal{P}(Var)$, dada por $var_f(f(t_1, \dots, t_k)) = \bigcup_{i=1}^k var(t_i)$.

Ahora enunciamos los teoremas de inducción estructural y recursión para $FORM_S$, dada una signature $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$:

Proposición 2.13. (*Inducción estructural*) Sean $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ una signature y P una propiedad. Si se cumple que:

1. P es válida para todo elemento de $FORMAT_S$.
2. Si $\varphi_1, \varphi_2 \in FORM_S$ y se cumplen $P(\varphi_1), P(\varphi_2)$, entonces tenemos $P((\neg\varphi_1))$ y $P((\varphi_1 \square \varphi_2))$.
3. Si $x \in Var$ y $\varphi \in FORM_S$, y se cumple $P(\varphi)$, entonces tenemos $P((Qx\varphi))$.

Entonces P es válida para todo elemento de $FORM_S$.

Demostración. Si la propiedad P cumple 1, 2 y 3, entonces el conjunto de términos que cumplen P cumple las tres propiedades de la definición 2.8, por tanto contiene a $FORM_S$. \square

Proposición 2.14. El esquema de definición recursiva da como resultado una única función, es decir, dadas:

1. $F_{AT} : FORMAT_S \rightarrow A$.
2. $F_{\neg} : A \rightarrow A$.
3. $F_{\square} : A \times A \rightarrow A$.
4. $F_Q : Var \times A \rightarrow A$.

existe una única función $F : FORM_S \rightarrow A$ tal que:

1. $F(\varphi) = F_{AT}(\varphi)$, para toda $\varphi \in FORMAT_S$.
2. $F((\neg\varphi)) = F_{\neg}(F(\varphi))$.
3. $F((\varphi_1 \square \varphi_2)) = F_{\square}(F(\varphi_1), F(\varphi_2))$.

4. $F((Qx\varphi)) = F_Q(x, F(\varphi))$.

Demostración. Se omite la demostración. \square

Ejemplo 2.15. Extendamos la función var al conjunto $FORM_S$. Por comodidad, omitimos las funciones auxiliares:

1. Caso base:

- $var(\top) = var(\perp) = \emptyset$.
- Sean $p|_k \in Pd_S$, $t_1, \dots, t_n \in TERM_S$. Entonces $var(p(t_1, \dots, t_n)) = \bigcup_{i=1}^k var(t_i)$.
- Sean $t, s \in TERM_S$. Entonces $var(t \doteq s) = var(t) \cup var(s)$.

2. Caso recursivo:

- $var((\neg\varphi)) = var(\varphi)$.
- $var((\varphi \square \psi)) = var(\varphi) \cup var(\psi)$.
- $var((Qx\varphi)) = \{x\} \cup var(\varphi)$.

2.3. Variables libres y ligadas

Consideremos las siguientes fórmulas de primer orden:

- $\forall x\ x \doteq 3$
- $x \doteq 3$

La primera fórmula se puede traducir informalmente como ‘para todo x , x es igual a 3’. Intuitivamente, podemos decir que el cuantificador \forall está afectando al significado de x . Sin embargo, en la segunda fórmula, x no aparece afectada por ningún cuantificador. En general, diremos que una variable es *ligada* en una fórmula φ si siempre aparece afectada por un cuantificador, como en el primer ejemplo, y diremos que es una variable *libre* en φ si aparece alguna vez sin estar afectada por un cuantificador. Formalicemos estos conceptos:

Definición 2.16. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Definimos recursivamente la función $lib : FORM_S \rightarrow \mathcal{P}(Var)$, que nos lleva cada fórmula al conjunto de sus variables libres:

1. Caso base: Sea $\varphi \in FORMAT_S$. Entonces, $lib(\varphi) = var(\varphi)$.

2. Caso recursivo:

- $lib(\neg\varphi) = lib(\varphi)$.
- $lib(\varphi \square \psi) = lib(\varphi) \cup lib(\psi)$.
- $lib(Qx\varphi) = lib(\varphi) \setminus \{x\}$.

Definición 2.17. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Definimos el *conjunto de sentencias*, $SENT_S$, como el formado por aquellas $\varphi \in FORM_S$ tales que $lib(\varphi) = \emptyset$.

2.4. Álgebras e interpretaciones

Hasta ahora hemos venido considerando cuestiones sintácticas sobre las fórmulas. Lo que queremos ahora es abordar su semántica, esto es, su comportamiento cuando les damos una interpretación determinada. Comenzamos definiendo la estructura de la que tomamos el significado de los símbolos de una signatura:

Definición 2.18. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ una signatura. Una S -álgebra es una tupla

$$\mathfrak{A} := \langle A, \{c^{\mathfrak{A}} \mid c \in Ct_S\}, \{f^{\mathfrak{A}} \mid f \in Fn_S\}, \{p^{\mathfrak{A}} \mid p \in Pd_S\} \rangle$$

De modo que:

- A , el *conjunto soporte*, verifica que $A \neq \emptyset$.
- Si $c \in Ct_S$, $c^{\mathfrak{A}} \in A$.
- Si $f|_k \in Fn_S$, $f^{\mathfrak{A}} : A^k \rightarrow A$.
- Si $p|_k \in Pd_S$, $p^{\mathfrak{A}} : A^k \rightarrow Bool$.

Por convenio, un símbolo f de función 0-aria tendrá asociada una función $f^{\mathfrak{A}} : \{\emptyset\} \rightarrow A$. Es decir, será una función desde el conjunto de un elemento $\{\emptyset\}$ en A . Está claro que estas funciones pueden identificarse con elementos de A , identificando f con $f(\emptyset)$. De modo que las funciones 0-arias van a llevar a cabo esencialmente la misma función que las constantes, y de hecho, aunque aquí usaremos constantes, toda la lógica de primer orden se puede desarrollar sin constantes usando funciones 0-arias.

De igual forma, un símbolo p de predicado 0-ario tendrá asociada una función $p^{\mathfrak{A}} : \{\emptyset\} \rightarrow Bool$. Es decir, igual que con las funciones 0-arias, podemos asociar a cada predicado 0-ario un valor de $Bool$, V o F . En esto se asemejarán a los símbolos de proposición de lógica proposicional, a los cuales asignábamos (mediante las asignaciones de verdad) un valor de $Bool$.

Ejemplo 2.19. Consideremos la signatura $Nat := \langle \{0\}, \{+|_2, *|_2, s|_1\}, \{<|_2\} \rangle$ que presentamos previamente. La forma natural (aunque no la única) de asignar significados a estos símbolos sería la S -álgebra:

$$\mathfrak{A}_{Nat} := \langle \mathbb{N}, \{0^{\mathfrak{A}_{Nat}}\}, \{+^{\mathfrak{A}_{Nat}}, *^{\mathfrak{A}_{Nat}}, s^{\mathfrak{A}_{Nat}}\}, \{<^{\mathfrak{A}_{Nat}}\} \rangle, \text{ donde:}$$

- \mathbb{N} es el conjunto de los números naturales: $\{0, 1, 2, \dots\}$.
- $0^{\mathfrak{A}_{Nat}}$ será el número natural 0.

- $+^{\mathfrak{A}_{Nat}}$ será la función suma en los naturales, $+ : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}; (m, n) \mapsto m + n$.
- $*^{\mathfrak{A}_{Nat}}$ será la función producto en los naturales, $* : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}; (m, n) \mapsto m * n$.
- $s^{\mathfrak{A}_{Nat}}$ será la función sucesor en los naturales, $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}; n \mapsto n + 1$.
- $<^{\mathfrak{A}_{Nat}} : \mathbb{N}^2 \rightarrow Bool$ será la función que cumpla $<^{\mathfrak{A}_{Nat}}(m, n) = V$ si $m < n$, y $<^{\mathfrak{A}_{Nat}}(m, n) = F$ en caso contrario. Es decir, $<^{\mathfrak{A}_{Nat}}(m, n)$ será verdadero si y solo si $m < n$.

Es importante distinguir los símbolos de sus objetos asociados, ya que en algunos casos, como 0, suma y producto en este ejemplo, representamos igual ambas cosas. En el siguiente ejemplo habrá una clara distinción entre los símbolos y sus objetos asociados.

Ejemplo 2.20. Vamos a ver otro ejemplo de álgebra para la signatura Nat . Sea $\mathfrak{A} = \langle \{\triangle, \bigcirc\}, \{0^{\mathfrak{A}}\}, \{+^{\mathfrak{A}}, *^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}}\}, \{<^{\mathfrak{A}}\} \rangle$ tal que:

- $0^{\mathfrak{A}} = \triangle$.
- $s^{\mathfrak{A}} : \{\triangle, \bigcirc\} \rightarrow \{\triangle, \bigcirc\}, x \mapsto \triangle$.
- $*^{\mathfrak{A}}, +^{\mathfrak{A}} : \{\triangle, \bigcirc\}^2 \rightarrow \{\triangle, \bigcirc\}, (x, y) \mapsto \bigcirc$.
- $<^{\mathfrak{A}} : \{\triangle, \bigcirc\}^2 \rightarrow Bool, (x, y) \mapsto V$.

Como veremos en interpretaciones, la expresión

$$*(+(s(0), s(0)), s(s(s(0))))$$

en \mathfrak{A} se refiere a \bigcirc ya que, desarrollando, esa expresión corresponde a:

$$\begin{aligned} & *^{\mathfrak{A}}(+^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(0^{\mathfrak{A}}), s^{\mathfrak{A}}(0^{\mathfrak{A}})), s^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(0^{\mathfrak{A}})))) \\ &= *^{\mathfrak{A}}(+^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(\triangle), s^{\mathfrak{A}}(\triangle)), s^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(\triangle)))) \\ &= *^{\mathfrak{A}}(+^{\mathfrak{A}}(\triangle, \triangle), s^{\mathfrak{A}}(s^{\mathfrak{A}}(\triangle))) \\ &= *^{\mathfrak{A}}(\bigcirc, s^{\mathfrak{A}}(\triangle)) \\ &= *^{\mathfrak{A}}(\bigcirc, \triangle) \\ &= \bigcirc \end{aligned}$$

, mientras que en \mathfrak{A}_{Nat} podemos ver de forma similar que la expresión se refiere a 6.

Sin embargo, si intentamos ver a qué se refiere el término $+(s(x), s(0))$, tiene una variable que todavía no sabemos como interpretar. Informalmente, las variables suelen referirse a objetos que no hemos determinado. En nuestra segunda álgebra, x podría referirse a \triangle o a \bigcirc . En ambos casos, $+(s(x), s(0))$ se refiere a \bigcirc en \mathfrak{A} . Sin embargo, en \mathfrak{A}_{Nat} , el valor que tome la expresión dependerá del valor que tome la x .

Lo anterior muestra que es necesario definir una función especial para dotar de significado a las variables:

Definición 2.21. Sea S signatura. Una S -interpretación es una tupla $\mathfrak{I} := \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$ con:

- \mathfrak{A} es S -álgebra de soporte A .
- $\sigma : Var \rightarrow A$.

Ejemplo 2.22. Así, en el ejemplo anterior, tomando una Nat -interpretación $\sigma : Var \rightarrow \mathbb{N}$, podemos interpretar $+(s(x), s(0))$: si por ejemplo $\sigma(x) = 7$, estamos ‘asignando’ a la variable x el valor 7, por tanto a la expresión total le asignaríamos el valor:

$$\begin{aligned} & +^{\mathfrak{A}_{Nat}}(s^{\mathfrak{A}_{Nat}}(\sigma(x)), s^{\mathfrak{A}_{Nat}}(0^{\mathfrak{A}_{Nat}})) \\ & = +^{\mathfrak{A}_{Nat}}(s^{\mathfrak{A}_{Nat}}(7), s^{\mathfrak{A}_{Nat}}(0)) \\ & = +^{\mathfrak{A}_{Nat}}(8, 1) \\ & = 9 \end{aligned}$$

Ahora extendemos este concepto a términos, como ya hemos hecho intuitivamente en los dos últimos ejemplos:

Definición 2.23. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura, $\mathfrak{I} := \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$ S -interpretación. Definimos recursivamente la *interpretación de los términos* $t \in TERM_S$, $t^{\mathfrak{I}}$, como:

- Caso base:
 - Si $c \in Ct_S$, $c^{\mathfrak{I}} = c^{\mathfrak{A}}$.
 - Si $x \in Var$, $x^{\mathfrak{I}} = \sigma(x)$.
- Caso recursivo:
 - Si $f|_k \in Fn_S$, $t_1, \dots, t_k \in TERM_S$, $f(t_1, \dots, t_k)^{\mathfrak{I}} = f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{I}}, \dots, t_k^{\mathfrak{I}})$.

Antes de pasar a la interpretación de fórmulas, conviene establecer la siguiente notación: dada la S -interpretación $\mathfrak{I} := \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$, por el símbolo $\mathfrak{I}[a/x]$ designamos la S -interpretación determinada por $\langle \mathfrak{A}, \sigma[a/x] \rangle$.³

Definición 2.24. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$, $\mathfrak{I} := \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$ S -interpretación, con A conjunto soporte. Definimos recursivamente la *interpretación de las fórmulas* $\varphi \in FORM_S$, $\varphi^{\mathfrak{I}}$, como:

- Caso base:
 - Si $\varphi = \top$, $\varphi^{\mathfrak{I}} = V$.
 - Si $\varphi = \perp$, $\varphi^{\mathfrak{I}} = F$.

³Recordemos que denotamos respectivamente por $f[b/a](x)$ a $f(x)$, si $x \neq a$, y a b , si $x = a$.

- Si $\varphi = t \doteq s$, con $t, s \in TERM_S$; entonces $\varphi^{\mathcal{I}} = V$ si $t^{\mathcal{I}} = s^{\mathcal{I}}$ y $\varphi^{\mathcal{I}} = F$ en otro caso.
- Si $\varphi = p(t_1, \dots, t_k)$, con $t_1, \dots, t_k \in TERM_S$, $p|_k \in Pd_S$; entonces $\varphi^{\mathcal{I}} = V$ si $p^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{I}}, \dots, t_k^{\mathcal{I}}) = V$ y $\varphi^{\mathcal{I}} = F$ en otro caso.

■ Caso recursivo:

- Si $\varphi = \neg\varphi_1$, $\varphi^{\mathcal{I}} = v_{\neg}(\varphi_1^{\mathcal{I}})$.
- Si $\varphi = \varphi_1 \Box \varphi_2$, $\varphi^{\mathcal{I}} = v_{\Box}(\varphi_1^{\mathcal{I}}, \varphi_2^{\mathcal{I}})$.
- Si $\varphi = \forall x \varphi_1$, con $x \in Var$; entonces $\varphi^{\mathcal{I}} = V$, si para todo $a \in A$, $\varphi_1^{\mathcal{I}[a/x]} = V$; y $\varphi^{\mathcal{I}} = F$ en otro caso.
- Si $\varphi = \exists x \varphi_1$, con $x \in Var$; entonces $\varphi^{\mathcal{I}} = V$, si existe $a \in A$ tal que $\varphi_1^{\mathcal{I}[a/x]} = V$; y $\varphi^{\mathcal{I}} = F$ en otro caso.

Describamos el concepto de *consecuencia lógica* para lógica de primer orden:

Definición 2.25. Sea S signatura. Sean $\Phi \subseteq FORM_S$, $\varphi \in FORM_S$, \mathcal{I} S -interpretación. Decimos que \mathcal{I} *satisface* φ , $\mathcal{I} \models \varphi$, si $\varphi^{\mathcal{I}} = V$. Análogamente, *satisface* Φ , $\mathcal{I} \models \Phi$, si $\psi^{\mathcal{I}} = V$, para cada $\psi \in \Phi$.

Definición 2.26. Sea S signatura. Dados $\Phi \subseteq FORM_S$ y $\varphi \in FORM_S$, decimos que φ es *consecuencia lógica* de Φ , $\Phi \models \varphi$, si toda S -interpretación \mathcal{I} tal que $\mathcal{I} \models \Phi$ verifica $\mathcal{I} \models \varphi$.

Está claro que $\emptyset \models \varphi$ es equivalente a que toda interpretación verifica φ . En estos casos, podemos escribir $\models \varphi$ en vez de $\emptyset \models \varphi$.

Definición 2.27. Sea S signatura. $\Phi \subseteq FORM_S$ se dice *satisfactible* si existe una S -interpretación \mathcal{I} tal que $\mathcal{I} \models \Phi$. Φ se dice *insatisfactible* si no existe tal S -interpretación \mathcal{I} .

Fijada una signatura S , podemos clasificar cada fórmula φ como:

- *Satisfactible*, si existe alguna S -interpretación \mathcal{I} tal que $\mathcal{I} \models \varphi$.
 - *Tautología*, si $\mathcal{I} \models \varphi$ para toda S -interpretación \mathcal{I} , es decir, $\models \varphi$
 - *Contingencia*, si es satisfactible pero no tautología.
- *Contradicción*, si no es satisfactible.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.28. La fórmula $\varphi = \exists x x \doteq x$ siempre es una tautología. En esta afirmación juega un papel importante que el conjunto soporte, A , no es vacío. Por tanto dada una signatura S y una S -interpretación \mathcal{I} , existe un elemento $a \in A$. De modo que llamando $\varphi_1 = x \doteq x$, tenemos que $\varphi_1^{\mathcal{I}[a/x]} = V$, ya que se cumple que $a = a$. Como hay un elemento $a \in A$ tal que $\varphi_1^{\mathcal{I}[a/x]} = V$, tenemos que $\varphi^{\mathcal{I}} = V$. De hecho, como esto sucede para todo elemento $a \in A$, también será una tautología la fórmula $\forall x x \doteq x$.

Ejemplo 2.29. Consideremos la signatura $S := \langle \emptyset, \emptyset, \{R|_2\} \rangle$ y las fórmulas

$$\varphi := \exists x \forall y R(x, y)$$

$$\psi := \forall y \exists x R(x, y)$$

Veamos que $\varphi \models \psi$. Para ello, vamos a ver qué significan φ y ψ en términos del conjunto soporte.

Sea \mathcal{I} S -interpretación de soporte A tal que $\mathcal{I} \models \varphi$. Entonces, existe un $a \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x] \models \forall y R(x, y)$. Por tanto, para todo $b \in A$ se cumple que $\mathcal{I}[a/x][b/y] \models R(x, y)$.

Es decir, $\mathcal{I} \models \varphi$ significa que existe un elemento $a \in A$ que está relacionado con todos los elementos del conjunto soporte A mediante la relación R .

Ahora, sea \mathcal{I} S -interpretación de soporte A tal que $\mathcal{I} \models \psi$. Entonces, para todo $c \in A$, $\mathcal{I}[c/y] \models \exists x R(x, y)$. De la misma forma, existe $d \in A$ tal que $\mathcal{I}[c/y][d/x] \models R(x, y)$.

Es decir, $\mathcal{I} \models \psi$ significa que para todo elemento $c \in A$ existe algún elemento d del conjunto soporte A tal que d está relacionado con c .

Claramente, si tenemos el primer caso tenemos el segundo, porque para todo elemento $c \in A$, a está relacionado con c , por tanto existe algún elemento relacionado con c . Por tanto, $\varphi \models \psi$.

Veamos que la implicación recíproca, $\psi \models \varphi$, no es cierta en general.

Para ello damos el siguiente contraejemplo: sea el S -álgebra $\mathfrak{A} := \langle A, \emptyset, \{R^{\mathfrak{A}}\} \rangle$, con $A := \{1, 2, 3\}$ y $R^{\mathfrak{A}} : A^2 \rightarrow \text{Bool}$ dada por $(1, 2), (2, 3), (3, 1) \mapsto V$, $(x, y) \mapsto F$ en otro caso⁴.

Sea $\mathcal{G} = \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$ una S -interpretación. Evidentemente, para todo $a \in A$ existe $b \in A$ tal que $\mathcal{G}[a/y][b/x] \models R(x, y)$: si $a = 1$, $b = 3$; si $a = 2$, $b = 1$; si $a = 3$, $b = 2$. Por otro lado, es imposible que exista $c \in A$ tal que, para todo $d \in A$, $\mathcal{I}[c/x][d/y] \models R(x, y)$, ya que ningún elemento está relacionado con todos. Por tanto \mathcal{G} satisface ψ pero no satisface φ .

Ejemplo 2.30. $\varphi_{=\infty} := (\exists z \forall x \neg f(x) \doteq z) \wedge (\forall x \forall y f(x) \doteq f(y) \rightarrow x \doteq y)$ es una contingencia. Nótese que nos dice que f es (símbolo de) una función inyectiva y no sobreyectiva. En concreto, esto implica que el cardinal del conjunto soporte de cualquier S -álgebra inducida por una S -interpretación \mathcal{I} que satisface $\varphi_{=\infty}$ tiene que ser infinito. Esto se debe a que el símbolo de función f tiene asociada una función $f^{\mathfrak{A}} : A \rightarrow A$ que es inyectiva y no sobreyectiva, lo cual no puede pasar si A es finito.

⁴En ocasiones es más cómoda la notación conjuntista, es decir, en vez de dar $R^{\mathfrak{A}}$ como una función $R^{\mathfrak{A}} : A^n \rightarrow \text{Bool}$, podemos darla como el subconjunto $\{a \in \mathfrak{A}^n \mid R^{\mathfrak{A}}(a) = V\}$. Por ejemplo, en este caso, $R^{\mathfrak{A}}$ sería el conjunto $\{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$

Ejemplo 2.31. $\varphi_{=2} := (\exists x \exists y \neg x \doteq y) \wedge \forall z (z \doteq y \vee z \doteq x)$ es una contingencia. Nos dice, en concreto, que el cardinal del conjunto soporte de cualquier S -álgebra inducida por una S -interpretación tiene que ser igual a 2.

2.4.1. Axiomas de Peano

Recordemos la signatura Nat definida en 2.2. Este lenguaje fue introducido por Peano para describir los números naturales usando los símbolos de suma, producto, sucesor y menor o igual. También introdujo los que ahora conocemos como *axiomas de Peano*:

1. $\forall x \neg s(x) \doteq 0$
2. $\forall x \forall y s(x) \doteq s(y) \rightarrow x \doteq y$
3. $\forall x x + 0 \doteq x$
4. $\forall x \forall y x + s(y) \doteq s(x + y)$
5. $\forall x x * 0 \doteq 0$
6. $\forall x \forall y x * s(y) \doteq (x * y) + x$
7. $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z x + s(z) \doteq y)$

Llamamos Φ_{Peano} al conjunto de las anteriores sentencias. Es fácil comprobar que en la Nat -álgebra \mathfrak{A}_{Nat} , introducida en 2.19, cualquier interpretación satisface los axiomas de Peano. Sin embargo, también hay otras estructuras con esta propiedad.

2.5. Sustitución

El ejemplo 2.29 muestra que la determinación de la consecuencia lógica en particular y de la satisfactibilidad en general es una tarea costosa. Motivados por este hecho, investigamos relaciones sintácticas que nos permitan trabajar más cómodamente. Comenzamos por el concepto de *sustitución*, que ya estuvo presente a lo largo del anterior capítulo.

De ahora en adelante, denotamos vectores de elementos de un determinado conjunto con una raya horizontal sobre una letra. Normalmente empleamos la misma letra para referirnos a los elementos de tal vector. Por ejemplo, dada la signatura S y el conjunto soporte de cierta S -álgebra, A , designamos $\bar{a} := (a_1, \dots, a_n)$ con $a_i \in A$, para todo $i = 1, \dots, n$.

Comenzamos definiendo la sustitución para términos:

Definición 2.32. Sea S signatura. Sean $t \in TERM_S$, $\bar{x} := (x_1, \dots, x_n)$ vector de Var y $\bar{s} := (s_1, \dots, s_n)$ vector de $TERM_S$. Definimos la *sustitución de \bar{x} por \bar{s} en t* como:

- Si $t \in Ct_S$, $t[\bar{s}/\bar{x}] = t$.
- Si $t \in Var$, $t[\bar{s}/\bar{x}] = s_i$ si $t = x_i$, para cierto i , y $t[\bar{s}/\bar{x}] = t$ si $t \neq x_i$, para todo i .
- $f(t_1, \dots, t_n)[\bar{s}/\bar{x}] = f(t_1[\bar{s}/\bar{x}], \dots, t_n[\bar{s}/\bar{x}])$.

Pasamos a la sustitución para fórmulas:

Definición 2.33. Sea S signatura. Sean $\varphi \in FORM_S$, $\bar{x} := (x_1, \dots, x_n)$ vector de Var y $\bar{s} := (s_1, \dots, s_n)$ vector de $TERM_S$. Definimos la *sustitución de \bar{x} por \bar{s} en φ* como:

- Caso base:
 - $\top[\bar{s}/\bar{x}] = \top$.
 - $\perp[\bar{s}/\bar{x}] = \perp$.
 - $(t_1 \doteq t_2)[\bar{s}/\bar{x}] = (t_1[\bar{s}/\bar{x}] \doteq t_2[\bar{s}/\bar{x}])$.
 - Si $p|_k \in Pd_S$ y $t_1, \dots, t_k \in TERM_S$, $p(t_1, \dots, t_k)[\bar{s}/\bar{x}] = p(t_1[\bar{s}/\bar{x}], \dots, t_k[\bar{s}/\bar{x}])$.
- Caso recursivo:
 - $(\neg\varphi)[\bar{s}/\bar{x}] = (\neg\varphi[\bar{s}/\bar{x}])$.
 - $(\varphi_1 \Box \varphi_2)[\bar{s}/\bar{x}] = (\varphi_1[\bar{s}/\bar{x}] \Box \varphi_2[\bar{s}/\bar{x}])$.
 - $(Qx \varphi)[\bar{s}/\bar{x}]$ se define por casos:
 - $(Qx \varphi[\bar{s}/\bar{x}])$, si $x \notin \bar{x}$ y $x \notin \bigcup_{i=1}^n var(t_i)$.
 - $(Qx \varphi[(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)/(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)])$, si $x = x_i \in \bar{x}$ y $x \notin \bigcup_{i=1}^n var(t_i)$.
 - $(Qz \varphi[z/x][\bar{s}/\bar{x}])$ si $x \in \bigcup_{i=1}^n var(t_i)$, siendo z una variable que no está en \bar{x} ni en $\bigcup_{i=1}^n var(t_i)$.

Si queremos sustituir un solo elemento, no un vector con varios, podemos omitir la raya horizontal sobre la letra (aunque también puede interpretarse como un vector de un elemento).

En ocasiones haremos uso de la siguiente notación:

$$f(t_1, \dots, t_n)[\bar{s}/\bar{x}] = f(t_1, \dots, t_n)[s_1/x_1, \dots, s_n/x_n].$$

Ejemplo 2.34. Si llamamos $a := h(x)$ y $b := f(x, y)$, entonces

$$f(x, y)[h(x)/x, f(x, y)/y] = f(h(x), f(x, y)).$$

Nota 2.35. Si no nombramos adecuadamente a las variables que estamos manipulando podemos llegar a tener una *colisión*, es decir, que mediante una sustitución una variable pase de estar libre a estar ligada.

Por ejemplo, sean $\varphi := \forall z p(x, z)$ y $t := f(z)$. Entonces la sustitución

$$\varphi[t/x] = \forall z p(f(z), z)$$

daría lugar a una colisión porque la variable z está libre en t , pero ligada al sustituirla en φ por x . Habrá ocasiones en que esto no nos sea conveniente. En estos casos podremos cambiar $t = f(z)$ por $f(y)$, obteniendo

$$\varphi[t/x] = \forall z p(f(y), z),$$

de modo que ya no tenemos el problema anterior.

2.6. Lema de coincidencia

Más adelante nos será útil el estudiar las relaciones entre diferentes interpretaciones y firmas. Para ello nos será útil el lema de coincidencia, además de para demostrar el lema de sustitución de la próxima sección.

Comencemos con la siguiente

Definición 2.36. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Definimos recursivamente el *vocabulario para términos*, voc , como:

- Caso base:
 - $voc(c) = \{c\}$, para todo $c \in Ct_S$.
 - $voc(x) = \emptyset$, para todo $x \in Var$.
- Caso recursivo: $voc(f(t_1, \dots, t_k)) = \{f\} \cup \bigcup_{i=1}^k voc(t_i)$, con $f|_k \in Fn_S$, $t_1 \dots t_k \in TERM_S$.

Definición 2.37. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Definimos recursivamente el *vocabulario para fórmulas*, voc , como:

- Caso base:
 - $voc(p(t_1, \dots, t_k)) = \{p\} \cup \bigcup_{i=1}^k voc(t_i)$, con $p|_k \in Pd_S$, $t_1 \dots t_k \in TERM_S$.
 - $voc(t \doteq s) = voc(t) \cup voc(s)$, con $t, s \in TERM_S$.
 - $voc(\top) = voc(\perp) = \emptyset$.
- Caso recursivo:
 - $voc(\neg\varphi) = voc(\varphi)$, con $\varphi \in FORM_S$.
 - $voc(\varphi \Box \psi) = voc(\varphi) \cup voc(\psi)$, con $\varphi, \psi \in FORM_S$.
 - $voc(Qx \varphi) = voc(\varphi)$, con $\varphi \in FORM_S$ y $x \in Var$.

Es decir, el vocabulario de una expresión, sea término o fórmula, es el conjunto de elementos de la signatura (símbolos de constante, función y predicado) que aparecen en ella.

Ahora consideramos:

Definición 2.38. Sean $S_1 = \langle Ct_{S_1}, Fn_{S_1}, Pd_{S_1} \rangle$, $S_2 = \langle Ct_{S_2}, Fn_{S_2}, Pd_{S_2} \rangle$ signaturas. Definimos la *signatura unión* y la *signatura intersección* respectivamente como:

$$S_1 \cup S_2 := \langle Ct_{S_1} \cup Ct_{S_2}, Fn_{S_1} \cup Fn_{S_2}, Pd_{S_1} \cup Pd_{S_2} \rangle,$$

$$S_1 \cap S_2 := \langle Ct_{S_1} \cap Ct_{S_2}, Fn_{S_1} \cap Fn_{S_2}, Pd_{S_1} \cap Pd_{S_2} \rangle.$$

Ya que podemos obtener nuevas signaturas a partir de otras, es decir, nuevos conjuntos de símbolos, nos interesa estudiar qué ocurre con las interpretaciones, es decir, con los significados de los símbolos. Esto motiva la noción de *coincidencia*:

Definición 2.39. Sean S_1, S_2 signaturas, $\mathcal{I}_1 = \langle \mathfrak{A}_1, \sigma_1 \rangle$ una S_1 -interpretación y $\mathcal{I}_2 = \langle \mathfrak{A}_2, \sigma_2 \rangle$ una S_2 -interpretación con el mismo conjunto soporte. Consideremos $S := S_1 \cap S_2$, $t \in TERM_S$. Decimos que \mathcal{I}_1 y \mathcal{I}_2 *coinciden en t* , $\mathcal{I}_1 \sim_t \mathcal{I}_2$, si:

1. $c^{\mathcal{I}_1} = c^{\mathcal{I}_2}$, para todo $c \in voc(t)$, $c \in Ct_S$.
2. $x^{\mathcal{I}_1} = x^{\mathcal{I}_2}$, para todo $x \in var(t)$.
3. $f^{\mathfrak{A}_1} = f^{\mathfrak{A}_2}$, para todo $f \in voc(t)$, $f \in Fn_S$.

Definición 2.40. Sean S_1, S_2 signaturas, $\mathcal{I}_1 = \langle \mathfrak{A}_1, \sigma_1 \rangle$ una S_1 -interpretación y $\mathcal{I}_2 = \langle \mathfrak{A}_2, \sigma_2 \rangle$ una S_2 -interpretación con el mismo conjunto soporte. Consideremos $S := S_1 \cap S_2$, $\varphi \in FORM_S$. Decimos que \mathcal{I}_1 y \mathcal{I}_2 *coinciden en φ* , $\mathcal{I}_1 \sim_\varphi \mathcal{I}_2$, si:

1. $c^{\mathcal{I}_1} = c^{\mathcal{I}_2}$, para todo $c \in voc(\varphi)$, $c \in Cts_S$.
2. $\sigma_1(x) = \sigma_2(x)$, para todo $x \in lib(\varphi)$.
3. $f^{\mathfrak{A}_1} = f^{\mathfrak{A}_2}$, para todo $f \in voc(\varphi)$, $f \in Fn_S$.
4. $p^{\mathfrak{A}_1} = p^{\mathfrak{A}_2}$, para todo $p \in voc(\varphi)$, $p \in Pd_S$.

Ya estamos en disposición de enunciar el resultado que da nombre a esta sección:

Teorema 2.41. (*Lema de coincidencia*) Sean S_1, S_2 signaturas, $\mathcal{I}_1 = \langle \mathfrak{A}_1, \sigma_1 \rangle$ una S_1 -interpretación y $\mathcal{I}_2 = \langle \mathfrak{A}_2, \sigma_2 \rangle$ una S_2 -interpretación con el mismo conjunto soporte. Consideremos $S := S_1 \cap S_2$.

1. Si $\mathcal{I}_1 \sim_t \mathcal{I}_2$, con $t \in TERM_S$, entonces $t^{\mathcal{I}_1} = t^{\mathcal{I}_2}$.
2. Si $\mathcal{I}_1 \sim_\varphi \mathcal{I}_2$, con $\varphi \in FORM_S$, entonces $\varphi^{\mathcal{I}_1} = \varphi^{\mathcal{I}_2}$.

Es decir, la primera parte nos dice que el significado de un término bajo una interpretación solo depende de los significados de las constantes, variables y funciones que aparecen en ella. La segunda nos dice algo parecido para fórmulas, solo que además nos dice que el significado de una fórmula **no** depende del significado de sus variables ligadas, solo importan las libres.

Demostración.

1. Inducción estructural. Caso base:

- Si $t = p$ con $p \in C t_S$, entonces $p \in \text{voc}(t)$, por tanto como $\mathfrak{I}_1 \sim_t \mathfrak{I}_2$, tenemos que $p^{\mathfrak{I}_1} = p^{\mathfrak{I}_2}$.
- Si $t = x$ con $x \in \text{var}$, entonces $x \in \text{var}(t)$, por tanto como $\mathfrak{I}_1 \sim_t \mathfrak{I}_2$, se cumple $x^{\mathfrak{I}_1} = x^{\mathfrak{I}_2}$.

Caso inductivo: $t = f(t_1, \dots, t_n)$, para $t_1, \dots, t_n \in \text{TERM}_S$. Como $\text{voc}(t_i) \subseteq \text{voc}(t)$ y $\text{var}(t_i) \subseteq \text{var}(t)$, se cumple que $\mathfrak{I}_1 \sim_{t_i} \mathfrak{I}_2, i = 1, \dots, n$.

Por tanto por inducción tenemos $t_i^{\mathfrak{I}_1} = t_i^{\mathfrak{I}_2}$, de modo que:

$$f(t_1, \dots, t_n)^{\mathfrak{I}_1} = f^{\mathfrak{A}_1}(t_1^{\mathfrak{I}_1}, \dots, t_n^{\mathfrak{I}_1}) = f^{\mathfrak{A}_2}(t_1^{\mathfrak{I}_2}, \dots, t_n^{\mathfrak{I}_2}) = f(t_1, \dots, t_n)^{\mathfrak{I}_2},$$

Donde hemos usado que $f \in \text{voc}(t)$, por tanto $f^{\mathfrak{A}_1} = f^{\mathfrak{A}_2}$.

2. De nuevo, inducción estructural. Caso base:

- φ es \top o \perp . Caso obvio.
- $\varphi = t_1 \doteq t_2$. En este caso, $\text{voc}(t_i) \subseteq \text{voc}(\varphi)$ y $\text{var}(t_i) \subseteq \text{var}(\varphi)$. De modo que $\mathfrak{I}_1 \sim_{t_i} \mathfrak{I}_2, i = 1, 2$, y por el apartado anterior se cumple que $t_i^{\mathfrak{I}_1} = t_i^{\mathfrak{I}_2}, i = 1, 2$. Por tanto $\varphi^{\mathfrak{I}_1}$ es V si y solo si $t_1^{\mathfrak{I}_1} = t_2^{\mathfrak{I}_1}$ si y solo si $t_1^{\mathfrak{I}_2} = t_2^{\mathfrak{I}_2}$ si y solo si $\varphi^{\mathfrak{I}_2}$.
- $\varphi = p(t_1, \dots, t_k)$. En este caso, igual que en el anterior tenemos $t_i^{\mathfrak{I}_1} = t_i^{\mathfrak{I}_2}$. Además, $p \in \text{voc}(\varphi)$, por tanto $p^{\mathfrak{A}_1} = p^{\mathfrak{A}_2}$. De modo que $\varphi^{\mathfrak{I}_1}$ es V si y solo si $p^{\mathfrak{A}_1}(t_1^{\mathfrak{I}_1}, \dots, t_k^{\mathfrak{I}_1}) = V$ si y solo si $p^{\mathfrak{A}_2}(t_1^{\mathfrak{I}_2}, \dots, t_k^{\mathfrak{I}_2}) = V$ si y solo si $\varphi^{\mathfrak{I}_2}$ es V .

Caso inductivo:

- $\varphi = \neg \varphi_1$. Entonces $\text{voc}(\varphi) = \text{voc}(\varphi_1)$ y $\text{lib}(\varphi) = \text{lib}(\varphi_1)$. Por tanto, $\mathfrak{I}_1 \sim_{\varphi_1} \mathfrak{I}_2$, y por hipótesis de inducción, $\varphi_1^{\mathfrak{I}_1} = \varphi_1^{\mathfrak{I}_2}$. De modo que $\varphi^{\mathfrak{I}_1} = v_{\neg}(\varphi_1^{\mathfrak{I}_1}) = v_{\neg}(\varphi_1^{\mathfrak{I}_2}) = \varphi^{\mathfrak{I}_2}$.
- Si $\varphi = \varphi_1 \square \varphi_2$. Igual que en el caso anterior, tenemos que $\varphi_i^{\mathfrak{I}_1} = \varphi_i^{\mathfrak{I}_2}, i = 1, 2$. De modo que: $\varphi^{\mathfrak{I}_1} = v_{\square}(\varphi_1^{\mathfrak{I}_1}, \varphi_2^{\mathfrak{I}_1}) = v_{\square}(\varphi_1^{\mathfrak{I}_2}, \varphi_2^{\mathfrak{I}_2}) = \varphi^{\mathfrak{I}_2}$.
- $\varphi = \exists x \varphi_1$. Como $\mathfrak{I}_1 \sim_{\varphi} \mathfrak{I}_2$, y tenemos $\text{voc}(\varphi) = \text{voc}(\varphi_1)$, $\text{lib}(\varphi) = \text{lib}(\varphi_1) \setminus \{x\}$, sabemos que $\mathfrak{I}_1[a/x] \sim_{\varphi_1} \mathfrak{I}_2[a/x]$, ya que la única diferencia de interpretaciones de \mathfrak{I}_1 y \mathfrak{I}_2 en φ_1 que no se da en φ es en la variable x , y $\mathfrak{I}_1[a/x]$ y $\mathfrak{I}_2[a/x]$ coinciden en la variable x . Ahora, $\varphi^{\mathfrak{I}_1}$ es V si y solo si existe $a \in A$ tal que $\varphi_1^{\mathfrak{I}_1[a/x]} = V$. Pero esto equivale a que exista $a \in A$ tal que $\varphi_1^{\mathfrak{I}_2[a/x]} = V$, es decir, a que $\varphi^{\mathfrak{I}_2}$ sea V .
- $\varphi = \forall x \varphi_1$. Igual que en el caso anterior, sabemos que $\mathfrak{I}_1[a/x] \sim_{\varphi_1} \mathfrak{I}_2[a/x]$. Ahora, $\varphi^{\mathfrak{I}_1}$ es V si y solo si para todo $a \in A$ se cumple $\varphi_1^{\mathfrak{I}_1[a/x]} = V$. Pero esto equivale a que para todo $a \in A$ se cumpla $\varphi_1^{\mathfrak{I}_2[a/x]} = V$, lo cual equivale a que $\varphi^{\mathfrak{I}_2}$ sea V .

□

Ejemplo 2.42. Sean $t \in TERM_S$, $\varphi \in FORM_S$ tales que existen $x_1, \dots, x_n \in Var$ de modo que $var(t) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$ y $lib(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$. El Lema de Coincidencia nos dice que el significado que tome cada variable que no pertenezca a $\{x_1, \dots, x_n\}$ no afectará a los significados de t y φ .

Es decir, dada una interpretación $\mathfrak{I} = \langle \mathfrak{A}, \sigma \rangle$, $\varphi^{\mathfrak{I}}$ solo depende de \mathfrak{A} y de $\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)$.

Ejemplo 2.43. En el ejemplo anterior, si φ es una fórmula cerrada, $lib(\varphi) = \emptyset$ y entonces podemos tomar $n = 0$. Es decir, el significado de φ depende solo de el álgebra, no de la interpretación.

2.7. Isomorfía

Seguimos nuestro estudio de las relaciones entre firmas e interpretaciones. Introducimos a continuación un concepto empleado constantemente en matemáticas. En nuestro caso, captura la idea de una aplicación que ‘preserva el significado’ entre dos álgebras de la misma firma:

Definición 2.44. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ firma. Sean \mathfrak{A}_1 y \mathfrak{A}_2 S -álgebras de conjuntos soporte respectivos A_1 y A_2 . Una aplicación $h : A_1 \rightarrow A_2$ es *isomorfismo de S -álgebras* si:

- h es biyectiva.
- $h(c^{\mathfrak{A}_1}) = c^{\mathfrak{A}_2}$, para todo $c \in Ct_S$.
- $h(f^{\mathfrak{A}_1}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{A}_2}(h(a_1), \dots, h(a_n))$, con $f|_n \in Fn_S$, $a_1, \dots, a_n \in A_1$.
- $p^{\mathfrak{A}_1}(a_1, \dots, a_n) = p^{\mathfrak{A}_2}(h(a_1), \dots, h(a_n))$, con $p|_n \in Pd_S$, $a_1, \dots, a_n \in A_1$.

Si existe un isomorfismo entre \mathfrak{A}_1 y \mathfrak{A}_2 , decimos que son *isomorfas* y lo denotamos por $\mathfrak{A}_1 \approx \mathfrak{A}_2$.

Definición 2.45. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ firma. Sean $\mathfrak{I}_1 = \langle \mathfrak{A}_1, \sigma_1 \rangle$ y $\mathfrak{I}_2 = \langle \mathfrak{A}_2, \sigma_2 \rangle$ S -interpretaciones. Una aplicación h es *isomorfismo de S -interpretaciones* si:

- h es isomorfismo entre las S -álgebras \mathfrak{A}_1 y \mathfrak{A}_2 .
- $h(\sigma_1(x)) = \sigma_2(x)$, para todo $x \in Var$.

Cuando existe un isomorfismo entre \mathfrak{I}_1 y \mathfrak{I}_2 , decimos que son *isomorfas* y lo simbolizamos por $\mathfrak{I}_1 \approx \mathfrak{I}_2$.

Ejemplo 2.46. Consideremos la signatura característica de los grupos, $S := \langle \{e\}, \{*_2\}, \emptyset \rangle$. Sean los grupos $(\mathbb{Z}_2, +)$ y (A, \cdot) dado por $A = \{a, b\}$ con:

\cdot	a	b
a	a	b
b	b	a

Entonces tenemos dos S -álgebras:

$$\mathfrak{A}_1 = \langle \mathbb{Z}_2, \{0, 1\}, \{+\}, \emptyset \rangle$$

$$\mathfrak{A}_2 = \langle A, \{a, b\}, \{\cdot\}, \emptyset \rangle$$

Entonces, la aplicación $h : \mathbb{Z}_2 \rightarrow A$ dada por $h(0) = a$ y $h(1) = b$ es un isomorfismo, es decir, $h : \mathfrak{A}_1 \approx \mathfrak{A}_2$.

Este lema técnico nos permitirá probar el siguiente teorema:

Lema 2.47. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Sean $\mathfrak{I}_1 = \langle \mathfrak{A}_1, \sigma_1 \rangle$ y $\mathfrak{I}_2 = \langle \mathfrak{A}_2, \sigma_2 \rangle$ S -interpretaciones de conjuntos soporte A_1, A_2 tales que existe $h : \mathfrak{I}_1 \approx \mathfrak{I}_2$. Sea $a \in A_1$.

Entonces, $\mathfrak{I}_1[a/x] \approx \mathfrak{I}_2[h(a)/x]$. De hecho, la misma función $h : A_1 \rightarrow A_2$ es isomorfismo entre $\mathfrak{I}_1[a/x]$ y $\mathfrak{I}_2[h(a)/x]$.

Demostración. Está claro que se cumple $h(\sigma_1(y)) = \sigma_2(y)$ para todas las variables excepto x , ya que si $y \in Var \setminus \{x\}$, $h(\sigma_1[a/x](y)) = h(\sigma_1(y)) = \sigma_2(y) = \sigma_2[h(a)/x](y)$.

Respecto a la variable x , $h(\sigma_1[a/x](x)) = h(a) = \sigma_2[h(a)/x](x)$.

Queda entonces comprobar que h es isomorfismo entre las álgebras de \mathfrak{I}_1 y \mathfrak{I}_2 . Pero esto es directo, ya que estas álgebras son \mathfrak{A}_1 y \mathfrak{A}_2 . \square

El siguiente resultado muestra que los isomorfismos entre S -interpretaciones se extienden a las fórmulas y los términos de tal signatura S .

Teorema 2.48. Sea $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura. Sea h isomorfismo entre las S -interpretaciones \mathfrak{I}_1 y \mathfrak{I}_2 . Entonces:

1. Para todo $t \in TERM_S$, $h(t^{\mathfrak{I}_1}) = t^{\mathfrak{I}_2}$.
2. Para toda $\varphi \in FORM_S$, $\varphi^{\mathfrak{I}_1} = \varphi^{\mathfrak{I}_2}$, y por tanto $\mathfrak{I}_1 \models \varphi$ si y solo si $\mathfrak{I}_2 \models \varphi$.

Demostración.

1. Por inducción estructural sobre $t \in TERM_S$:

■ Caso base:

- Si $t = c$, con $c \in Ct_S$, entonces $h(t^{\mathfrak{I}_1}) = h(c^{\mathfrak{I}_1}) = c^{\mathfrak{I}_2} = t^{\mathfrak{I}_2}$.
- Si $t = x$, con $x \in Var$, entonces $h(t^{\mathfrak{I}_1}) = h(x^{\mathfrak{I}_1}) = h(\sigma_1(x)) = \sigma_2(x) = x^{\mathfrak{I}_2} = t^{\mathfrak{I}_2}$.

- Caso recursivo: Si $t = f(t_1, \dots, t_n)$, con $f|_n \in Fn_S$ y $t_1, \dots, t_n \in TERM_S$ cumplen el enunciado, entonces:

$$h(f(t_1, \dots, t_n)^{\mathcal{I}_1}) = h(f^{\mathfrak{A}_1}(t_1^{\mathcal{I}_1}, \dots, t_n^{\mathcal{I}_1})) = f^{\mathfrak{A}_2}(h(t_1^{\mathcal{I}_1}), \dots, h(t_n^{\mathcal{I}_1})) = f^{\mathfrak{A}_2}(t_1^{\mathcal{I}_2}, \dots, t_n^{\mathcal{I}_2}) = f(t_1, \dots, t_n)^{\mathcal{I}_2}$$

2. Por inducción estructural sobre $\varphi \in FORM_S$:

- Caso base:
 - Si $\varphi = \top$, entonces $\varphi^{\mathcal{I}_1} = \top^{\mathcal{I}_1} = V = \top^{\mathcal{I}_2} = \varphi^{\mathcal{I}_2}$ y análogo con \perp .
 - Si $\varphi = t \doteq s$ para $t, s \in TERM_S$, entonces $\mathcal{I}_1 \models \varphi$ si y solo si $t^{\mathcal{I}_1} = s^{\mathcal{I}_1}$ si y solo si (por ser h inyectiva) $h(t^{\mathcal{I}_1}) = h(s^{\mathcal{I}_1})$ si y solo si $t^{\mathcal{I}_2} = s^{\mathcal{I}_2}$ si y solo si $\mathcal{I}_1 \models \varphi$.
 - Si $\varphi = p(t_1, \dots, t_n)$, con $p|_n \in Pd_S$ y $t_1, \dots, t_n \in TERM_S$ cumplen el enunciado, entonces $p(t_1, \dots, t_n)^{\mathcal{I}_1} = V$, si y solo si $p^{\mathfrak{A}_1}(t_1^{\mathcal{I}_1}, \dots, t_n^{\mathcal{I}_1}) = V$ si y solo si $p^{\mathfrak{A}_2}(h(t_1^{\mathcal{I}_1}), \dots, h(t_n^{\mathcal{I}_1})) = V$ si y solo si $p^{\mathfrak{A}_2}(t_1^{\mathcal{I}_2}, \dots, t_n^{\mathcal{I}_2}) = V$
- Caso recursivo:
 - $\varphi = \neg \varphi_1$. Entonces, $\varphi^{\mathcal{I}_1}$ es V si y solo si $v_{\neg}(\varphi_1^{\mathcal{I}_1})$ es V si y solo si $v_{\neg}(\varphi_1^{\mathcal{I}_2})$ es V si y solo si $\varphi^{\mathcal{I}_2}$ es V .
 - $\varphi = \varphi_1 \Box \varphi_2$. Entonces, $\varphi^{\mathcal{I}_1}$ es V si y solo si $v_{\Box}(\varphi_1^{\mathcal{I}_1}, \varphi_2^{\mathcal{I}_1})$ es V si y solo si $v_{\Box}(\varphi_1^{\mathcal{I}_2}, \varphi_2^{\mathcal{I}_2})$ es V si y solo si $\varphi^{\mathcal{I}_2}$ es V .
 - $\varphi = \exists x \varphi_1$. Entonces, $\varphi^{\mathcal{I}_1}$ es V si y solo si existe a que cumple $\varphi_1^{\mathcal{I}_1[a/x]} = V$. Como por hipótesis inductiva el enunciado se cumple para φ_1 , usando el lema 2.47 tenemos que $\varphi_1^{\mathcal{I}_1[a/x]} = V$ equivale a $\varphi_1^{\mathcal{I}_2[a/x]} = V$. Y que exista a que cumpla esto es equivalente a que $\varphi^{\mathcal{I}_2}$ sea V , como queríamos.
 - $\varphi = \forall x \varphi_1$. Entonces, $\varphi^{\mathcal{I}_1}$ es V si y solo si para todo a se cumple $\varphi_1^{\mathcal{I}_1[a/x]} = V$. Como por hipótesis inductiva el enunciado se cumple para φ_1 , usando el lema 2.47 tenemos que $\varphi_1^{\mathcal{I}_1[a/x]} = V$ equivale a $\varphi_1^{\mathcal{I}_2[a/x]} = V$. Y que esto se cumpla para todo a es equivalente a que $\varphi^{\mathcal{I}_2}$ sea V , como queríamos.

□

2.8. Lema de sustitución

Proseguimos nuestro estudio de la sustitución. A continuación obtenemos el resultado análogo al que ya demostramos en lógica proposicional.

Teorema 2.49. (*Lema de sustitución*) Sean $S = \langle Ct_S, Fn_S, Pd_S \rangle$ signatura, \mathcal{I} S -interpretación de conjunto soporte A . Sean $\bar{x} := (x_1, \dots, x_n)$ y $\bar{t} := (t_1, \dots, t_n)$ vectores de Var y $TERM_S$, respectivamente. Denotemos $\bar{t}^{\mathcal{I}} := (t_1^{\mathcal{I}}, \dots, t_n^{\mathcal{I}})$ y $\mathcal{J} := \mathcal{I}[\bar{t}^{\mathcal{I}}/\bar{x}]$. Entonces:

1. Si $s \in TERM_S$, $(s[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = s^{\mathcal{J}}$.
2. Si $\varphi \in FORM_S$, $(\varphi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = \varphi^{\mathcal{J}}$, es decir, $\mathfrak{J} \models \varphi[\bar{t}/\bar{x}]$ si y solo si $\mathcal{J} \models \varphi$.

Demostración.

1. Por inducción estructural.

■ Caso base:

- Si $s = c$, con $c \in Ct_S$, entonces $s = s[\bar{t}/\bar{x}] = c$, y se cumple $c^{\mathfrak{J}} = c^{\mathcal{J}}$, ya que \mathfrak{J} y \mathcal{J} tienen la misma álgebra.
- Sea $s = x$, con $x \in Var$. Si x no está en \bar{x} , entonces $x[\bar{t}/\bar{x}] = x$, y como $x^{\mathfrak{J}} = x^{\mathcal{J}}$, tenemos el resultado. Si $x = x_i$, con x_i el elemento i -ésimo de \bar{x} , $(x[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = t_i^{\mathfrak{J}} = x^{\mathfrak{J}}[\bar{t}/\bar{x}] = x^{\mathcal{J}}$.
- Caso recursivo: Sea $s = f(r_1, \dots, r_k)$, con $f|_k \in Fn_S$ y $r_1, \dots, r_k \in TERM_S$. Entonces, $(f(r_1, \dots, r_k)[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = (f(r_1[\bar{t}/\bar{x}], \dots, r_k[\bar{t}/\bar{x}]))^{\mathfrak{J}} = f^{\mathfrak{A}}((r_1[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}}, \dots, (r_k[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}})$ y aplicando la hipótesis de inducción, lo anterior es igual $f^{\mathfrak{A}}(r_1^{\mathcal{J}}, \dots, r_k^{\mathcal{J}}) = f(r_1, \dots, r_k)^{\mathcal{J}}$.

2. Por inducción estructural.

■ Caso base:

- Si $\varphi = \top$, $(\varphi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = V = \varphi^{\mathcal{J}}$. Análogo con \perp .
- Si $\varphi = r \doteq s$, con $r, s \in TERM_S$. Entonces $((r \doteq s)[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = (r[\bar{t}/\bar{x}] \doteq s[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}}$, que es cierto si y solo si $r[\bar{t}/\bar{x}]^{\mathfrak{J}} = s[\bar{t}/\bar{x}]^{\mathfrak{J}}$ si y solo si, por hipótesis de inducción, $r^{\mathcal{J}} = s^{\mathcal{J}}$, es decir, si y solo si $\mathcal{J} \models r \doteq s$.
- Si $\varphi = p(r_1, \dots, r_k)$, con $p|_k \in Pd_S$, $r_1, \dots, r_k \in TERM_S$, entonces $(p(r_1, \dots, r_k)[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = (p(r_1[\bar{t}/\bar{x}], \dots, r_k[\bar{t}/\bar{x}]))^{\mathfrak{J}}$ es igual a $p^{\mathfrak{A}}((r_1[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}}, \dots, (r_k[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}})$, que por hipótesis de inducción es igual a $p^{\mathfrak{A}}(r_1^{\mathcal{J}}, \dots, r_k^{\mathcal{J}}) = p(r_1, \dots, r_k)^{\mathcal{J}}$.

■ Caso inductivo:

- Si $\varphi = \neg\psi$, entonces $((\neg\psi)[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = (\neg\psi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = v_{\neg}((\psi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}})$, que por hipótesis de inducción es $v_{\neg}(\psi^{\mathcal{J}}) = (\neg\psi)^{\mathcal{J}}$.
- Si $\varphi = \psi \Box \chi$, entonces $((\psi \Box \chi)[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}} = ((\psi[\bar{t}/\bar{x}] \Box (\chi[\bar{t}/\bar{x}]))^{\mathfrak{J}} = v_{\Box}((\psi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}}, (\chi[\bar{t}/\bar{x}])^{\mathfrak{J}})$, que por hipótesis de inducción es $v_{\Box}(\psi^{\mathcal{J}}, \chi^{\mathcal{J}}) = (\psi \Box \chi)^{\mathcal{J}}$.
- Veamos el caso $\forall x \varphi$. Supongamos que x no es ninguno de los elementos del vector \bar{x} , ya que si esto fuera cierto y x correspondiera a la variable i -ésima de \bar{x} , x_i , por cómo hemos definido sustitución tendríamos que

$$(\forall x \varphi)[\bar{t}/\bar{x}] = (\forall x \varphi)[(t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n)/(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)],$$

es decir, nuestra sustitución es igual a otra sustitución en que $x \notin \bar{x}$.

Tenemos entonces dos casos, $x \in \text{var}(t_i)$ para algún $i = 1, \dots, n$ o no. El primero resulta ser más complicado y nos limitamos a hacer ese:

Supongamos $x \in \text{var}(t_i)$ para cierto $1 \leq i \leq n$, con t_i el i -ésimo elemento de \bar{t} . Entonces, introduciendo la variable nueva z ,

$$(\forall x \varphi)[\bar{t}/\bar{x}] = \forall z \varphi[z/x][\bar{t}/\bar{x}]$$

Entonces, $\mathfrak{I} \models \forall z \varphi[z/x][\bar{t}/\bar{x}]$ es equivalente a que para todo $a \in A$, $\mathfrak{I}[a/z] \models \varphi[z/x][\bar{t}/\bar{x}]$. Aplicando la hipótesis de inducción a $\mathfrak{I}[a/z]$ y a φ , lo anterior equivale a que para todo $a \in A$,

$$(\mathfrak{I}[a/z])(\bar{t}^{\mathfrak{I}[a/z]}/\bar{x}) \models \varphi[z/x]$$

Nótese que, al ser z variable nueva, $z \notin \text{var}(t_i)$, para todo $1 \leq i \leq n$ y por 2.41, $t_i^{\mathfrak{I}[a/z]} = t_i^{\mathfrak{I}}$. Lo anterior es entonces equivalente a que para todo $a \in A$:

$$(\mathfrak{I}[a/z])(\bar{t}^{\mathfrak{I}}/\bar{x}) \models \varphi[z/x]$$

Por ser z nueva, se sigue también que es distinta de todo elemento de \bar{x} . De modo que $(\mathfrak{I}[a/z])(\bar{t}^{\mathfrak{I}}/\bar{x}) = \mathfrak{I}[\bar{t}^{\mathfrak{I}}/\bar{x}][a/z] = \mathcal{J}[a/z]$, y entonces lo anterior es cierto si y solo si para todo $a \in A$,

$$\mathcal{J}[a/z] \models \varphi[z/x]$$

De nuevo, por hipótesis de inducción sobre $\mathcal{J}[a/z]$ y φ , lo anterior se da si y solo si, para todo $a \in A$,

$$\mathcal{J}[a/z][z^{\mathcal{J}[a/z]}/x] \models \varphi$$

esto es, usando que $z^{\mathcal{J}[a/z]} = a$,

$$(\mathcal{J}[a/z])[a/x] \models \varphi$$

Por ser z variable nueva, $\mathcal{J}[a/z] \sim_{\varphi} \mathcal{J}$ y empleando 2.41, $\varphi^{\mathcal{J}[a/z]} = \varphi^{\mathcal{J}}$. Finalmente, lo anterior es equivalente a que para todo $a \in A$,

$$\mathcal{J}[a/x] \models \varphi$$

es decir, $\mathcal{J} \models \forall x \varphi$. El caso $\exists x \varphi$ es análogo.

□

2.9. Equivalencia lógica

Algunos de los ejemplos precedentes muestran que operar con interpretaciones no es tarea cómoda. Por ello, debemos investigar relaciones entre los signos, que nos faciliten un futuro estudio de su semántica. De nuevo, la noción principal para este propósito es la de *equivalencia lógica*:

Definición 2.50. Sea S signatura, $\varphi, \psi \in FORM_S$. φ y ψ son *lógicamente equivalentes*, $\varphi \sim \psi$, si para toda S -interpretación \mathfrak{I} , $\varphi^{\mathfrak{I}} = \psi^{\mathfrak{I}}$, es decir, $\mathfrak{I} \models \varphi$ si y solo si $\mathfrak{I} \models \psi$ ⁵.

Proposición 2.51. Sea S signatura, $\varphi, \psi \in FORM_S$. Entonces son equivalentes:

1. $\varphi \sim \psi$.
2. $\models \varphi \leftrightarrow \psi$.
3. $\varphi \models \psi$ y $\psi \models \varphi$.

Demostración.

(1) \implies (2): Si $\varphi \sim \psi$, $\varphi^{\mathfrak{I}} = \psi^{\mathfrak{I}}$ para toda S -interpretación \mathfrak{I} , por tanto toda interpretación \mathfrak{I} cumple $\mathfrak{I} \models \varphi \leftrightarrow \psi$, como queríamos.

(2) \implies (3): Si $\models \varphi \leftrightarrow \psi$, toda interpretación \mathfrak{I} solo puede satisfacer φ y ψ o no satisfacer φ ni ψ . Por tanto, si una interpretación satisface φ , satisface ψ y viceversa.

(3) \implies (1): Si $\varphi \models \psi$ y $\psi \models \varphi$, entonces una interpretación satisface ψ si satisface φ y viceversa, por tanto satisface ψ si y solo si satisface φ . \square

Evidentemente, las leyes de equivalencia del cálculo proposicional siguen siendo válidas en lógica de primer orden. Además, introducimos nuevas leyes en las que aparecen cuantificadores:

Teorema 2.52. (*Leyes de equivalencia lógica con cuantificadores*)

1. $Qx \varphi \sim Qu \varphi[u/x]$, siendo u variable nueva.
2. Si $\varphi \sim \psi$, entonces $Qx \varphi \sim Qx \psi$.
3. $\neg \forall x \varphi \sim \exists x \neg \varphi$, $\neg \exists x \varphi \sim \forall x \neg \varphi$.
4. $\forall x \varphi \sim \neg \exists x \neg \varphi$, $\exists x \varphi \sim \neg \forall x \neg \varphi$.
5. Si $x \neq y$, entonces $Qx Qy \varphi \sim Qy Qx \varphi$.
6. $\forall x (\varphi \wedge \psi) \sim \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$, $\exists x (\varphi \vee \psi) \sim \exists x \varphi \vee \exists x \psi$.
7. Si $x \notin \text{lib}(\psi)$, $Qx \psi \sim \psi$.
8. Si $x \notin \text{lib}(\psi)$, $(\forall x \varphi) \wedge \psi \sim \forall x (\varphi \wedge \psi)$, $(\exists x \varphi) \vee \psi \sim \exists x (\varphi \vee \psi)$.
9. Si $x \notin \text{lib}(\psi)$, $\forall x (\varphi \vee \psi) \sim \forall x \varphi \vee \forall x \psi$, $\exists x (\varphi \wedge \psi) \sim \exists x \varphi \wedge \exists x \psi$.
10. Si $x \notin \text{lib}(\psi)$, $(\forall x \varphi) \rightarrow \psi \sim \exists x (\varphi \rightarrow \psi)$, $(\exists x \varphi) \rightarrow \psi \sim \forall x (\varphi \rightarrow \psi)$.

⁵No es difícil demostrar que \sim es reflexiva, simétrica y transitiva, es decir, es relación de equivalencia sobre $FORM_S$.

Demostración.

1. Demostremos el caso \forall , el \exists se hace de forma análoga. Sea \mathcal{I} S -interpretación de conjunto soporte A . $\mathcal{I} \models \forall u \varphi[u/x]$ es por definición equivalente a que, para todo $a \in A$,

$$\mathcal{I}[a/u] \models \varphi[u/x].$$

Como $u^{\mathcal{I}[a/u]} = a$, aplicando el lema de sustitución 2.49 lo anterior es cierto si y solo si, para todo $a \in A$,

$$(\mathcal{I}[a/u])[a/x] \models \varphi$$

Al ser u variable nueva, $(\mathcal{I}[a/u])[a/x] \sim_{\varphi} \mathcal{I}[a/x]$ y 2.41 nos dice que lo anterior equivale a que, para todo $a \in A$,

$$\mathcal{I}[a/x] \models \varphi,$$

que es la definición de $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$.

2. Sea \mathcal{I} S -interpretación tal que $\mathcal{I} \models \exists x \varphi$, es decir, tal que existe $a \in A$ con $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi$, y al ser $\varphi \sim \psi$, lo anterior se da si y solo si existe $a \in A$ con $\mathcal{I}[a/x] \models \psi$, es decir, la definición de $\mathcal{I} \models \exists x \psi$. El caso \forall es análogo.
3. Sea \mathcal{I} S -interpretación tal que $\mathcal{I} \models \neg \forall x \varphi$, es decir, $\mathcal{I} \not\models \forall x \varphi$. Equivalentemente, existe $a \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x] \models \neg \varphi$, que es la definición de $\mathcal{I} \models \exists x \neg \varphi$. El caso \exists es análogo.
4. $\varphi \sim \neg \neg \varphi$ luego, aplicando (2), $\forall x \varphi \sim \forall x \neg \neg \varphi$ y, por (3), $\forall x \neg \neg \varphi \sim \neg \exists x \neg \varphi$. El caso \exists es análogo.
5. $\mathcal{I} \models \exists x \exists y \varphi$ si y solo si existe $a \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x] \models \exists y \varphi$ si y solo si existen $a, b \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x][b/y] \models \varphi$. Como $x \neq y$, $\mathcal{I}[a/x][b/y] = \mathcal{I}[b/y][a/x]$, por tanto lo anterior equivale a que existan $a, b \in A$ tales que $\mathcal{I}[b/y][a/x] \models \varphi$. Igual que antes, vemos que esto es equivalente a que $\mathcal{I} \models \exists y \exists x \varphi$. El caso \forall es análogo.
6. Sea \mathcal{I} S -interpretación tal que $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$. Esto, por 2.51, es equivalente a que $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$ y $\mathcal{I} \models \forall x \psi$. Entonces, en el primer caso tenemos que, para todo $a \in A$, $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi$ y en el segundo que, para todo $b \in A$, $\mathcal{I}[b/x] \models \psi$. De esta forma, lo anterior es equivalente a que, para todo $c \in A$, $\mathcal{I}[c/x] \models \varphi$ y $\mathcal{I}[c/x] \models \psi$, es decir, $\mathcal{I}[c/x] \models \varphi \wedge \psi$, es decir, $\mathcal{I} \models \varphi \wedge \psi$. El otro caso se puede probar a partir del primero, ya que:

$$\begin{aligned} \exists x (\varphi \vee \psi) &\sim \neg \neg (\exists x (\varphi \vee \psi)) \sim \neg (\forall x \neg (\varphi \vee \psi)) \sim \neg (\forall x (\neg \varphi \wedge \neg \psi)) \sim \\ &\sim \neg ((\forall x \neg \varphi) \wedge (\forall x \neg \psi)) \sim \neg (\forall x \neg \varphi) \vee \neg (\forall x \neg \psi) \sim (\exists x \neg \neg \varphi) \vee (\exists x \neg \neg \psi) \sim \exists x \varphi \vee \exists x \psi, \end{aligned}$$

donde hemos usado las leyes de equivalencia de lógica proposicional, el primer apartado de este ejercicio y la regla (4) para negar cuantificadores.

7. En este caso, solo es necesario notar que $\mathcal{I}[a/x] \sim_\psi \mathcal{I}$ y aplicar el Lema de Coincidencia, 2.41.
8. Es una consecuencia directa de los apartados 6 y 7.
9. Comencemos con el caso \forall .
 Queremos demostrar que $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \vee \psi$ si y solo si $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \vee \forall x \psi$
 \implies) Si $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \vee \psi$, para todo $a \in A$ se cumple $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi \vee \psi$. Dividimos en casos:

- $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$. En este caso, es obvio que se cumple $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \vee \forall x \psi$.
- En caso contrario, existe $a \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x] \not\models \varphi$. Entonces para ese a tiene que cumplirse $\mathcal{I}[a/x] \models \psi$. Pero entonces por la regla (7), $\mathcal{I}[a/x] \models \forall x \psi$, por tanto $\mathcal{I} \models \forall x \varphi \vee \forall x \psi$.

\Leftarrow) $\mathcal{I} \models \forall x \psi \vee \forall x \varphi$. Tenemos dos casos:

- $\mathcal{I} \models \forall x \psi$, es decir, para todo $a \in A$, $\mathcal{I}[a/x] \models \psi$. Esto implica que para todo $a \in A$, $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi \vee \psi$, es decir, $\mathcal{I} \models \forall x(\varphi \vee \psi)$.
- $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$, es decir, para todo $a \in A$, $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi$. Esto implica que para todo $a \in A$, $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi \vee \psi$, es decir, $\mathcal{I} \models \forall x(\varphi \vee \psi)$.

Pasamos a la segunda parte. Esta se puede hacer de forma análoga a la anterior, aunque es más rápido deducirla de la anterior:

$$\begin{aligned} \exists x(\varphi \wedge \psi) &\sim \neg \neg \exists x(\varphi \wedge \psi) \sim \neg \forall x(\neg \varphi \vee \neg \psi) \sim \\ &\sim \neg((\forall x \neg \varphi) \vee (\forall x \neg \psi)) \sim (\neg \forall x \neg \varphi) \wedge (\neg \forall x \neg \psi) \sim \exists x \varphi \wedge \exists x \psi. \end{aligned}$$

Hemos podido usar la parte anterior de la regla ya que $x \in \text{lib}(\psi)$ si y solo si $x \in \text{lib}(\neg \psi)$.

10. Estas últimas reglas se pueden deducir de las anteriores:

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi) \rightarrow \psi &\sim \neg(\forall x \varphi) \vee \psi \sim \\ &\sim (\exists x \neg \varphi) \vee \psi \sim \exists x(\neg \varphi \vee \psi) \sim \exists x \varphi \rightarrow \psi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\exists x \varphi) \rightarrow \psi &\sim \neg(\exists x \varphi) \vee \psi \sim (\forall x \neg \varphi) \vee \psi \sim \\ &\sim (\forall x \neg \varphi) \vee (\forall x \psi) \sim \forall x(\neg \varphi \vee \psi) \sim \forall x(\varphi \rightarrow \psi). \end{aligned}$$

□

Las leyes de equivalencia como 6, 8, 9 o 10 permiten escribir los cuantificadores *al principio* de las fórmulas. Esto nos lleva a la siguiente

Definición 2.53. Sea S signatura. Se dice que $\varphi \in \text{FORM}_S$ *está en forma prenexa* si se puede escribir como: $Q_1 x_1, \dots, Q_n x_n \psi$, con x_i variable y Q_i cuantificador, para cada $1 \leq i \leq n$, y ψ libre de cuantificadores. ψ recibe el nombre de *núcleo*.

Ahora bien, ¿toda fórmula tiene una fórmula equivalente en forma prenexa? Antes de dar una respuesta afirmativa a esta pregunta necesitamos el siguiente lema:

Lema 2.54. *Sea S signatura. Sean $\varphi, \psi \in FORM_S$, $x \in lib(\psi)$, $u \in Var$ tal que u una variable nueva. Entonces*

$$Qx \varphi \vee \psi \sim Qu (\varphi[u/x] \vee \psi).$$

Demostración. Es consecuencia de las reglas de equivalencia:

$$\forall x \varphi \vee \psi \sim \forall u \varphi[u/x] \vee \psi \sim \forall u \varphi[u/x] \vee \forall u \psi \sim \forall u (\varphi[u/x] \vee \psi)$$

$$\exists x \varphi \vee \psi \sim \exists u \varphi[u/x] \vee \psi \sim \exists u \varphi[u/x] \vee \exists u \psi \sim \exists u (\varphi[u/x] \vee \psi),$$

donde en el caso \forall hemos usado que u no aparece libre en ψ . \square

Proposición 2.55. *Sea S signatura. Entonces, para cada $\varphi \in FORM_S$ existe $\psi \in FORM_S$ en forma prenexa tal que $\varphi \sim \psi$.*

Demostración. La demostración se lleva a cabo por inducción estructural. Es rutinaria salvo por el paso inductivo en fórmulas, que demostramos para \neg y \vee ⁶.

(\neg) Sea $\varphi = \neg\varphi_1$. Por hipótesis de inducción, existe $\psi \in FORM_S$ en forma prenexa tal que $\varphi_1 \sim \psi$, con $\psi = Q_1x_1 \dots Q_nx_n \chi$. Entonces $\varphi \sim \neg\varphi_1 \sim \neg\psi \sim Q'_1x_1 \dots Q'_nx_n \neg\chi$, donde $Q'_i = \forall$ si $Q_i = \exists$ y $Q'_i = \exists$ si $Q_i = \forall$, para cada $1 \leq i \leq n$.

(\vee) Sea $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$. Por hipótesis de inducción, existen los respectivos núcleos χ_1, χ_2 , tales que $\varphi_1 \sim Q_1^1x_1 \dots Q_n^1x_n \chi_1$ y $\varphi_2 \sim Q_1^2y_1 \dots Q_m^2y_m \chi_2$. Consideremos los vectores de variables nuevas $\bar{u} = (u_1, \dots, u_n)$ y $\bar{v} = (v_1, \dots, v_m)$. Entonces, $\varphi_1 \sim Q_1^1u_1 \dots Q_n^1u_n \chi_1[\bar{u}/\bar{x}]$ y $\varphi_2 \sim Q_1^2v_1 \dots Q_m^2v_m \chi_2[\bar{v}/\bar{y}]$. Ahora, como \bar{u} y \bar{v} son variables nuevas, aplicando repetidamente el lema 2.54, obtenemos:

$$\begin{aligned} \varphi_1 \vee \varphi_2 &\sim Q_1^1x_1(Q_2^1x_2 \dots Q_n^1x_n \chi_1) \vee Q_1^2y_1 \dots Q_m^2y_m \chi_2 \\ &\sim Q_1^1u_1(Q_2^1x_2 \dots Q_n^1x_n \chi_1[u_1/x_1] \vee Q_1^2y_1 \dots Q_m^2y_m \chi_2) \\ &\vdots \\ &\sim Q_1^1u_1 \dots Q_n^1u_n (\chi_1[\bar{u}/\bar{x}] \vee Q_1^2y_1 \dots Q_m^2y_m \chi_2) \\ &\sim Q_1^1u_1 \dots Q_n^1u_n (Q_1^2y_1 \dots Q_m^2y_m \chi_2 \vee \chi_1[\bar{u}/\bar{x}]) \\ &\sim Q_1^1u_1 \dots Q_n^1u_n Q_1^2v_1(Q_2^2y_2 \dots Q_m^2y_m \chi_2[v_1/y_1] \vee \chi_1[\bar{u}/\bar{x}]) \\ &\vdots \\ &\sim Q_1^1u_1 \dots Q_n^1u_n Q_1^2v_1 \dots Q_m^2v_m (\chi_2[\bar{v}/\bar{y}] \vee \chi_1[\bar{u}/\bar{x}]), \end{aligned}$$

y ya tenemos una forma prenexa. \square

⁶En realidad no hace falta demostrar el paso inductivo para más conectivas ya que el resto de conectivas pueden expresarse en términos de \neg y \vee , como vimos en 1.48

2.10. Método de los *tableaux*

En esta sección desarrollaremos el método de los *tableaux* para lógica de primer orden, análogo al que ya presentamos en el anterior capítulo. Por ello, remitimos toda motivación informal acerca de este procedimiento a lo que ya dijimos allí. Para aprender métodos de este tipo siempre son de ayuda los ejemplos, que hemos incluido al final de la siguiente subsección.

2.10.1. Nociones básicas y ejemplos

Como veremos durante esta sección, para aplicar una regla de construcción de *tableaux* necesitaremos unas constantes auxiliares. Por tanto, supondremos la existencia de un conjunto de constantes auxiliares $C_A = \{c_0, c_1, \dots\}$ en nuestra signatura.

Siempre que tengamos una fórmula existencial en un *tableaux* podremos seleccionar un elemento del conjunto C_A que la verifica. Más adelante veremos un ejemplo.

Las fórmulas que pueden aparecer ahora en nuestros *tableaux* obviamente incluyen a las que lo hacían en los del cálculo proposicional, pero se incorporan algunas nuevas. Es decir, además de las α , β , σ -fórmulas, definimos:

- γ -fórmulas (también llamadas *universales*):

γ	$\gamma(t)$
$\forall x \varphi$	$\varphi[t/x]$
$\neg \exists x \varphi$	$\neg \varphi[t/x]$

Siendo $t \in TERM_S$.

- δ -fórmulas (también llamadas *existenciales*):

δ	$\delta(c)$
$\exists x \varphi$	$\varphi[c/x]$
$\neg \forall x \varphi$	$\neg \varphi[c/x]$

Siendo $c \in C_A$.

- Axiomas de igualdad, EQ_S :

(RF) $\forall x x \doteq x$.

(IM) $\forall x \forall y x \doteq y \rightarrow y \doteq x$.

(TR) $\forall x \forall y \forall z x \doteq y \wedge y \doteq z \rightarrow x \doteq z$.

(ST₁) Sea $f|_n \in Fn_S$. Entonces,

$$\forall x_1, \dots, \forall x_n \forall y_1, \dots, \forall y_n \bigwedge_{i=1}^n x_i \doteq y_i \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \doteq f(y_1, \dots, y_n).$$

(ST₂) Sea $p|_n \in Pd_S$. Entonces,

$$\forall x_1, \dots, \forall x_n \forall y_1, \dots, \forall y_n \bigwedge_{i=1}^n x_i \doteq y_i \wedge p(x_1, \dots, x_n) \rightarrow p(y_1, \dots, y_n).$$

Los nombres de las reglas RF, IM, TR se deben a que a estas propiedades se conocen como reflexiva, simétrica y transitiva. En el caso de las dos últimas se debe a que son reglas de sustitución.

Un resultado análogo al correspondiente de lógica proposicional es el siguiente:

Proposición 2.56. *Sean S signatura, $\varphi \in FORM_S$. Entonces φ verifica una de las siguientes condiciones:*

1. *Es de la forma $\psi, \neg\psi, \perp$ o \top , con $\psi \in FORMAT_S$.*
2. *Es σ -fórmula.*
3. *Es α -fórmula.*
4. *Es β -fórmula.*
5. *Es γ -fórmula.*
6. *Es δ -fórmula.*

Esto asegura que nuestro método nos permitirá descomponer fórmulas arbitrarias en otras de la forma $\perp, \top \psi$ o $\neg\psi$, con $\psi \in FORMAT_S$.

Ahora describimos las reglas para la construcción de *tableaux* asociados a un conjunto de fórmulas Σ :

- Las reglas $R_{ini}, R_{hip}, R_\sigma, R_\alpha, R_\beta$.
- Regla γ, R_γ : Sea





tableau de Σ , donde γ es γ -fórmula y $\gamma(t)$ su versión simplificada. Entonces



es *tableau* de Σ .

Es decir, siempre podemos añadir a una rama abierta una versión simplificada de cualquier γ -fórmula suya y seguimos teniendo un *tableau* de Σ .

- *Regla δ , R_δ* : Sea





tableau de Σ , donde δ es δ -fórmula y $\delta(c)$ su versión simplificada. Entonces



es *tableau* de Σ .

Es decir, siempre que tengamos una rama abierta que contenga una δ -fórmula, δ , la podemos extender con su versión simplificada $\delta(c)$, siendo $c \in C_A$ nueva en tal rama, y seguimos teniendo un *tableau* de Σ .

- Dado un axioma de igualdad, $\theta \in EQ_S$, la *regla θ* : Sea





tableau de Σ . Entonces



Es decir, siempre podemos introducir cada axioma de igualdad θ a una rama.

El siguiente ejemplo muestra por qué, al aplicar la regla δ , la constante auxiliar introducida en la rama debe ser nueva en ella.


Ejemplo 2.57. Consideremos el siguiente razonamiento:

Alguien mató a Trotsky	
Stalin pagó a alguien.	
Stalin pagó a alguien que mató a Trotsky	∴.

Lo formalizamos como:

$\varphi_1: \exists x M(x, Trotsky)$	
$\varphi_2: \exists x P(Stalin, x).$	
$\psi: \exists x M(x, Trotsky) \wedge P(Stalin, x)$	∴.

Es decir, tenemos el conjunto $\Sigma = \{\varphi_1, \varphi_2, \neg\psi\}$.



En el punto 4 hemos aplicado correctamente una regla δ introduciendo la constante auxiliar *Mercader*, y en el 5 hemos vuelto a introducirla por la misma regla, es decir, hemos introducido una constante auxiliar no nueva en la rama. Esto nos ha llevado al absurdo de que la deducción original era válida.

Ejemplo 2.58. Un ejemplo sencillo. Veamos si es válida la siguiente deducción:


Algunos niños son buenos
 Todo lo bueno se come.

 Algunos niños se comen \therefore

Que formalizamos como:

$$\begin{array}{l}
\varphi_1: \exists x (ni(x) \wedge bu(x)) \\
\varphi_2: \forall x (bu(x) \rightarrow co(x)). \\
\hline
\psi: \exists x (ni(x) \wedge co(x)) \quad \therefore
\end{array}$$

Es decir, en este caso, $\Sigma = \{\varphi_1, \varphi_2, \neg\psi\}$. Veamos un tableau cerrado de Σ :



2.10.2. Corrección

Tal y como hicimos en el método de los *tableaux* para lógica proposicional, dados $\Phi \subseteq FORM_S$ y $\varphi \in FORM_S$, escribimos $\Phi \vdash_{tb} \varphi$ cuando existe un *tableau* cerrado para $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$.

Recordemos del capítulo anterior que decimos del método de los *tableaux* que tiene *corrección* si $\Phi \vdash_{tb} \varphi$ implica $\Phi \models \varphi$, y decimos que tiene *completitud* si $\Phi \models \varphi$ implica $\Phi \vdash_{tb} \varphi$.

Vamos a comprobar que el método de los *tableaux* de primer orden tiene ambas propiedades, empezando por la corrección.

Comencemos con el siguiente:

Lema 2.59. *Para todo $\theta \in EQ_S$, $\models \theta$.*

Demostración.

(RF) $\forall x x \doteq x$ es tautología ya que dada una interpretación \mathfrak{I} , se cumple $\mathfrak{I}[a/x] \models x \doteq x$ para todo $a \in A$, ya que obviamente $a = a$.

(IM) $\forall x \forall y x \dot{=} y \rightarrow y \dot{=} x$ es tautología ya que, dada una interpretación \mathcal{I} , se cumple $\mathcal{I}[a/x][b/y] \models x \dot{=} y \rightarrow y \dot{=} x$ para todo $a \in A$, ya que si $a = b$, $\mathcal{I}[a/x][b/y]$ verifica $x \dot{=} y$ y $y \dot{=} x$, por tanto verifica $x \dot{=} y \rightarrow y \dot{=} x$. Si $x \neq y$, $\mathcal{I}[a/x][b/y]$ no verifican $x \dot{=} y$ ni $y \dot{=} x$, por tanto de nuevo verifica $x \dot{=} y \rightarrow y \dot{=} x$.

(TR) $\forall x \forall t \forall z x \dot{=} y \wedge y \dot{=} z \rightarrow x \dot{=} z$ es una tautología. Este caso se demuestra de forma similar a los anteriores, comprobando que $\mathcal{I}[a/x][b/y][c/z]$ siempre verifica $x \dot{=} y \wedge y \dot{=} z \rightarrow x \dot{=} z$. En este caso habría 8 casos, pero se puede hacer dividiendo en los casos $a \neq b$, $a = b \neq c$, $a = b = c$.

(ST₁) Sea $f|_n \in Fn_S$. Entonces,

$$\forall x_1, \dots, \forall x_n \forall y_1, \dots, \forall y_n \bigwedge_{i=1}^n x_i \dot{=} y_i \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \dot{=} f(y_1, \dots, y_n)$$

es una tautología. Se omite la demostración.

(ST₂) Sea $p|_n \in Pd_S$. Entonces,

$$\forall x_1, \dots, \forall x_n \forall y_1, \dots, \forall y_n \bigwedge_{i=1}^n x_i \dot{=} y_i \wedge p(x_1, \dots, x_n) \rightarrow p(y_1, \dots, y_n)$$

es una tautología. Se omite la demostración.

□

El siguiente resultado es fundamental, nos permite extender una rama satisfactible del *tableaux* a otra que también lo es:

Proposición 2.60. *Sea S signatura. Sean $\Phi \subseteq FORM_S$ y \mathcal{I} S -interpretación tales que $\mathcal{I} \models \Phi$. Entonces existe una S -interpretación \mathcal{I}' tal que $\mathcal{I} \sim_{\varphi} \mathcal{I}'$ para toda $\varphi \in \Phi$ de modo que:*

1. *Sea $\sigma \in \Phi$ fórmula simplificable. Entonces $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\sigma_1\}$, con $\sigma \sim \sigma_1$ la simplificación de σ .*
2. *Sea $\alpha \in \Phi$ una α -fórmula. Entonces $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$, con $\alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2$ la descomposición de α .*
3. *Sea $\beta \in \Phi$ una β -fórmula. Entonces $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\beta_1\}$ o $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\beta_2\}$, con $\beta \sim \beta_1 \vee \beta_2$ la descomposición de β .*
4. *Sean $\gamma \in \Phi$ γ -fórmula, $t \in TERM_S$. Entonces $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\gamma(t)\}$.*
5. *Sean $\delta \in \Phi$ δ -fórmula, $c \in C_A$ constante auxiliar nueva en Φ . Entonces $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\delta(c)\}$.*
6. *Para cada $\theta \in EQ_S$, $\mathcal{I}' \models \Phi \cup \{\theta\}$.*

Demostración.

(1), (2) y (3) son análogos a los de lógica proposicional. Basta hacer que $\mathcal{I} = \mathcal{I}'$ y el hecho de que:

$$\sigma \sim \sigma_1, \quad \alpha \sim \alpha_1 \wedge \alpha_2, \quad \beta \sim \beta_1 \vee \beta_2.$$

Veamos (4). Sea $\gamma \in \Phi$ y supongamos, sin pérdida de generalidad, que γ es de la forma $\forall x \varphi$ (si fuese de la forma $\neg \exists x \varphi$, usamos que esto es equivalente a $\forall x \neg \varphi$ y hacemos $\psi := \neg \varphi$). Tomemos $\mathcal{I}' = \mathcal{I}$.

Consideremos el conjunto soporte de la interpretación \mathcal{I} , A . Sea $t \in TERM_S$, y sea $a := t^{\mathcal{I}} \in A$. Dado que $\forall x \varphi \in \Phi$, por hipótesis, $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$, y por tanto, $\mathcal{I}[b/x] \models \varphi$ para todo $b \in A$, en especial, $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi$. Por el Lema de Sustitución, $\mathcal{I} \models \varphi[t/x]$, y notando que $\varphi[t/x] = \gamma(t)$, obtenemos el resultado.

Veamos (5). Sea $\delta \in \Phi$ y supongamos que $\delta = \exists x \varphi$, para $\varphi \in FORM_S$ (en caso de que δ fuese de la forma $\neg \forall x \varphi$, entonces sería equivalente a $\exists x \neg \varphi$ y, haciendo que $\psi := \neg \varphi$, habríamos terminado). Sea $c \in C_A$ constante auxiliar nueva en Φ .

Consideremos de nuevo el conjunto soporte de $\mathcal{I} := \langle \mathcal{A}, \sigma \rangle$, A . Como $\exists x \varphi \in \Phi$, por hipótesis, $\mathcal{I} \models \exists x \varphi$, luego existe $a \in A$ tal que $\mathcal{I}[a/x] \models \varphi$. Ahora definimos \mathcal{A}' como \mathcal{A} excepto que $c^{\mathcal{A}'} = a$. Definamos $\mathcal{I}' := \langle \mathcal{A}', \sigma \rangle$.

Al ser c constante nueva para Φ , es decir, para cada elemento de Φ , tenemos que $\mathcal{I} \sim_{\psi} \mathcal{I}'$, para cada $\psi \in \Phi$, por tanto se cumple $\mathcal{I} \models \psi$ para toda $\psi \in \Phi$. Por el Lema de Sustitución,

$$(\varphi[c/x])^{\mathcal{I}'} = \varphi^{\mathcal{I}'[c^{\mathcal{I}'}/x]} = \varphi^{\mathcal{I}'[a/x]}.$$

Y dado que $\mathcal{I}'[a/x] \sim_{\varphi} \mathcal{I}[a/x]$ por ser c nueva, aplicando una vez más el Lema de Sustitución,

$$\varphi^{\mathcal{I}'[a/x]} = \varphi^{\mathcal{I}[a/x]} = V.$$

Lo que nos da el resultado.

Finalmente, (6) se deduce de 2.59. □

Del siguiente resultado se deducirá como corolario la corrección del método de los *tableaux* de primer orden:

Teorema 2.61. *Sea S signatura. Sea $\Phi \subseteq FORM_S$ conjunto de fórmulas satisfactible y T un tableau abierto finito para Φ . Entonces existe una rama abierta de T , r , tal que Γ_r es satisfactible.*

Demostración. Demostremos que existe una S -interpretación \mathcal{I} y una tal rama r de modo que $\mathcal{I} \models \Phi$ y $\mathcal{I} \models \Gamma_r$.

Al ser T finito, se ha construido en un número finito de reglas R_{ini}, R_1, \dots, R_n , dando lugar la sucesión de *tableaux* $T_0, T_1, \dots, T_n = T$. Por tanto, procedemos

por inducción sobre n .

Si $n = 0$, entonces T_0 es un *tableaux* inicial, es decir, tiene la forma

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ | \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_k \end{array}.$$

Entonces r es la única rama disponible, y $\Gamma_r = \{\varphi_1, \dots, \varphi_k\} \subseteq \Phi$, por lo que, dado que Φ es satisfactible, Γ_r lo es. Por tanto, hemos encontrado una S -interpretación que verifica lo deseado.

Sea $n > 0$ y supongamos que el resultado es cierto para el *tableau* T_{n-1} y veamos que lo es para T_n . Al aplicar la regla R_n a T_{n-1} , extendemos una rama r . Además, por hipótesis de inducción, hay una rama r' tal que $\Gamma_{r'}$ es satisfactible.

Si $r \neq r'$ entonces r' es rama de T_n y, como hemos dicho, verifica que $\Gamma_{r'}$ es satisfactible, con lo que obtenemos el resultado.

Si $r = r'$, debemos distinguir los siguientes casos, dependiendo de qué tipo de regla es R_n :

1. R_n es una regla inicial, de tipo σ , α o β . La demostración es análoga a la que vimos en lógica proposicional.
2. R_n es una regla δ . Sea Γ_r^k el conjunto de fórmulas de la rama r en el árbol k -ésimo. Entonces existe $\delta \in \Gamma_r^{n-1}$ tal que $\Gamma_r^n = \Gamma_r^{n-1} \cup \{\delta(c)\}$, con $c \in C_A$ nueva en r . Por hipótesis de inducción, existe una S -interpretación \mathcal{I} tal que $\mathcal{I} \models \Phi$ y $\mathcal{I} \models \Gamma_r^{n-1}$.
Por 2.60, existe \mathcal{I}' tal que $\mathcal{I}' \models \Gamma_r^{n-1} \cup \{\delta(c)\}$, es decir, tal que $\mathcal{I}' \models \Gamma_r^n$. Al ser c nueva en r , $c \notin \text{voc}(\psi)$, para cada $\psi \in \Phi$, por tanto como en la prueba de 2.60 vimos que \mathcal{I}' solo difiere de \mathcal{I} en c , $\mathcal{I}' \sim_\psi \mathcal{I}$, y por tanto $\mathcal{I}' \models \psi$, es decir, $\mathcal{I}' \models \Phi$.
3. R_n es una regla γ . Existe $\gamma \in \Gamma_r^{n-1}$ tal que $\Gamma_r^n = \Gamma_r^{n-1} \cup \{\gamma(t)\}$, siendo $t \in \text{TERM}_S$. Por hipótesis, existe una S -interpretación \mathcal{I} con $\mathcal{I} \models \Phi$ y $\mathcal{I} \models \Gamma_r^{n-1}$.
Por la prueba de 2.60, la misma \mathcal{I} cumple $\mathcal{I} \models \Gamma_r^{n-1} \cup \{\gamma(t)\}$, por tanto $\mathcal{I} \models \Gamma_r^n$.
4. R_n es una regla θ , con $\theta \in \text{EQ}_S$. Entonces, $\Gamma_r^n = \Gamma_r^{n-1} \cup \{\theta\}$. Por hipótesis de inducción, existe una S -interpretación \mathcal{I} tal que $\mathcal{I} \models \Phi$ y $\mathcal{I} \models \Gamma_r^{n-1}$. Por tanto, $\mathcal{I} \models \Gamma_r^n$.

□

Corolario 2.62. Sea S *signatura*. Si $\Phi \subseteq FORM_S$ y Φ tiene un *tableau* cerrado, entonces Φ es *insatisfactible*.

Demostración. Basta notar que este enunciado es la forma contrapositiva de 2.61. \square

Finalmente, obtenemos el resultado al que hemos dedicado esta subsección:

Corolario 2.63. (*Corrección*) Sean S *signatura*, $\Phi \subseteq FORM_S$, $\varphi \in FORM_S$. Entonces, si $\Phi \vdash_{tb} \varphi$, entonces $\Phi \models \varphi$.

Demostración. Si $\Phi \vdash_{tb} \varphi$, entonces $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$ tiene un *tableau* cerrado y, por 2.62, $\Phi \cup \{\neg\varphi\}$ es *insatisfactible*. Por el resultado análogo a 1.30 para lógica de primer orden, esto implica que $\Phi \models \varphi$. \square

2.10.3. Completitud

El estudio de la completitud va a ser más complicado que en lógica proposicional. Para poder estudiarla, vamos a necesitar introducir una serie de nociones fundamentales de teoría de grafos:

Definiciones 2.64.

- 1) Un *grafo no dirigido* es un par ordenado $T = \langle N, E \rangle$, donde N es el conjunto de *nodos* y E es el conjunto de *aristas*, que son pares sin ordenar de nodos.
- 2) Un camino es una sucesión de (≥ 1) aristas (a_1, \dots, a_n) de forma que el segundo vértice de a_i es el primero de a_{i+1} para $i = 1, \dots, n$. Llamamos a n *longitud del camino*.
- 3) Decimos que el camino es simple si cada vértice del camino solo aparece hasta dos veces, una al final de una arista y otra al principio de la siguiente. Decimos que un camino es un ciclo si es simple y el primer vértice de la primera arista es el segundo vértice de la última arista.
- 4) Decimos que un grafo es *acíclico* si no tiene ciclos. Decimos que un grafo es *conexo* si para cada par de nodos hay un camino entre ellos.
- 5) Un *árbol (libre)* es un grafo no dirigido conexo y acíclico. Equivalentemente, es un grafo tal que entre cada par de sus nodos hay un solo camino simple que los une.
- 6) Sea $G = \langle V, E \rangle$ grafo no dirigido. Se llama *grado* de $v \in V$, $deg(v)$, al número de elementos de E que inciden sobre él.
- 7) Se llama *profundidad* del árbol (libre) $T = \langle N, E \rangle$ a $|N|$.

Se tienen las siguientes propiedades:

Proposición 2.65. Sea $T = \langle N, E \rangle$ un grafo:

1. Si T es un árbol y le quitamos un elemento de E , T deja de ser conexo.
2. Si T tiene finitos nodos, T es un árbol si y solo si $|E| = |N| - 1$.

Demostración. Se omite la demostración. \square

Definiciones 2.66.

1. Un árbol $T = \langle N, E \rangle$ se llama *árbol con raíz* si se selecciona un elemento especial de N , llamado *raíz* de T .
2. Sea $T = \langle N, E \rangle$ árbol con raíz n_0 . Se llama *altura* de $n \in N$, $h(n)$, a la longitud del único camino simple que une n_0 con n .
3. Sea $T = \langle N, E \rangle$ árbol de raíz n_0 . Se dice que $n_1 \in N$ es *hijo de n* si hay una arista que conecta n y n_1 y $h(n_1) = h(n) + 1$. Se dice que n_1 y n_2 son *hermanos* si son hijos del mismo nodo.
4. Sea $T = \langle N, E \rangle$ árbol de raíz n_0 . Llamamos *rama finita* a un camino simple desde n_0 que no está contenido en ningún otro camino simple desde n_0 . Una rama infinita será una sucesión de aristas a_1, a_2, \dots tal que el primer vértice de a_{n+1} es el segundo de a_n para todo n , que parte desde n_0 y en que no se repiten vértices.

De ahora en adelante consideraremos árboles con una raíz determinada.

Definición 2.67. Sean $T_1 := \langle N_1, E_1 \rangle, T_2 := \langle N_2, E_2 \rangle$ dos árboles con la misma raíz. Decimos que T_1 *está incluido en* T_2 , $T_1 \leq T_2$, si:

- $N_1 \subseteq N_2$.
- $E_1 \subseteq E_2$.

Definición 2.68. Sean T_0, \dots, T_k, \dots árboles tales que $T_0 \leq \dots \leq T_k \leq \dots$. Definimos:

$$\lim_{n \in \mathbb{N}} T_n := \langle N, E \rangle$$

siendo $N := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n$ y $E := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ y con la misma raíz que la de T_0 .

Proposición 2.69. Sea $T_0 \leq \dots \leq T_k \leq \dots$ sucesión de árboles. Sea $T := \lim_{n \in \mathbb{N}} T_n$. Entonces:

1. $T_i \leq T$, para todo $i \in \mathbb{N}$.
2. T es un árbol.

Demostración.

1. Se sigue de las definiciones anteriores.

2. Comencemos demostrando que $T = \langle T, N \rangle$ es conexo. Sean $n_1, n_2 \in N$. Como $N := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n$ y $N_i \subseteq N_j$, para todo $i \leq j$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n_1, n_2 \in N_k$. Al ser $T_k = \langle N_k, E_k \rangle$ conexo, existe un camino en T_k que une n_1 y n_2 . Al ser $E_k \subseteq E$ por definición, también es un camino en T , lo que nos da la conexión de T .

Supongamos que existen dos nodos $n_1, n_2 \in N$ tales que existen dos caminos distintos e_1, \dots, e_l y f_1, \dots, f_k que los conectan. Es claro, razonando igual que antes, que existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $n_1, n_2 \in N_i$ y $e_1, \dots, e_l, f_1, \dots, f_k \in E_i$ y, al ser $T_i = \langle N_i, E_i \rangle$ árbol, e_1, \dots, e_l y f_1, \dots, f_k son iguales, lo que implica que T sea acíclico.

□

Nótese que nuestros *tableaux* son árboles con raíz. Además, se cumplirá que las ramas cerradas serán siempre finitas.

Necesitamos el siguiente resultado técnico de la teoría de grafos:

Teorema 2.70. (*Lema de König para árboles*) Sea T un árbol con raíz con infinitos nodos tal que cada nodo tiene finitos hijos. Entonces T tiene una rama infinita.

Demostración. Se omite la demostración.

□

Proposición 2.71. Si T es *tableau cerrado*, es finito.

Demostración. Usaremos reducción al absurdo. Sea T un *tableau* infinito cerrado. Observemos que, en todo *tableau*, el número máximo de hijos de cada nodo es dos: los que se pueden obtener por la aplicación de una regla β . Por tanto, por 2,70 el *tableau* contiene una rama infinita. Esto contradice el hecho de que todas las ramas cerradas son finitas.

□