



**Instituto Superior Universitario Tecnológico del Azuay**  
**Tecnología Superior en Big Data**

**Guía Practica - Integrales**

**Alumno:**

Eduardo Mendieta

**Materia:**

Matemática

**Docente:**

Lcda. Vilma Duchi, Mgtr.

**Ciclo:**

Primer ciclo

**Fecha:**

06/09/2024

**Periodo Académico:**

Abril 2024 - Agosto 2024


# Guía Practica - Integrales

Resolver las siguientes integrales:

- **Ejercicio 1:** La obra arquitectónica en forma de arco catenario es el Gateway Arch de San Luis(Missouri) diseñada por el arquitecto finlandes Eero Saarinen, este arco tiene como ecuación la siguiente expresión:


$$y = 693,85 - 68,76 \cdot \left( \frac{e^{0,0100333x} + e^{-0,0100333x}}{2} \right)$$

1. Ingrese dicha ecuación en GeoGebra y obtenga su respectiva gráfica:



2. Obtén las raíces (puntos de corte con el eje x ) para obtener los extremos del intervalo:

<input type="radio"/>	Raíces(f, -1078.74, 1599.7) = A = (-299.24, 0)
<input type="radio"/>	B = (299.24, 0)




3. ¿Cuál es la anchura de ese intervalo?

$$anchura = 299,24 - (-299,24) = 598,48$$

4. Con el comando **SumaSuperior** divide a ese intervalo de acuerdo a la siguiente tabla y anota el valor de dicha suma:


Número de rectángulos	Valor del área
4	346225.2
10	310921.52
100	281319.96
1000	277993.78
10000	277657.48
100000	277657.48

```
a = SumaSuperior(f, -299.24, 299.24, 4)
= 346225.2
```




$$a = \text{SumaSuperior}(f, -299.24, 299.24, 10)$$

$$= 310921.52$$




$$a = \text{SumaSuperior}(f, -299.24, 299.24, 100)$$

$$= 281319.96$$




$$a = \text{SumaSuperior}(f, -299.24, 299.24, 1000)$$

$$= 277993.78$$




$$a = \text{SumaSuperior}(f, -299.24, 299.24, 10000)$$

$$= 277657.48$$



```
a = SumaSuperior(f, -299.24, 299.24, 100000)
= 277657.48
```




5. ¿Cuál valor de número de rectángulo se aproxima mejor el área bajo esa curva?  
Para ello utilizar el comando **Integral**:

Valor de área con el comando <b>Integral</b>	277620.08
Valor de área con el comando <b>SumaSuperior</b>	277657.48 - 100000 rectángulos

$$b = \int_{-299.24}^{299.24} f \, dx$$

$$= 277620.08$$




■ Ejercicio 2: Hallar el área de la región limitada por las curvas:

1.

$$y = 2 - x^2, y = x$$

$$\int_{-2}^1 2 - x^2 - x \, dx = \left[ 2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^1 = \dots$$

$$\dots = 2(1) - \frac{(1)^3}{3} - \frac{(1)^2}{2} - 2(-2) + \frac{(-2)^3}{3} + \frac{(-2)^2}{2} = 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 4 - \frac{8}{3} + 2 = \frac{9}{2} u^2$$




2.

$$y = 4x - x^2, y = 0, x = 1, x = 3$$

$$\int_1^3 4x - x^2 \, dx = \left[ 2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \dots$$

$$\dots = 2(3)^2 - \frac{(3)^3}{3} - 2(1)^2 + \frac{(1)^3}{3} = 18 - 9 - 2 + \frac{1}{3} = \frac{22}{3} u^2$$




---

3.

$$y = \sqrt{x-4}, y = 0, x = 8$$

$$\begin{aligned} \int_4^8 (x-4)^{1/2} dx &= \int_4^8 (v)^{1/2} dv = \left[ \frac{2}{3} v^{3/2} \right]_4^8 = \dots \\ \dots &= \left[ \frac{2}{3} (x-4)^{3/2} \right]_4^8 = \frac{2}{3} (4)^{3/2} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3} u^2 \end{aligned}$$





---

4.

$$y = x^2 - 4x + 3, x - y - 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \int_1^4 -x^2 + 5x - 4 dx &= \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right]_1^4 = \dots \\ \dots &= -\frac{(4)^3}{3} + 5\frac{(4)^2}{2} - 4(4) + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 4 = -\frac{64}{3} + 40 - 16 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{13}{2} u^2 \end{aligned}$$




---

5.

$$y = \sqrt{2x}, y = 2x - 4, x = 0$$

$$\int dx = \square = \dots$$

$$\dots == u^2$$




---

6.

$$y^2 - 2x = 0, y^2 + 4x - 12 = 0$$

---

7.

$$y^2 = x + 2, y = x - 4$$

---

8.

$$y = x^2, y = -x^2 + 4x$$

---

9.

$$y = x + 6, y = x^3, y = -\frac{2x}{4}$$

---

10.

$$y = |x - 1|, y = x^2 - 3$$


---



11.

$$y = x^3 + 3x^2, y = x$$


---

12.

$$y = x^3 - 6x^2 + 8x, y = x^2 - 4x$$

- Ejercicio 3: Calcular el volúmen del sólido generado por la rotación de la región  $R$  al rededor del eje indicado; siendo  $R$  la región limitada por las curvas, cuyas ecuaciones se dan a continuación:
- 

a.

$$y = 2x - x^2, y = 0, x = 0, x = 1; eje \rightarrow y$$


---

b.

$$x = 1, y = \frac{\pi}{2}, y = \arctan x, x = 4; eje \rightarrow y$$


---

c.

$$y = 0, y = 3, x = 1, x = 3, y = \frac{1}{x-1}; eje \rightarrow x = 1$$

- Ejercicio 4: Sea  $R$  la región limitada por las curvas:  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{x}$  y las rectas  $y = 0$ ,  $x = 2$ :
    - a) Calcule el volúmen del sólido que se genera al rotar  $R$  al rededor del eje  $x = 2$ .
    - b) Calcule el volúmen del sólido que se genera al rotar  $R$  al rededor del eje  $y = 1$ .
  - Ejercicio 5: Determine el volúmen del sólido de revolución generado al rotar en torno al eje  $x = 9$  la región limitada por las curvas:  $y^2 = 9 - x$ ,  $y = 3 - x$ .
  - Ejercicio 6: Calcular el volúmen del sólido generado al hacer girar alrededor de la recta  $x = -4$  la región acotada por las curvas:  $x = y - y^2$ ,  $x = y^2 - 3$ .
  - Ejercicio 7: Encuentre el volúmen del sólido generado por la rotación en torno a la recta  $y = 2$  de la región del primer cuadrante limitada por las parábolas  $3x^2 - 16y + 48 = 0$ ,  $x^2 - 16y + 80 = 0$  y el eje de las  $y$ .
  - Ejercicio 8: Resuelva las siguientes integrales dobles:
- 

1. Calcular:

$$\int_0^1 \int_0^y e^{x+y} dx dy$$


---

2. Calcular:

$$\int_0^2 \int_{x^2}^4 \sqrt{y} \cos y dy dx$$


---

3. Calcular:

$$\int_0^1 \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} dx dy$$

---

4. Invierta el orden de integración:

$$\int_{-1}^2 \int_{-\sqrt{3+x}}^{x-1} f(x, y) dy dx + \int_2^3 \int_{-\sqrt{3+x}}^{\sqrt{3+x}} f(x, y) dy dx$$

---

5. Invertir el orden de integración y evaluar:

$$\int_0^1 \int_0^x y dy dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} y dy dx$$