第2026-08号
发行月 ： 2026.8.

2026年儿童之家婴幼儿健康管理访问项目

家庭通知书


夏季婴幼儿感染病的预防

在炎热的夏季，托儿所和幼儿园等集体生活空间，感染病很容易迅速蔓延。本期介绍在幼儿园容易发生的夏季感染病和家庭预防及管理方法，因此孩子生病时，不要勉强送孩子去幼儿园。



1. 夏季眼病

◆ 眼病是?



◇ 夏季流行的代表性传染性眼病有**流行性角结膜炎**(腺病毒)和**急性出血性结膜炎**(阿波罗眼病，肠道病毒).

◇ 传染力极强，在托儿所及幼儿园等容易集体传染，通过与被污染的手或物品(毛巾及洗漱用品等)的 接触传播。

◇ 用肉眼可以确认状态后，约5~14天以后出现症状，发病后**大约2周传染力强。**

◆ 请注意这些症状

流行性角结膜炎	急性出血性结膜炎(阿婆罗眼病)
√ 眼睛充血，流泪	√ 突然性的眼睛充血
√ 眼屎多	√ 结膜(白色)的出血斑点
√ 异物感(进沙粒的感觉)	√ 眼痛及异物感
√ 耀眼，眼皮浮肿	√ 眼泪及眼屎
√ 症状一般持续2~3周	√ 大约1~2周内好转

◆ 请在家庭内这样管理

◇ 不要揉眼睛或摸眼睛，摸后用香皂洗手。

◇ 用人工眼泪或冷敷减少不适感，为了预防第二次感染，使用治疗后医院处方的眼药水。

◇ 毛巾、枕头、洗漱用品**必须单独使用**，孩子用过的东西要经常清洗及消毒。

◇ 在传染力强的**约2周内**，**尽量不要去**幼儿园和游泳池、澡堂等**公共设施**。

※ *视力下降或疼痛严重时，务必到眼科就诊。(急性出血性结膜炎，可能会发生罕见的并发症)*

◆ 预防守则

◇ 用肥皂在流水中洗手30秒以上

◇ 眼睛和脸部不要用手摸或揉

◇ 分开使用毛巾、枕头、洗漱用品等个人物品

◇ 流行眼病时禁止去游泳池等人多的地方





2. 夏季传染性皮肤疾病 - 脓疱疹

◆ 脓疱疹?

◇ 主要是夏季容易发生在儿童及婴幼儿皮肤上的浅化脓性细菌感染，其原因是金黄色葡萄球菌或化脓性链球菌。

◇ 细菌的侵入是通过虫子叮咬和划伤、皮肤的小裂纹，**传染力强**，**通过触摸的手**传染其他部位或孩子。

◇ 容易长在脸(特别是鼻子及嘴周围)和胳膊腿等暴露部位。

◆ 请注意这些症状

◇ **小水泡或红斑开始并迅速蔓延**，水泡容易破裂。

◇ 破裂的地方结**黄色(蜜色)脓水和**痂。

◇ 挠痒时，通过手会扩散到其他的部位。(自我传播)

◆ 请在家庭内这样管理

◇ 用肥皂和水清洗病变部位，**轻轻去除黄色痂皮**。

◇ **用纱布或松紧纱布**包裹感染部位，防止传染到其他部位或其他孩子。

◇ 为防止挠伤口，**剪短指甲，**经常洗后。

◇ 需要抗生素治疗，接受医院治疗，**毛巾、衣服、床上用品要单独洗涤**。

※ *特别是婴幼儿可能会出现罕见的肾小球肾炎及败血症等并发症，因此早期接受治疗非常重要。*

◆ 预防守则



每天洗澡及淋浴，清洁肌肤



清洗伤口及虫子叮咬部位，不要挠



洗手及剪短指甲



分开使用毛巾及衣服等 个人物品

手足口病 - 现在是流行高峰，再告诉大家!

曾在**第4号**的家庭通知书上提过，再强调一下，现在随着夏季的顶峰点，手足口病正在持续流行，**特别是在5岁以下的婴幼儿中，以幼儿园为中心迅速蔓延。**

◆ 请务必记住这一点

◇ 症状: **发热、咽喉痛、口腔内的水泡及溃疡，手脚及臀部的水泡性皮疹**

◇ 若有疑症，请立即接受治疗，并尽量限制登园等团体活动。

◇ 隔离及登园: 发病后的约**1周是传染力最强的时期**，建议在恢复了整体状态及可以进行正常的饮食活动时，去幼儿园. *(每个机构有所不同，可能需要医生意见书或登园确认书.)*

◇ 用肥皂在流水中洗手30秒以上

◇ 玩具、门手把等手接触过的表面，用家用消毒剂消毒

◇ 杯子、餐具、毛巾等**分开**使用

※ *原因、症状、感染途径等详细内容，请参考家庭通知书第4号(手足口病)。*

< 资料来源: 疾病管理厅，首尔大学医院·首尔峨山医院健康信息>

※ 本资料的一部分，利用了AI生成的图像。

儿童之家婴幼儿健康管理访问项目团