제 2026-08호
발행월 : 2026.8.

2026년 어린이집 영유아 방문건강관리 사업

가정통신문


여름철 영유아 감염병 예방

무더운 여름철에는 어린이집·유치원 등 단체생활 공간에서 감염병이 빠르게 번지기 쉽습니다. 어린이집에서 발생하기 쉬운 여름철 감염병과 가정에서의 예방·관리 방법을 안내드리니, 아이가 아플 때는 무리해서 등원하지 않도록 함께 살펴 주세요.



1. 여름철 눈병

◆ 눈병이란?



◇ 여름철에 유행하는 대표적인 전염성 눈병으로, **유행성 각결막염**(아데노바이러스)과 **급성 출혈성 결막염**(아폴로눈병, 엔테로바이러스)이 있습니다.

◇ 전염력이 매우 강해 어린이집·유치원 등에서 집단으로 번지기 쉬우며, 오염된 손이나 물건(수건, 세면도구 등)과의 접촉을 통해 전파됩니다.

◇ 눈에 노출된 뒤 약 5~14일 후 증상이 나타나고, 발병 후 **약 2주간 전염력이 강합니다**.

◆ 이런 증상을 주의하세요

유행성 각결막염	급성 출혈성 결막염 (아폴로 눈병)
√ 눈 충혈, 눈물 흘림 √ 눈곱이 많이 생김 √ 이물감(모래알이 들어간 느낌) √ 눈부심, 눈꺼풀 부종 √ 증상이 보통 2~3주 지속	√ 갑작스러운 눈 충혈 √ 결막(흰자)의 출혈 반점 √ 눈 통증·이물감 √ 눈물·눈곱 √ 대개 1~2주 내 호전

◆ 가정에서 이렇게 관리하세요

◇ 눈을 비비거나 만지지 않게 하고, 만진 뒤에는 흐르는 물에 비누로 손을 씻깁니다.

◇ 인공눈물이나 냉찜질로 불편함을 줄이고, 이차 감염 예방을 위해 안과 진료 후 처방받은 안약을 사용합니다.

◇ 수건·베개·세면도구는 **반드시 따로 사용**하고, 아이가 쓴 물건은 자주 세척·소독합니다.

◇ 전염력이 강한 **약 2주간** 어린이집 등원과 수영장·목욕탕 등 **다중이용시설 방문을 자제**합니다.

※ *시력이 떨어지거나 통증이 심하면 반드시 안과 진료를 받으세요. (급성 출혈성 결막염은 드물게 합병증이 생길 수 있습니다)*

◆ 예방수칙

◇ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기

◇ 눈, 얼굴을 손으로 만지거나 비비지 않기

◇ 수건, 베개, 세면도구 등 개인 물품 따로 쓰기

◇ 눈병이 유행할 때는 수영장 등 사람 많은 곳에 가지 않기





2. 여름철 전염성 피부질환 - 농가진

◆ 농가진이란?

◇ 주로 여름철에 소아·영유아의 피부에 잘 생기는 얕은 화농성 세균 감염으로, 황색포도알균 또는 화농성사슬알균이 원인입니다.

◇ 벌레 물린 자리, 긁힌 상처, 작은 피부 균열을 통해 세균이 침입하며, **전염력이 강해 만진 손**을 통해 다른 부위나 다른 아이에게 옮습니다.

◇ 얼굴(특히 코·입 주위)과 팔다리 등 노출 부위에 잘 생깁니다.

◆ 이런 증상을 주의하세요

◇ **작은 물집이나 붉은 반점**으로 시작해 빠르게 번지고, 물집이 쉽게 터집니다.

◇ 터진 자리에 **노란색(꿀색) 진물과 딱지**가 앉습니다.

◇ 가려워서 긁으면 손을 통해 다른 부위로 번집니다. (자가전파)

◆ 가정에서 이렇게 관리하세요

◇ 병변 부위를 비누와 물로 깨끗이 씻고, **노란 딱지는 부드럽게 제거**합니다.

◇ 감염 부위를 **거즈나 밴드로 덮어** 다른 부위·다른 아이로의 전파를 막습니다.

◇ 긁지 않도록 손톱을 짧게 깎고, 손을 자주 씻깁니다.

◇ 항생제 치료가 필요하므로 병·의원 진료를 받고, **수건·옷·침구는 따로 세탁**합니다.

※ *특히 영아는 드물게 사구체신염·패혈증 등 합병증이 생길 수 있어 조기에 진료받는 것이 중요합니다.*

◆ 예방수칙



매일 목욕·샤워로 피부를 깨끗하게 유지하기



상처나 벌레 물린 자리는 깨끗이 씻고 긁지 않기



손씻기, 손톱 짧게 관리하기



수건·옷 등 개인 물품 따로 쓰기

수족구병 - 지금 유행 정점, 다시 한번 알려드립니다!

지난 **제4호**에서 안내드린 수족구병이 현재 여름철 정점을 맞아 유행이 지속되고 있어 다시 강조해 드립니다. 특히 5세 이하 영유아에서 어린이집을 중심으로 빠르게 번지고 있습니다.

◆ 이것만은 꼭 기억해 주세요

◇ 증상: **발열·인후통**과 함께 **입안의 물집·궤양, 손·발·엉덩이의 수포성 발진**

◇ 의심되면 바로 진료받고, 등원 등 단체활동을 자제해 주세요.

◇ 격리·등원: 발병 후 약 **1주일이 전염력이 가장 강한 시기**입니다. 발열이 없고 전반적인 컨디션이 회복되어 정상적인 식사화 활동이 가능할 때 등원을 권장합니다.
(기관에 따라 의사 소견서나 등원 확인서가 필요할 수 있습니다.)

◇ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기

◇ 장난감·문 손잡이 등 손이 닿는 표면은 가정용 소독제로 소독하기

◇ 컵·식기·수건 등은 **따로 사용**하기

※ *원인·증상·감염경로 등 자세한 내용은 제4호 가정통신문(수족구병)을 참고해 주세요.*

< 자료 출처: 질병관리청, 서울대학교병원·서울아산병원 건강정보>
※ 본 자료의 일부 이미지는 AI 생성 이미지를 활용하였습니다.

어린이집 영유아 방문건강관리 사업단

서울특별시

서울특별시간호사회
Seoul Nurses Association

