

家庭通知书

夏季婴幼儿感染病的预防


在炎热的夏季，托儿所和幼儿园等集体生活空间，感染病很容易迅速蔓延。本期介绍在幼儿园容易发生的夏季感染病和家庭预防及管理方法，因此孩子生病时，不要勉强送孩子去幼儿园。



1. 夏季眼病

◆ 眼病是？

- ◇ 夏季流行的代表性传染性眼病有流行性角结膜炎(腺病毒)和急性出血性结膜炎(阿波罗眼病, 肠道病毒)。
- ◇ 传染力极强, 在托儿所及幼儿园等容易集体传染, 通过与被污染的手或物品(毛巾及洗漱用品等)的接触传播。
- ◇ 用肉眼可以确认状态后, 约5~14天以后出现症状, 发病后**大约2周**传染力强。



◆ 请注意这些症状

流行性角结膜炎	急性出血性结膜炎(阿婆罗眼病)
√ 眼睛充血, 流泪 √ 眼屎多 √ 异物感(进沙粒的感觉) √ 耀眼, 眼皮浮肿 √ 症状一般持续2~3周	√ 突然性的眼睛充血 √ 结膜(白色)的出血斑点 √ 眼痛及异物感 √ 眼泪及眼屎 √ 大约1~2周内好转

◆ 请在家庭内这样管理

- ◇ 不要揉眼睛或摸眼睛, 摸后用香皂洗手。
- ◇ 用人工眼泪或冷敷减少不适感, 为了预防第二次感染, 使用治疗后医院处方的眼药水。
- ◇ 毛巾、枕头、洗漱用品**必须单独使用**, 孩子用过的东西要经常清洗及消毒。
- ◇ 在传染力强的约**2周内**, **尽量不要去**幼儿园和游泳池、澡堂等**公共设施**。
- ※ 视力下降或疼痛严重时, 务必到眼科就诊。(急性出血性结膜炎, 可能会发生罕见的并发症)

◆ 预防守则

- ◇ 用肥皂在流水中洗手30秒以上
- ◇ 眼睛和脸部不要用手摸或揉
- ◇ 分开使用毛巾、枕头、洗漱用品等个人物品
- ◇ 流行眼病时禁止去游泳池等人多的地方





2. 夏季传染性皮肤疾病 - 脓疱疹

◆ 脓疱疹?

- ◇ 主要是夏季容易发生在儿童及婴幼儿皮肤上的浅化脓性细菌感染，其原因是金黄色葡萄球菌或化脓性链球菌。
- ◇ 细菌的侵入是通过虫子叮咬和划伤、皮肤的小裂纹，**传染力强**，**通过触摸的手**传染其他部位或孩子。
- ◇ 容易长在脸(特别是鼻子及嘴周围)和胳膊腿等暴露部位。

◆ 请注意这些症状

- ◇ 小水泡或红斑开始并迅速蔓延，水泡容易破裂。
- ◇ 破裂的地方结黄色(蜜色)脓水和痂。
- ◇ 挠痒时，通过手会扩散到其他的部位。(自我传播)

◆ 请在家庭内这样管理

- ◇ 用肥皂和水清洗病变部位，轻轻去除黄色痂皮。
 - ◇ 用纱布或松紧纱布包裹感染部位，防止传染到其他部位或其他孩子。
 - ◇ 为防止挠伤口，剪短指甲，经常洗后。
 - ◇ 需要抗生素治疗，接受医院治疗，毛巾、衣服、床上用品要单独洗涤。
- ※ 特别是婴幼儿可能会出现罕见的肾小球肾炎及败血症等并发症，因此早期接受治疗非常重要。

◆ 预防守则



每天洗澡及淋浴，
清洁肌肤



清洗伤口及虫子叮咬
部位，不要挠



洗手及剪短指甲



分开使用毛巾及衣服
等个人物品

手足口病 - 现在是流行高峰，再告诉大家!

曾在第4号的家庭通知书上提过，再强调一下，现在随着夏季的顶峰点，手足口病正在持续流行，特别是在5岁以下的婴幼儿中，以幼儿园为中心迅速蔓延。

◆ 请务必记住这一点

- ◇ 症状: 发热、咽喉痛、口腔内的水泡及溃疡，手脚及臀部的水泡性皮疹
- ◇ 若有疑症，请立即接受治疗，并尽量限制登园等团体活动。
- ◇ 隔离及登园: 发病后的约1周是**传染力最强的时期**，建议在恢复了整体状态及可以进行正常的饮食活动时，去幼儿园。(每个机构有所不同，可能需要医生意见书或登园确认书)
- ◇ 用肥皂在流水中洗手30秒以上
- ◇ 玩具、门把手等手接触过的表面，用家用消毒剂消毒
- ◇ 杯子、餐具、毛巾等**分开使用**

※ 原因、症状、感染途径等详细内容，请参考家庭通知书第4号(手足口病)。

< 资料来源: 疾病管理厅, 首尔大学医院·首尔峨山医院健康信息 >

※ 本资料的一部分，利用了AI生成的图像。