

MODELOS DE COMPUTACIÓN.

RELACION DE PROBLEMAS I.

1. Describir el lenguaje generado por la siguiente gramática,

$$S \rightarrow XYX$$

$$X \rightarrow aX \mid bX \mid \epsilon$$

$$Y \rightarrow bbb$$

2. Describir el lenguaje generado por la siguiente gramática,

$$S \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow aX \mid bX \mid \epsilon$$

3. Describir el lenguaje generado por la siguiente gramática

$$S \rightarrow XaXaX$$

$$X \rightarrow aX \mid bX \mid \epsilon$$

4. Describir el lenguaje generado por la siguiente gramática

$$S \rightarrow SS \mid XaXaX \mid \epsilon$$

$$X \rightarrow bX \mid \epsilon$$

5. Encontrar la gramática libre de contexto que genera el lenguaje sobre el alfabeto $\{a, b\}$ de las palabras que tienen mas a que b (al menos una más).

6. Encontrar gramáticas de tipo 2 para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b\}$. En cada caso determinar si los lenguajes generados son de tipo 3, estudiando si existe una gramática de tipo 3 que los genera.

(i) Palabras en las que el numero de b no es tres.

(ii) Palabras que tienen 2 o 3 b .

(iii) Palabras que no contienen la subcadena ab

(iv) Palabras que no contienen la subcadena baa

7. Encontrar una gramática libre del contexto que que genere el lenguaje

$$L = \{1u1 \mid u \in \{0, 1\}^*\}.$$

8. Encontrar si es posible una gramática lineal por la derecha o una gramática libre del contexto que genere el lenguaje L supuesto que $L \subset \{a, b, c\}^*$ y verifica:

- $u \in L$ si y solamente si verifica que u no contiene dos símbolos b consecutivos.
- $u \in L$ si y solamente si verifica que u contiene dos símbolos b consecutivos.
- $u \in L$ si y solamente si verifica que contiene un número impar de símbolos c .
- $u \in L$ si y solamente si verifica que no contiene el mismo número de símbolos b que de símbolos c .

9. a) Dado el alfabeto $A = \{a, b\}$ determinar si es posible encontrar una gramática libre de contexto que genere las palabras de longitud impar, y mayor o igual que 3, tales que la primera letra coincida con la letra central de la palabra.

b) Dado el alfabeto $A = \{a, b\}$ determinar si es posible encontrar una gramática libre de contexto que genere las palabras de longitud par, y mayor o igual que 2, tales que las dos letras centrales coincidan.

10. Determinar si el lenguaje generado por la gramática

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SS \\ S &\rightarrow XXX \\ X &\rightarrow aX|Xa|b \end{aligned}$$

es regular. Justificar la respuesta.

11. Dado un lenguaje L sobre un alfabeto A , caracterizar cuando $L^* = L$.

12. Dado un lenguaje L sobre un alfabeto A , determinar si L^* es siempre, nunca o a veces numerable.

13. Dados dos homomorfismos $f : A^* \rightarrow B^*$, $g : A^* \rightarrow B^*$, se dice que son iguales si $f(x) = g(x)$, $\forall x \in A^*$. ¿Existe un procedimiento algorítmico para comprobar si dos homomorfismos son iguales?

14. Sea $L \subseteq A^*$ un lenguaje arbitrario. Sea $C_0 = L$ y definamos los lenguajes S_i y C_i , para todo $i \geq 1$, por $S_i = C_{i-1}^+$ y $C_i = \overline{S_i}$.

a) ¿Es S_1 siempre, nunca o a veces igual a C_2 ? justifica la respuesta

b) Demostrar que $S_2 = C_3$, cualquiera que sea L . (Pista: Demuestra que C_3 es cerrado para la concatenación).

15. Demuestra que para todo alfabeto A , el conjunto de los lenguajes finitos sobre dicho alfabeto es numerable.

16. Dada la gramática $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ donde $P = \{S \rightarrow abAS, abA \rightarrow baab, S \rightarrow a, A \rightarrow b\}$.

Determinar el lenguaje que genera.

17. Sea la gramática $G = (V, T, P, S)$ donde:

- $V = \{< numero >, < digito >\}$
- $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $S = < numero >$
- Las reglas de producción P son:
 - $< numero > \rightarrow < numero > < digito >$
 - $< numero > \rightarrow < digito >$
 - $< digito > \rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$

Determinar el lenguaje que genera.

18. Sea la gramática $G = (\{A, S\}, \{a, b\}, S, P)$ donde las reglas de producción son:

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bA$$

$$A \rightarrow b$$

Determinar el lenguaje generado por la gramática

19. Encontrar si es posible una gramática lineal por la derecha o una gramática independiente del contexto que genere el lenguaje L , en cada unos de los casos, supuesto que $L \subseteq \{a, b, c\}^*$ y verifica:

- $u \in L$ si y solamente si verifica que u no contiene dos símbolos b consecutivos.
- $u \in L$ si y solamente si verifica que u contiene dos símbolos b consecutivos
- $u \in L$ si y solamente si verifica que contiene un número impar de símbolos c
- $u \in L$ si y solamente si verifica que no contiene el mismo número de símbolos b que de símbolos c .