

İST-265 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

UYGULAMA-3 ÇÖZÜMLER


1) X kesikli raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonu aşağıda verilmiştir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{31} \cdot \frac{1}{2^x}, & x = -2, -1, 0, 1, 2 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = |X|$ raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$f(x)$, x grafiği



$Y = |X|$ için;

$$Y = |X| \begin{cases} y = x \rightarrow x_1 = y \\ y = -x \rightarrow x_2 = -y \end{cases} \text{ olarak bulunur.}$$

$$x = -2 \text{ için } y = 2$$

$$x = -1 \text{ için } y = 1$$

$$x = 0 \text{ için } y = 0$$

$$x = 1 \text{ için } y = 1$$

$$x = 2 \text{ için } y = 2$$

Yani $x = -2, -1, 0, 1, 2$ için $y = 0, 1, 2$ olarak bulunur.

$$g(y) = P(Y = y)$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{4}{31} \cdot \frac{1}{2^0} = \frac{4}{31}$$

$$P(Y=1)=P(X=-1 \text{ veya } X=1)=P(X=-1)+P(X=1)$$

$$=\frac{4}{31} \frac{1}{2^{-1}} + \frac{4}{31} \frac{1}{2^1} = \frac{8}{31} + \frac{2}{31} = \frac{10}{31}$$


$$P(Y=2)=P(X=-2 \text{ veya } X=2)=P(X=-2)+P(X=2)$$

$$=\frac{4}{31} \frac{1}{2^{-2}} + \frac{4}{31} \frac{1}{2^2} = \frac{16}{31} + \frac{1}{31} = \frac{17}{31}$$

$$g(y) = \begin{cases} \frac{4}{31}, & y=0 \\ \frac{10}{31}, & y=1 \\ \frac{17}{31}, & y=2 \end{cases}$$

olarak bulunur.

$g(y)$, y grafiği




2) X kesikli raslantı deęişkeninin olasılık fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & , x = -1, 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = 2X + 1$ raslantı deęişkeninin olasılık fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$f(x)$, x grafięi



$Y = 2X + 1$ verildięinde

$$x = -1 \rightarrow y = 2(-1) + 1 = -1$$

$$x = 0 \rightarrow y = 1$$

$$x = 1 \rightarrow y = 3$$

$$x = 2 \rightarrow y = 5$$

$$x = 3 \rightarrow y = 7$$

$$x = 4 \rightarrow y = 9$$

Yani $x = -1, 0, 1, 2, 3, 4$ için $y = -1, 1, 3, 5, 7, 9$ olur.

$$g(y) = P(Y = y)$$

$$P(Y = -1) = P(X = -1) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y = 1) = P(X = 0) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y = 3) = P(X = 1) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y = 5) = P(X = 2) = \frac{1}{6}$$


$$P(Y = 7) = P(X = 3) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y = 9) = P(X = 4) = \frac{1}{6}$$

$$g(y) = \begin{cases} 1/6, & y = -1 \\ 1/6, & y = 1 \\ 1/6, & y = 3 \\ 1/6, & y = 5 \\ 1/6, & y = 7 \\ 1/6, & y = 9 \end{cases}$$

olarak bulunur.

$g(y)$, y grafiđi



3) X raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} 42x^5(1-x) & , 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = X^3$ raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.


Çözüm:

I.Yol:

Hatırlatma: Sürekli durum için teorem:

$Y = h(x)$ diferansiyellenebilir ve düzgün artan/azalan bir fonksiyon ise;

$$g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|, \quad x = h^{-1}(y)$$



$Y = X^3$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

$$Y = X^3 \rightarrow X = Y^{\frac{1}{3}}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}}$$

Sınırlar;

$$x=0 \text{ için } y=0$$

$$x=1 \text{ için } y=1$$

olur.

$$\begin{aligned} g(y) &= f(x) \frac{dx}{dy} = 42(y^{1/3})^5(1-y^{1/3}) \frac{1}{3} y^{-2/3} = \frac{42}{3} y^{5/3}(1-y^{1/3}) y^{-2/3} \\ &= 14y(1-y^{1/3}), \quad 0 < y < 1 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

II.Yol:

Hatırlatma: Dağılım Fonksiyonu Yöntemi:

$$G(y) = P(Y \leq y) = P(h(x) \leq y) = P(X \leq h^{-1}(y))$$

$$\int_{h^{-1}(y)} f(x)dx = G(y)$$

$$g(y) = \frac{dG(y)}{dy}$$

O halde:


$$G(y) = P(Y \leq y) = F(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3})$$

$$\int_0^{y^{1/3}} f(x)dx = \int_0^{y^{1/3}} 42x^5(1-x)dx = \left(7x^6 - 6x^7\right)_0^{y^{1/3}} = 7y^2 - 6y^{7/3} = G(y)$$

$$g(y) = \frac{dG(y)}{dy} = \frac{d[7y^2 - 6y^{7/3}]}{dy} = 14y - 14y^{4/3} = 14y(1 - y^{1/3}), 0 < y < 1$$

olarak bulunur.

$g(y)$, y grafiği




4) X raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} 7e^{-7x} & , x > 0 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = 4X + 3$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

I.Yol:



$Y = 4X + 3$ artan olduęu için
teorem uygulanabilir.

$$Y = 4X + 3 \rightarrow 4X = Y - 3 \rightarrow X = \frac{Y-3}{4}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{4}$$

Sınırlar;

$$x = 0 \text{ için } y = 4(0) + 3 = 3$$

olur.

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = 7e^{-7\left(\frac{y-3}{4}\right)} \frac{1}{4}, \quad y > 3$$

olarak bulunur.

II.Yol:


$$G(y) = P(Y \leq y) = P(4X + 3 \leq y) = P(4X \leq y - 3) = P\left(X \leq \frac{y-3}{4}\right)$$

$$\int_0^{\frac{y-3}{4}} f(x)dx = \int_0^{\frac{y-3}{4}} 7e^{-7x} dx = \left(\frac{7e^{-7x}}{-7}\right)_0^{\frac{y-3}{4}} = -e^{-7\left(\frac{y-3}{4}\right)} + 1 = G(y)$$


$$g(y) = \frac{dG(y)}{dy} = -\left(-\frac{7}{4}\right)e^{-7\left(\frac{y-3}{4}\right)} = \frac{7}{4}e^{-7\left(\frac{y-3}{4}\right)}, y > 3$$

olarak bulunur.

f(x), x grafiđi



g(y), y grafiđi




5) X raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(n+m+1)!}{n! m!} x^n (1-x)^m, & 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere $Y = -\ln X$ raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:



$Y = -\ln X$ azalan olduęu için teorem uygulanabilir.

Sınırlar;

$$x=0 \text{ için } y = \infty$$

$$x=1 \text{ için } y = 0$$

olur.

$$Y = -\ln X \rightarrow \ln X = -Y \rightarrow e^{\ln X} = e^{-Y} \rightarrow X = e^{-Y}, \quad \frac{dx}{dy} = -e^{-Y}$$

$$\begin{aligned} g(y) &= f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{(n+m+1)!}{n! m!} (e^{-y})^n (1-e^{-y})^m |-e^{-y}| = \\ &= \frac{(n+m+1)!}{n! m!} e^{-yn} e^{-y} (1-e^{-y})^m = \\ &= \frac{(n+m+1)!}{n! m!} e^{-y(n+1)} (1-e^{-y})^m, \quad y > 0 \end{aligned}$$

olarak bulunur.


6) X raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , x > 0 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = 2X + 4$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

I.Yol:



$Y = 2X + 4$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

Sınırlar;

$$x = 0 \text{ için } y = 2(0) + 4 = 4$$

olur.

$$Y = 2X + 4 \rightarrow 2X = Y - 4 \rightarrow X = \frac{Y-4}{2}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2}$$

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = 2e^{-2\left(\frac{y-4}{2}\right)} \frac{1}{2} = e^{-(y-4)}, \quad y > 4$$

olarak bulunur.

II.Yol:


$$G(y) = P(Y \leq y) = P(2X + 4 \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-4}{2}\right)$$

$$\int_0^{\frac{y-4}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{y-4}{2}} 2e^{-2x} dx = \left(\frac{2e^{-2x}}{-2} \right)_0^{\frac{y-4}{2}} = -e^{-(y-4)} + 1$$


$$g(y) = \frac{dG(y)}{dy} = -(-1)e^{-(y-4)} = e^{-(y-4)}, \quad y > 4$$

olarak bulunur.

$f(x)$, x grafiği



$g(y)$, y grafiği




7) X raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & , x > 0 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = \frac{1}{X}$ raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu daęılım fonksiyonu yöntemiyle bulunuz.

Çözüm:

$y = \frac{1}{x}$ grafięi



$$Y = \frac{1}{X} \rightarrow X = \frac{1}{Y} = Y^{-1} , \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{y^2} = -y^{-2}$$

$$G(Y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{1}{X} \leq y\right) = P(X \geq y^{-1})$$

$$\int_{y^{-1}}^{\infty} f(x)dx = \int_{y^{-1}}^{\infty} e^{-x} dx = \left(\frac{e^{-x}}{-1} \right)_{y^{-1}}^{\infty} = -e^{-\infty} - \left(-e^{-y^{-1}} \right) = e^{-y^{-1}} = G(y)$$


$$g(y) = \frac{dG(y)}{dy} = e^{-y^{-1}} \left(-(-1)y^{-2} \right) = e^{-y^{-1}} y^{-2} , y > 0$$

olarak bulunur.

$f(x)$, x grafiği



$g(y)$, y grafiği



8) X raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.


$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & , 0 < x < 2 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = X^2$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

I.Yol:

$y = x^2$ grafięi



$Y = X^2$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

Sınırlar;

$x = 0$ için $y = 0$

$x = 2$ için $y = 4$

olur.

$$Y = X^2 \rightarrow X = \pm\sqrt{Y} \quad , \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

$$g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{\sqrt{y}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4} \quad , \quad 0 < y < 4$$

olarak bulunur.

II.Yol:


$$G(Y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y})^{**}$$

$$\int_0^{\sqrt{y}} f(x) dx = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_0^{\sqrt{y}} = \frac{y}{4} = G(y) \quad , \quad g(y) = \frac{dG(y)}{dy} = \frac{1}{4} \quad , \quad 0 < y < 4$$


olarak bulunur.

** sınırlar pozitif aralıkta olmasaydı $P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$ olarak yazacaktık.

$f(x)$, x grafiđi



$g(y)$, y grafiđi




9) X raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, & x > 0 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = X^{1/3}$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:


$y = x^{1/3}$ grafięi



$Y = X^{1/3}$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

$$Y = X^{1/3} \rightarrow X = Y^3, \quad \frac{dx}{dy} = 3y^2$$

$x = y^3$ grafięi



$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(y^3)^2} 3y^2 = \frac{3y^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^6}, \quad y > 0$$

olarak bulunur.

$f(x)$, x grafiđi



$g(y)$, y grafiđi




10) X raslantı deęişkeninin daęılım fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ 1 - e^{-2x} & , x > 0 \\ 1 & , x \rightarrow \infty \end{cases}$$

$Y = e^X$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$y = e^x$ grafięi



$Y = e^x$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

Sınırlar;

$x = 0$ için $y = 1$

olur.

$$Y = e^X \rightarrow \ln Y = \ln e^X \rightarrow X = \ln Y, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$$


$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy}$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = -(-2)e^{-2x} = 2e^{-2x}, \quad x > 0$$

$$g(y) = 2e^{-2\ln y} \frac{1}{y} = 2e^{\ln y^{-2}} \frac{1}{y} = \frac{2}{y^3}, \quad y > 1$$


olarak bulunur.

$x = \ln y$ grafiği



11) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ise $Y = 3X + 2$ raslantı deęişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:



$Y = 3X + 2$ artan olduęu için teorem uygulanabilir.

$$Y = 3X + 2 \rightarrow X = \frac{Y-2}{3}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{3}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{y-2}{3}-\mu}{\sigma}\right)^2} \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} 3\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(3\mu+2)}{3\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < y < \infty$$

$$Y \sim N(3\mu+2, 9\sigma^2)$$

olarak bulunur.

12) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ise $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ artan olduğu için teorem uygulanabilir.

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow X - \mu = \sigma Y \rightarrow X = \sigma Y + \mu, \quad \frac{dx}{dy} = \sigma$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma y + \mu - \mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2}, \quad -\infty < y < \infty$$

$Y \sim N(0,1)$ Std. Normal Dağılım


olarak bulunur.

13) X raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ařaęıda verilmiřtir.

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 & , -1 < x < 3 \\ 0 & , \text{ö.d.} \end{cases}$$

$Y = X^2$ raslantı deęiřkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:



$$h(x) = Y = X^2 \rightarrow h^{-1}(x) = X = \pm\sqrt{Y}$$

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi $(-1,0)$ aralığına h_1 , $(0,1)$ aralığına h_2 , $(1,3)$ aralığına ise h_3 diyelim, yani tanım aralığını 3 parçaya bölelim. Bu durumda fonksiyonlar ařaęıdaki gibi elde edilir;

$$(1) \begin{cases} h_1 : (-1,0) \xrightarrow{Y=X^2} (0,1) \Rightarrow h_1^{-1}(y) = -\sqrt{y} \\ h_2 : (0,1) \xrightarrow{Y=X^2} (0,1) \Rightarrow h_2^{-1}(y) = \sqrt{y} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} h_3 : (1,3) \xrightarrow{Y=X^2} (1,9) \Rightarrow h_3^{-1}(y) = \sqrt{y} \end{cases}$$

$f(x)$ fonksiyonunda sınırlarından bölünen 3 parça, $g(y)$ fonksiyonunda 2 parça olmaktadır. (2 tane $(0,1)$ aralığı ve 1 tane $(1,9)$ aralığı olmak üzere)

Bu durumda; (h_1 ve h_2 simetrik olduğu için)

$$(0,1) \Rightarrow g_1(y) = f_x(h_1^{-1}(y)) \left| \frac{dh_1^{-1}(y)}{dy} \right| + f_x(h_2^{-1}(y)) \left| \frac{dh_2^{-1}(y)}{dy} \right| =$$

$$= \frac{1}{4} \left| -\frac{1}{2\sqrt{y}} \right| + \frac{1}{4} \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{2} \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4\sqrt{y}}, 0 < y < 1$$

$$(1,9) \Rightarrow g_2(y) = f_x(h_3^{-1}(y)) \left| \frac{dh_3^{-1}(y)}{dy} \right| = \frac{1}{4} \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{8\sqrt{y}}, 1 < y < 9$$

olarak bulunur. Bu durumda $g(y)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$g(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 < y < 9 \end{cases}$$

olarak elde edilir.