

1) a) $f(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

kritik nok. bulup sınıflandırınız.

b) $f(x,y) = x \sin y$

a) $f_x(x,y) = 6x^2 + y^2 + 10x = 0$

$f_y(x,y) = 2xy + 2y = 0 \Rightarrow 2y(x+1) = 0$

$y=0$ veya $x=-1$

$6x^2 + 10x = 0$

$2x(3x+5) = 0$

$x=0, x=-5/3$

$(0,0), (-5/3,0)$

$6 + y^2 - 10 = 0$

$y^2 = 4$

$y = \pm 2$

$(-1, \pm 2)$

$f_{xx} = 12x + 10$

$f_{yy} = 2x + 2$

$f_{xy} = 2y$

$D = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = (12x+10)(2x+2) - 4y^2$

$(x,y) = (0,0)$

$D(0,0) = 20 > 0$

$f_{xx}(0,0) = 10 > 0$

\Downarrow
yerel minimum

$(x,y) = (-5/3,0)$

$D(-5/3,0) = 40/3 > 0$

$f_{xx}(-5/3,0) = -10 < 0$

\Downarrow
yerel max.

$(x,y) = (-1, \pm 2)$

$D(-1, \pm 2) < 0$

\Downarrow
eyer nok.

b) $f_x = \sin y$ $f_y = x \cos y$

$f_x = \sin y = 0 \Leftrightarrow y = n\pi \ (n \in \mathbb{Z})$

$f_y = x \cos(n\pi) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$(0, n\pi)$ kritik noktalar

$f_{xx} = 0$

$f_{yy} = -x \sin y$

$f_{xy} = \cos y$

$D = -x \sin y - \cos^2 y$


$D(0, n\pi) = -\cos^2(n\pi) < 0$

Tüm kritik noktalar eyer noktasıdır.

2) a) $f(x,y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$ $D: x=0, y=0, y=9-x$ ile sınırlı bölge.

b) $f(x,y) = 2x^3 + y^4$ $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$

D üzerinde mutlak max./min. değerleri bulunuz



Mutlak max/min değerleri - kritik nok. ya da sınırda alır.

D bölgesinin içi: $f_x = 2 - 2x = 0 \Rightarrow (x,y) = (1,1)$ kritik nok.
 $f_y = 2 - 2y = 0$

$f(1,1) = 4$

D'nin sınırı:

I üzerinde: $x=0, 0 \leq y \leq 9$

$f(0,y) = 2 + 2y - y^2$ $f'(0,y) = 2 - 2y = 0 \Rightarrow y=1$ kritik nok.

$f(0,0) = 2$ $f(0,1) = 3$ $f(0,9) = -61$

II üzerinde: $y=0, 0 \leq x \leq 9$

$f(x,0) = 2 + 2x - x^2$ $f'(x,0) = 2 - 2x = 0 \Rightarrow x=1$

$f(0,0) = 2$ $f(1,0) = 3$ $f(9,0) = -61$

III üzerinde: $y=9-x, 0 \leq x \leq 9$

$f(x,9-x) = 2 + 2x + 2(9-x) - x^2 - (9-x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$

$f'(x,9-x) = 18 - 4x = 0 \Rightarrow x = 9/2$

$f(0,9) = -61$ $f(9/2, 9/2) = -41/2$ $f(9,0) = -61$

Mutlak max: $f(1,1) = 4$

Mutlak min: $f(9,0) = f(0,9) = -61$

b)


D'nin içindeD'nin sınırında

$$f_x = 6x^2 = 0$$

$$f_y = 4y^3 = 0$$

(0,0) kritik nok.

$$f(0,0) = 0$$



$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - x^2$$

$$f(x,y) = 2x^3 + (1-x^2)^2 = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 1 \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$f' = 4x^3 + 6x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x = 0, x = -2, x = 1/2$$

$$f(0, \pm 1) = 1$$

$$x = -2 \notin D$$

$$f(1/2, \pm \sqrt{3}/2) = 13/16$$

$$f(-1, 0) = -2$$

$$f(1, 0) = 2$$

mutlak min.

mutlak max

3)

 $x - y + z = 4$ düzleminin $(1, 2, 3)$ noktasına en yakın nok. bulunuz.

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} \quad \text{min. olacak şekilde } (x,y,z) \text{ nok. bulmalıyız.}$$

 (x,y,z) düzlem üzerinde olduğundan, $z = 4 - x + y$.

$$f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (1-x+y)^2 \quad \text{min. o.s } (x,y,z) \text{ nok. bulalım.}$$

$$f_x = 4x - 2y - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 5/3 \quad y = 4/3 \quad (5/3, 4/3) \text{ kritik nok.}$$

$$f_y = 4y - 2x - 2 = 0$$

$$(x,y,z) = (5/3, 4/3, 11/3) \text{ nok. } (1,2,3)'e \text{ en yakın noktadır.}$$

Kontrol edelim.

$$f_{xx} = 4$$

$$f_{yy} = 4$$

$$f_{xy} = -2$$

$$D = 12 > 0$$

$$f_{xx} > 0$$

olduğundan bu nokta lokal min. olur.

4) $17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100 = 0$ elipsi ile orijin arasındaki min ve max uzaklığı bulunuz.

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$f(x, y) = x^2 + y^2$ mutlak max/min değerini bulalım.

kısıtlama fonk. $g(x, y) = 17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100 = 0$

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda(34x + 12y) = 0 \quad \dots (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda(12x + 16y) = 0 \quad \dots (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100 = 0 \quad \dots (3)$$

$$(1) \text{ ve } (2)'den \quad \frac{-x}{17x + 6y} = \frac{-y}{6x + 8y}$$

$$-6x^2 - 8xy = -17xy - 6y^2 \Rightarrow 2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0 \quad \dots (4)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 8x^2 - 12xy - 8y^2 = 0 \\ 17x^2 + 12xy + 8y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow 25x^2 = 100 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$x = 2 \xrightarrow{(4)} 8 - 6y - 2y^2 = 0 \Rightarrow y = 1, y = -4$$

$$x = -2 \xrightarrow{(4)} 8 + 6y - 2y^2 = 0 \Rightarrow y = -1, y = 4$$

$(2, 1), (2, -4), (-2, -1), (-2, 4)$ kritik noktalar

$$f(-2, -1) = f(2, 1) = 5 \quad f(2, -4) = f(-2, 4) = 20$$

$$\text{Max. uzaklık} \quad d = \sqrt{20}$$

$$\text{Min. uzaklık} \quad d = \sqrt{5}$$

5) $x^3 + y^3 + 3x^2y = 15$ eşitliğini sağlayan, negatif olmayan x, y sayıların toplamının max./min değerini bulunuz.

$f(x, y) = x + y$ fonk. max./min değerini bulmalıyız.

$$g(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2y - 15 = 0$$

$$L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda(x^3 + y^3 + 3x^2y - 15)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + \lambda(3x^2 + 6xy) = 0 \Rightarrow -1 = 3\lambda x^2 + 6\lambda xy \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 1 + \lambda(3y^2 + 3x^2) = 0 \Rightarrow -1 = 3\lambda x^2 + 3\lambda y^2 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 + y^3 + 3x^2y - 15 = 0 \quad (3)$$

$$(1) - (2) = 6\lambda xy - 3\lambda y^2 = 0 \Rightarrow 3\lambda y(2x - y) = 0$$

(Ayrıca (1) ve (2)'den $\lambda \neq 0$ old. biliyoruz.)

$\begin{cases} y=0 & \xrightarrow{(3)} x^3=15 \Rightarrow x=\sqrt[3]{15} \\ y \neq 0 & \xrightarrow{(3)} x^3 + 8x^3 + 6x^3 = 15 \\ y=2x & \Rightarrow x^3=1 \\ & \Rightarrow x=1, y=2 \end{cases}$

$$f(\sqrt[3]{15}, 0) = \sqrt[3]{15} \quad \downarrow \quad \text{min}$$

$$f(1, 2) = 3 \quad \downarrow \quad \text{max.}$$