

İST-265 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

UYGULAMA-6 ÇÖZÜMLER

1) X_1, X_2, X_3 bağımsız raslantı değişkenlerinin beklenen değer ve varyansları aşağıdaki tabloda verilmiştir. $Y = X_1 - 2X_2 + 4X_3$ ise $E(Y)$ ve $V(Y)$ nedir?

	Beklenen Değer	Varyans
X_1	1	3
X_2	3	5
X_3	0	10

Çözüm:

Hatırlatma:

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i)$$

$$V(Y) = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i) \rightarrow \text{Bağımsız ise}$$

$Y = X_1 - 2X_2 + 4X_3 \rightarrow$ doğrusal birleşimden $a_1 = 1, a_2 = -2, a_3 = 4$ yerine yazılırsa;

$$\begin{aligned} E(Y) &= a_1 E(X_1) + a_2 E(X_2) + a_3 E(X_3) = E(X_1) - 2E(X_2) + 4E(X_3) \\ &= 1 - 2(3) + 4(0) = -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(Y) &= a_1^2 V(X_1) + a_2^2 V(X_2) + a_3^2 V(X_3) = V(X_1) + 4 V(X_2) + 16 V(X_3) \\ &= 3 + 4(5) + 16(10) = 183 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

2) $X_1 \sim N(0,1)$, $X_2 \sim N(1,1)$, $X_3 \sim N(0,9)$ dağılımlarına sahip bağımsız raslantı değişkenleri olsun. $Y = X_1 - 2X_2 - X_3$ olmak üzere $V(Y)$ ne olur?

Çözüm:

$$V(Y) = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i) \rightarrow \text{Bağımsız ise}$$

$Y = X_1 - 2X_2 - X_3 \rightarrow$ doğrusal birleşimden $a_1 = 1, a_2 = -2, a_3 = -1$ yerine yazılırsa;

$$\begin{aligned} V(Y) &= a_1^2 V(X_1) + a_2^2 V(X_2) + a_3^2 V(X_3) = 1^2 V(X_1) + (-2)^2 V(X_2) + (-1)^2 V(X_3) \\ &= 1(1) + 4(1) + 1(9) = 14 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

3) X, Y, Z raslantı değişkenleri olmak üzere $E(X) = -2$, $E(Y) = 1$, $E(Z) = 3$, $V(X) = 1$, $V(Y) = 1$, $V(Z) = 4$, $Cov(X, Y) = -0.05$, $Cov(X, Z) = 1$, $Cov(Y, Z) = 1$ 'dir. Buna göre,

a. $U_1 = X - 2Y - 3Z$ 'nin beklenen değeri ve varyansını bulunuz.

b. $U_2 = 5X - 2Y - 3Z$ ise $Cov(U_1, U_2)$ nedir?

Çözüm:

a. $U_1 = X - 2Y - 3Z$ doğrusal birleşimden; $a_1 = 1$, $a_2 = -2$, $a_3 = -3$ yerine yazılırsa;

$$E(Y) = a_1 E(X) + a_2 E(Y) + a_3 E(Z) = E(X) - 2E(Y) - 3E(Z)$$

$$= 1(-2) - 2(1) - 3(3) = -13$$

$$V(Y) = a_1^2 V(X) + a_2^2 V(Y) + a_3^2 V(Z) + 2[a_1 a_2 Cov(X, Y) + a_1 a_3 Cov(X, Z) + a_2 a_3 Cov(Y, Z)]$$

$$= (1)^2(1) + (-2)^2(1) + (-3)^2(4) + 2[1(-2)(-0.05) + 1(-3)(1) + (-2)(-3)1]$$

$$= 1 + 4 + 36 + 2[3.1] = 47.2$$

olarak bulunur.

b. I.Yol:

$$Cov(U_1, U_2) = \sum_{i=1}^n a_i b_i V(X_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i < j}}^n (a_i b_j + a_j b_i) Cov(X_i, X_j)$$

$$U_1 = X - 2Y - 3Z \text{ için } a_1 = 1 , a_2 = -2 , a_3 = -3$$

$$U_2 = 5X - 2Y \text{ için } b_1 = 5 , b_2 = -2 , b_3 = 0$$

$$Cov(U_1, U_2) = a_1 b_1 V(X_1) + a_2 b_2 V(X_2) + a_3 b_3 V(X_3)$$

$$+ (a_1 b_2 + a_2 b_1) Cov(X_1, X_2)$$

$$+ (a_1 b_3 + a_3 b_1) Cov(X_1, X_3)$$

$$+ (a_2 b_3 + a_3 b_2) Cov(X_2, X_3)$$

$$= (1)(5)(1) + (-2)(-2)1 + (-3)(0)(4)$$

$$+ [1(-2) + (-2)5](-0.05)$$

$$+ [1(0) + (-3)5](1)$$

$$+ [(-2)(0) + (-3)(-2)](1)$$

$$= 9 + 0.6 - 15 + 6 = 0.6$$

olarak bulunur.

II.Yol:

$$Cov(U_1, U_2) = Cov(X - 2Y - 3Z , 5X - 2Y)$$

$$= 5Cov(X, X) - 2Cov(X, Y) - 10Cov(Y, X) + 4Cov(Y, Y) - 15Cov(Z, X) + 6Cov(Z, Y)$$

$$= 5Var(X) + 4Var(Y) - 12Cov(X, Y) - 15Cov(X, Z) + 6Cov(Y, Z)$$

$$= 5(1) + 4(1) - 12(-0.05) - 15(1) + 6(1) = 5 + 4 + 0.6 - 15 + 6 = 0.6 \text{ olarak bulunur.}$$

4) X_1, X_2, X_3 raslantı değişkenleri için varyanslar sırasıyla 5,4,7 olarak veriliyor. X_1 ve X_2 arasındaki kovaryans 3, X_2 ve X_3 arasındaki kovaryans -2 olarak veriliyor. X_1 ve X_3 değişkenlerinin ise bağımsız olduğu biliniyor. $Y_1 = X_1 - 2X_2 + 3X_3$ ve $Y_2 = -2X_1 + 3X_2 + 4X_3$ şeklinde verilen raslantı değişkenleri arasındaki kovaryansı hesaplayınız.

Çözüm:

$$V(X_1) = 5 \quad Cov(X_1, X_2) = 3$$

$$V(X_2) = 4 \quad Cov(X_1, X_3) = 0$$

$$V(X_3) = 7 \quad Cov(X_2, X_3) = -2$$

$$\left. \begin{aligned} Y_1 &= X_1 - 2X_2 + 3X_3 \\ Y_2 &= -2X_1 + 3X_2 + 4X_3 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} a_1 &= 1, \quad a_2 = -2, \quad a_3 = 3 \\ b_1 &= -2, \quad b_2 = 3, \quad b_3 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cov(Y_1, Y_2) &= a_1 b_1 V(X_1) + a_2 b_2 V(X_2) + a_3 b_3 V(X_3) \\ &\quad + (a_1 b_2 + a_2 b_1) Cov(X_1, X_2) \\ &\quad + (a_1 b_3 + a_3 b_1) Cov(X_1, X_3) \\ &\quad + (a_2 b_3 + a_3 b_2) Cov(X_2, X_3) \end{aligned}$$

$$= 1(-2)(5) + (-2)(3)(4) + (3)(4)(7) \rightarrow 50$$

$$+ [(1)(3) + (-2)(-2)](3) \rightarrow 21$$

$$+ [(1)(4) + (3)(-2)](0) \rightarrow 0$$

$$+ [(-2)(4) + (3)(3)](-2) \rightarrow -2$$

$$= 69$$

olarak bulunur.

5) Bir içecek otomatı bardaklara ortalama 200ml ve standart sapması 15ml olacak şekilde içecek doldurmaktadır. Belirli bir günde 121 adet içecek satılmıştır. İlgili günde her bardağa doldurulan ortalama içeceğin (ml) beklenen değer ve varyansını bulunuz.

Çözüm:

$$\mu = 200 \text{ ml}, \quad \sigma = 15 \text{ ml}$$

\bar{X} : İlgili günde bardak başına doldurulan ortalama içecek miktarı (ml)

$$E(\bar{X}) = \mu = 200$$

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{15^2}{121} = \frac{225}{121} = 1.8595$$

olarak bulunur.

6) İki rakip internet servis sağlayıcı müşterilerine memnuniyet anketi uygulamışlardır. Anket 1 ile 5 arasında, 1 memnun değilim, 5 oldukça memnunum olacak şekilde uygulanmıştır. 1 numaralı servis sağlayıcının 100 müşterisine uyguladığı anket sonucu 3.51 memnuniyet ortalaması ve 0.51 standart sapma ile, 2 numaralı servis sağlayıcının 175 müşterisine uyguladığı anket sonucu ise 3.24 memnuniyet ortalaması ve 0.75 standart sapma ile bilinmektedir. Buna göre $E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ ve $V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ bulunuz.

Çözüm:

$$\mu_{x_1} = 3.51, \quad \sigma_{x_1}^2 = (0.51)^2 = 0.2601, \quad n_1 = 100$$

$$\mu_{x_2} = 3.24, \quad \sigma_{x_2}^2 = (0.75)^2 = 0.5625, \quad n_2 = 175$$

$$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2 = 3.51 - 3.24 = 0.27$$

$$V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) = \frac{\sigma_{x_1}^2}{n_1} + \frac{\sigma_{x_2}^2}{n_2} = \frac{0.2601}{100} + \frac{0.5625}{175} = 0.002601 + 0.003214 = 0.005815$$

olarak bulunur.

7) X ve Y bağımsız raslantı değişkenlerinin ortalama ve varyansları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre $E(\bar{X} - \bar{Y})$ ve $V(\bar{X} - \bar{Y})$ bulunuz.

	X	Y
n	25	36
Beklenen Değer	5	4
Varyans	9	4

Çözüm:

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = 5 - 4 = 1$$

$$V(\bar{X} - \bar{Y}) = V(\bar{X}) + V(\bar{Y}) = \frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y} = \frac{9}{25} + \frac{4}{36} = 0.4711$$

olarak bulunur.

8) X_1, X_2, \dots, X_n p parametresi ile Bernoulli dağılımından alınan bağımsız raslantı değişkenleri olsun. $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ olarak tanımlansın. X raslantı değişkeninin varyansını hesaplayınız.

Çözüm:

Hatırlatma:

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$ için $E(X) = p$, $V(X) = p(1-p)$ 'dir.

$V(X) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) \rightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ise

$$V(X) = p(1-p) \cdot p(1-p) \cdot \dots \cdot p(1-p) = p^n(1-p)^n$$

olarak bulunur.

9) X ve Y raslantı değişkenleri için bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$f(x, y) = \frac{1}{3}(x+y)$, $0 < x < 1$, $0 < y < 2$ olarak veriliyor. $W = 3X + 4Y - 5$ biçiminde verilen raslantı değişkeninin beklenen değer ve varyansını hesaplayınız.

Çözüm:

Önce marjinaleri alalım.

$$f_x(x) = \int_0^2 f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{1}{3} \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^2 = \frac{2}{3}(x+1)$$

$$f_y(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{1}{3}(x+y) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + xy \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left(y + \frac{1}{2} \right)$$

olur.

$V(X) = E(X^2) + [E(X)]^2$ bilinmektedir. Bu sebeple $E(X), E(X^2), E(Y), E(Y^2)$ hesaplanacaktır.

$$E(X) = \int_0^1 x f_x(x) dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x(x+1) dx = \frac{2}{3} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{9}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 f_x(x) dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x^2(x+1) dx = \frac{2}{3} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{18}$$

$$E(Y) = \int_0^2 y f_y(y) dy = \frac{1}{3} \int_0^2 y \left(y + \frac{1}{2} \right) dy = \frac{1}{3} \left(\frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_0^2 = \frac{11}{9}$$

$$E(Y^2) = \int_0^2 y^2 f_y(y) dy = \frac{1}{3} \int_0^2 y^2 \left(y + \frac{1}{2} \right) dy = \frac{1}{3} \left(\frac{y^4}{4} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_0^2 = \frac{16}{9}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^2 xy f(x, y) dy dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} \int_0^2 (x^2 y + xy^2) dy \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{3} \left(2x^2 + \frac{8x}{3} \right) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y) = \frac{2}{3} - \left(\frac{5}{9} \cdot \frac{11}{9} \right) = -0.01234$$

Şimdi ise W doğrusal birleşiminin beklenen değer ve varyansını hesaplayalım;

$$E(W) = E(3X + 4Y - 5) = 3E(X) + 4E(Y) - 5$$

$$= 3 \cdot \frac{5}{9} + 4 \cdot \frac{11}{9} - 5 = \frac{14}{9} = 1.5556$$

$$V(W) = V(3X + 4Y - 5) = 9V(X) + 16V(Y) + 2[(3)(4)Cov(X, Y)]$$

$$= 9(0.080247) + 16(0.28395) + 24(-0.01234) = 4.96926$$

olarak bulunur.

10) θ_1 parametresi ile Bernoulli dağılımından n_1 birimlik ve θ_2 parametresi ile Bernoulli dağılımından n_2 birimlik rasgele örneklemeler çekiliyor. Örneklemelerin ortalamaları sırasıyla \bar{X}_1, \bar{X}_2 olarak veriliyor. Buna göre

a) $E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$

b) $V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ bulunuz.

Çözüm:

$$\text{Bernoulli } \theta_1 \rightarrow n_1 \text{ birim} \rightarrow E(X_1) = \theta_1, V(X_1) = \theta_1(1 - \theta_1)$$

$$\text{Bernoulli } \theta_2 \rightarrow n_2 \text{ birim} \rightarrow E(X_2) = \theta_2, V(X_2) = \theta_2(1 - \theta_2)$$

olduğu bilinmektedir.

a) $E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = \theta_1 - \theta_2$

b) $V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) = \frac{\sigma_{X_1}^2}{n_1} + \frac{\sigma_{X_2}^2}{n_2} = \frac{\theta_1(1 - \theta_1)}{n_1} + \frac{\theta_2(1 - \theta_2)}{n_2}$

olarak bulunur.

11) X ve Y raslantı değişkenleri için bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu

$f(x, y) = \frac{2}{75}(2x^2y + xy^2)$, $0 < x < 3$ $1 < y < 2$ olarak veriliyor. $V(X + Y)$ ile $V(X) + V(Y)$ değerlerini karşılaştırarak sonucu yorumlayınız.

$$V(X + Y) = \frac{939}{2000}$$

$$V(X) + V(Y) = \frac{4747}{10000}$$

Çözüm:

Eğer X ve Y bağımsız olsaydı; $W = X + Y$ doğrusal birleşimi olarak düşünürsek

$$V(W) = V(X + Y) \rightarrow a_1 = 1, a_2 = 1, n = 2$$

$$V(W) = \sum_{i=1}^n a_i^2 V(X_i)$$

$$V(W) = V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

eşitliği sağlanacaktı.

$V(X + Y) = 0.4695 \neq V(X) + V(Y) = 0.4747$ olduğundan X ve Y raslantı değişkenlerinin bağımsız olmadıkları sonucuna varılmaktadır. Bağımsız olmadıklarından dolayı $V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$ ifadesi gelecektir. Bu durumda $\text{Cov}(X, Y) = V(X + Y) - (V(X) + V(Y))$ olacağından;

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.4695 - 0.4747 = -0.0052$$

olarak bulunacaktır.

12) X ve Y raslantı değişkenleri için bileşik olasılık fonksiyonu aşağıdaki tablo ile veriliyor

	P(X=x)		
P(Y=y)	0	1	2
0	0	1/4	0
1	1/4	0	1/4
2	0	1/4	0

$\rho(-2X + 7.5Y - 3)$ şeklinde verilen korelasyon katsayısını hesaplayınız.

Çözüm:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) V(Y)}}; \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \text{ olduğu bilinmektedir. Bu}$$

sebeple öncelikle $E(XY)$, $E(X)$ ve $E(Y)$ değerlerini bulalım;

$$\begin{aligned}
E(XY) &= (0)(0)P(X=0, Y=0) + (0)(1)P(X=0, Y=1) + (0)(2)P(X=0, Y=2) \\
&\quad + (1)(0)P(X=1, Y=0) + (1)(1)P(X=1, Y=1) + (1)(2)P(X=1, Y=2) \\
&\quad + (2)(0)P(X=2, Y=0) + (2)(1)P(X=2, Y=1) + (2)(2)P(X=2, Y=2) \\
&= P(X=1, Y=1) + 2P(X=1, Y=2) + 2P(X=2, Y=1) + 4P(X=2, Y=2) \\
&= 0 + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 4(0) = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(X) &= 0P(X=0, Y=0) + 0P(X=0, Y=1) + 0P(X=0, Y=2) \\
&\quad + 1P(X=1, Y=0) + 1P(X=1, Y=1) + 1P(X=1, Y=2) \\
&\quad + 2P(X=2, Y=0) + 2P(X=2, Y=1) + 2P(X=2, Y=2) \\
&= 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1(0) + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 2(0) + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 2(0) = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(Y) &= 0P(X=0, Y=0) + 0P(X=1, Y=0) + 0P(X=2, Y=0) \\
&\quad + 1P(X=0, Y=1) + 1P(X=1, Y=1) + 1P(X=2, Y=1) \\
&\quad + 2P(X=0, Y=2) + 2P(X=1, Y=2) + 2P(X=2, Y=2) \\
&= 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1(0) + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 2(0) + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 2(0) = 1
\end{aligned}$$

olarak bulunmaktadır. Buradan $\text{Cov}(X, Y) = 1 - (1)(1) = 0$ çıkacaktır. Dolayısı ile X ve Y bağımsız oldukları için $\rho(X, Y) = 0$ çıkacaktır.

$\rho(-2X + 7, 5Y - 3) = 0$ olarak bulunur.

13) $N(3, 2)$ dağılımından 16 birimlik ve $N(2, 6)$ dağılımından da 15 birimlik iki rasgele örneklem çekiliyor. Örneklemelerin ortalamaları sırasıyla \bar{X}_1, \bar{X}_2 olarak veriliyor. Buna göre

a) $E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$

b) $V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ bulunuz.

Çözüm:

$$X_1 : N(3, 2) \rightarrow \mu_{X_1} = 3, \sigma_{X_1}^2 = 2, n_1 = 16$$

$$X_2 : N(2, 6) \rightarrow \mu_{X_2} = 2, \sigma_{X_2}^2 = 6, n_2 = 15$$

a) $E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = \mu_{X_1} - \mu_{X_2} = 3 - 2 = 1$

b) $V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) = \frac{\sigma_{X_1}^2}{n_1} + \frac{\sigma_{X_2}^2}{n_2} = \frac{2}{16} + \frac{6}{15} = 0.525$

olarak bulunur.

14) $\{1, 2, \dots, 100\}$ biçiminde verilen sonlu kitleden $n=10$ birimlik bir örneklem seçilen birim yerine konulmadan oluşturuluyor. Aşağıda verilenleri hesaplayınız.

a) μ, σ^2

b) $E(\bar{X}), V(\bar{X})$

c) $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i$ olmak üzere $E(Y), V(Y)$

Çözüm:

a) $\mu = \frac{N+1}{2} = \frac{100+1}{2}, \sigma^2 = \frac{(N+1)(N-1)}{12} = \frac{101*99}{12}$

b) $E(\bar{X}) = \frac{N+1}{2} = \frac{100+1}{2}, V(\bar{X}) = \frac{(N+1)(N-n)}{12n} = \frac{101*90}{12*10}$

c) $E(Y) = \frac{n(N+1)}{2} = \frac{10*101}{2}, V(Y) = \frac{n(N+1)(N-n)}{12} = \frac{10*101*90}{12}$