

İST268-01-İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

UYGULAMA 4

1) 12 kişide, kan basıncını artırması beklenen bir uyarıcı ilaç verilmeden ve verildikten sonra saptanan kan basınçları aşağıda verilmiştir. İlaç verilmeden önceki ve sonraki kan basıncı farkına ilişkin %95 güven aralığını oluşturunuz. İlaç kan basıncını artırmakta mıdır?

Kişiler	Önce	Sonra
1	120	128
2	124	131
3	130	131
4	118	127
5	140	132
6	128	125
7	140	141
8	135	137
9	126	118
10	130	132
11	126	129
12	127	135

2) İki ağrı kesici ilacın etki süreleri karşılaştırılmak isteniyor. Bu amaçla A ve B ilaçları aynı deneklere önce A, bir süre sonra, A ilacının etkisi bittiğinde ise B ilacı verilerek, ağrıyı kesmede etkili oldukları süreler saptanmış. Buna göre ilaçlar arasında ağrıyı kesme süreleri bakımından fark olup olmadığını, varsa hangi ilacın daha etkili olduğunu %5'lik yanılma düzeyinde test ediniz ve iki ilaç ortalaması farkı için %95lik güven aralığını oluşturunuz.

Hastalar	A Ağrı kesicisi	B Ağrı kesicisi
1	3,2	3,8
2	1,6	1,0
3	5,7	8,4
4	2,8	3,6
5	5,5	5,0
6	1,2	3,5
7	6,1	7,3
8	2,9	4,8