

Григорьевские рязи Рязи

$f(x) \in L_2(-1, 1)$ и ум. немог зл

L^1 -abs. univ. i.e. $\int_{-1}^1 f(x) dx$ abs. c.

$$d_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin \frac{\pi n t}{T} dt, \quad n=1, 2, \dots$$

Kennel Pinna

$$f(x) \in L_R(I) \Rightarrow \int_I f(t) \cos tx \, dt \rightarrow 0 \quad \text{when} \quad x \rightarrow \infty$$

I - проем.

$$\int_1^{\infty} f(t) \sin tx \, dt \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

Conversely: $f(x) \in L_n(-1; 1) \Rightarrow a_n, b_n \rightarrow 0$

Fourier. reze $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right] = \text{reze } f(x)$

Cherise

1. Sejam $f(x)$ inteiro, e $a_n = 0$

Esse $f(x)$ é uma, $\text{po } b_n = 0$

2. $f(x)$ - неограничен \Rightarrow универсальный нормис. Фрив по модулю сирезны гунон 21

Давление условия разнотимости в р. Руре (среднее из пр. Левинского)

1. $f(x) \in L_R(-1; 1)$, ум. нестрог 2л

В т. x_0 имеет конечные односторонние приросты $f'_+(x_0)$ и $f'_-(x_0)$.

Тогда по φ , $f(x)$ в τ , x_0 равна к $f(x_0)$.

2. Пусть $f(x) \in L_k(-1; 1)$, и. можем зл

$x_0 = \tau$. разрыва 1 рода, \exists конечные "содержимое" означено

производные:

$$\lim_{u \rightarrow +0} \frac{f(x_0+u) - f(x_0+0)}{u}, \quad \lim_{u \rightarrow +0} \frac{f(x_0-u) - f(x_0-0)}{-u}$$

Значу при x_0 сходится к ср. значению. $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$



Число $l = \pi$, тогда $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos nx + b_n \sin nx]$$

Задача 1

Рассмотрим в п. 4-м $f(x) = \operatorname{sign} x$, $-\pi < x < \pi$

гр. симметрична относительно оси.



Ф-ия нечетная $\Rightarrow a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin \frac{n\pi t}{\pi} \, dt \quad \text{— четная, ф-ия}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sign} t \sin nt \, dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nt \, dt = \frac{2}{\pi n} (-\cos nt) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n)$$

$$\operatorname{sign} x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n) \sin x, \quad -\pi < x < \pi$$

Ряд не св-ся равномерно с.х. на всей прямой, т.е. сумма его разбегается


(р/н с.х. ряд из пер. ф-ии и пер. сущи).

Задача 2

$f(x) = x^2$ на $-\pi < x < \pi$

сх-ца в $\forall \pi$ но не равномерно

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx, \quad b_n = 0$$



$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n (-1)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (-1)^n \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

Does. you p/m ex. p. Puzbe

$f(x) \in L_n[-1; 1]$, n — нечетное, и $f(x)$ — нечетная на $[-1; 1]$.

($f(x)$ непр. на $[-l; l]$, $f'(x)$ конечно - непр. на $[-l; l]$, т.е. есть конечное число τ -разрывов τ точек). Тогда р-функт $f(x)$ с.р/н на всей числовой прямой.

Известно: если $f'(x)$ вып. вогды на проме., то у нее не может быть разрыва
в прое. Показыв. в теореме о равн. ϵ, δ -фуне в о. разрыва $f'(x)$ не вып.

Рез. ф. $x^2 \in x$, p/n на $(-\infty; +\infty)$.

Y5b. 22-110

Ряд см. при (задача 1-н)

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1) \quad \text{сх. р/н на } (-\infty; +\infty). \text{ Тогда по сумме}$$

$f(x)$ - пер. зб - перем. оп-т, и (i) - р. Функции имеют значения

$$\square \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad - p/n \text{ cx}$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ nulp.}$$

Судна р/н с.х. раба из неп. гр-ин - неп. гр-ин.

Увеличение 25 - раз.

Р/н с.х. рзг из кепр. р-ин на кеперна острезке можно пометано иштер-
уповати.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{a_n}_{0} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\cos nt}_{0} dt + \underbrace{b_n}_{0} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\sin nt}_{0} dt \right) \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt$$

Если р/н с. р.з. уловить на ср-ср-но, он останется р/н с.

$$f(x) \cos mx = \frac{a_0}{2} \cos mx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx \cos mx + b_n \sin nx \cos mx), \quad m \text{ ganze}$$

- 5x p/v.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, dt = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \, dt + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \cos mt \, dt}_{=0 \text{ wenn } n \neq m} + \underbrace{b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \cos mt \, dt}_{=0} \right) =$$

$$= a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mt \, dt$$

Ортогональные функции $\{1, \cos t, \sin t, \dots, \cos nt, \sin nt, \dots\}$ в пространстве функций на отрезке $[-\pi; \pi]$ со скалярным произведением $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t) \, dt$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt$$

■

Задача 22-111

Дать в явном виде?

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ — ряд сч. п/н на $\mathbb{R} \Rightarrow$ ряд Фурье с членом $n=0$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos nx$ — расходится $\nrightarrow 0 \Rightarrow$ не р. Фурье

Задача 4

$f(x) = x \cos x$, $-\pi \leq x \leq \pi$ — нечетная, $a_n = 0$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos t \cdot \sin nt \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t (\sin(n+1)t + \sin(n-1)t) \, dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{t \cos(n+1)t}{n+1} - \frac{t \cos(n-1)t}{n-1} \right) \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(n+1)t}{n+1} \stackrel{0}{dt} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(n-1)t}{n-1} \stackrel{0}{dt} \right] = \\ &\stackrel{n \geq 2}{=} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right) = (-1)^{n+1} \frac{2n}{n^2-1} \quad - b_n \text{ при } n \geq 2 \end{aligned}$$

$$\text{При } n=1 \quad b_1 = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} t \sin 2t \, dt = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{2} t \cos 2t \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos 2t}{2} \, dt \right] =$$

$$= -\frac{1}{2}$$



Ряд сч. не п/н

$$x \cos x = -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2n}{n^2-1} \sin nx$$

на $(-\pi; \pi)$

Розширення на \cos і на \sin

$$f(x) \in L_n(0; l)$$

Еслі є розширення на відрізок $\rightarrow f(x) \in L_n(-l; l)$

То є розширення - парне $f(x)$ на $(-l; l)$ на \cos

Еслі на невідрізок, то на \sin

Задача 1

$$f(x) = x^2 \quad 0 < x < \pi \quad \text{на } \sin$$



Роз ш.х. непарною (розшир.) на $(-\infty; +\infty)$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t^2 \sin nt \, dt$$

Задача 2

Розширення в роз ш.х. $f(x) = x^2$ на $(0; 1)$ з періодом $2l$



$$2l = 1 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 t^2 \cos 2\pi n t \, dt \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = 2 \int_0^1 t^2 \sin 2\pi n t \, dt$$

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x) \quad \text{на } 0 < x < 1$$

Роз ш.х. є непарною на $(-\infty; +\infty)$ і-к. узгоджені розширення

Розширення на \sin или \cos з'єднаних или нез'єднаних крайніх дуг

$$\textcircled{1} f(x) \in L_n(0; \frac{1}{2})$$



$$f(x) = f(1-x), \quad 0 < x < \frac{1}{2} \quad \text{— симетрія стос. } x = \frac{1}{2}$$

Далі на невідрізок, далі з періодом $2l$

$$\text{В даному випадку } a_n = b_n = 0$$

$$b_{2n+1} = \frac{4}{l} \int_0^{l/2} f(t) \sin \frac{\pi(2n+1)t}{l} dt \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_{2n+1} \sin \frac{\pi(2n+1)x}{l} \quad - \text{розкладемо по sin невідомих кривих згідно}$$

② $f(x) \in L_2(0; \frac{l}{2})$

$$f(x) = -f(l-x), \quad 0 < x < \frac{l}{2} \quad - \text{симетрія стос. до } (\frac{l}{2}; 0)$$



$$a_n = 0, \quad b_{n+1} = 0,$$

$$b_{2n} = \frac{4}{l} \int_0^{l/2} f(t) \sin \frac{2\pi n t}{l} dt$$

Розкладемо по sin відомих кр. згідно
(розкладемо по sin з невідомим l)

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \sin \frac{2\pi n x}{l}$$

③ $f(x) = -f(l-x)$ на $0 < x < \frac{l}{2}$ - сим. стос. до $(\frac{l}{2}; 0)$



Далі по відомим, далі з невідомим 2l

$$b_n = 0 \quad a_{2n} = 0$$

$$a_{2n+1} = \frac{4}{l} \int_0^{l/2} f(t) \cos \frac{\pi(2n+1)t}{l} dt$$

Розкладемо по cos невідомих кр. згідно

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} \cos \frac{\pi(2n+1)x}{l}$$

④ $f(x) = f(l-x)$ $0 < x < \frac{l}{2}$ - сим. стос. $x = \frac{l}{2}$

Далі по відомим, далі з невідомим 2l



$$b_n = 0 \quad a_{2n+1} = 0$$

$$a_{2n} = \frac{4}{l} \int_0^{l/2} f(t) \cos \frac{\pi \cdot 2n t}{l} dt$$

Розкладемо по cos відомих кр. згідно

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos \frac{\pi \cdot 2n x}{l}$$

(далі по cos з невідомим l)

Задача 1

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Разложить по \sin на $[0; 2]$ $l=2!$



Продолжить симм. осн. $x=1$

$$f(x) = f(2-x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

Разложить по \sin нечетных кр. гуд

$$b_{2n+1} = \frac{4}{2} \int_0^1 t \sin \frac{\pi(2n+1)t}{2} dt$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8(-1)^n}{\pi^2(2n+1)^2} \sin \pi \left(n + \frac{1}{2}\right) x$$



Ряд сходимости по \sin на $(-\infty; +\infty)$ т.к. $f(x)$ имеет период 4 и нечетно-нечетно на $[-4; 4]$

Задача 2

Построить гр. функции рядов Фурье по \cos и \sin и т.д. и нечет, четных гуд.

Сходится ли они по \sin ?

$$f(x) = \sin x \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$$



Синус нечет. кр. гуд
сх. по \sin т.к. нечет.
ряд Фурье на $[-\pi; \pi]$

Синус чет. кр. гуд
сх. по \cos т.к. чет.
ряд Фурье

Косинус нечет. кр. гуд
сх. по \sin

Косинус чет. кр. гуд
сх. по \cos

$$f(x) = \sin x + 1$$



суммы пер. кр.
сх. не p/n



суммы лев. кр. гл.
сх. не p/n



суммы прав. кр. гл.
сх. не p/n



суммы лев. кр. гл.
сх. p/n

Полное предельное представление Фурье

1. $f(x)$ ун. непрерывна на $[-l; l]$, период.

2. Функция $f(x)$ с p/n на $(-\infty; +\infty)$

3. Функция $f(x)$ имеет полное предельное представление:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right]$$

То есть $f(x)$ (х-ой кр. пер. на $[-l; l]$) имеет полное предельное представление:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(-a_n \cdot \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} + b_n \cdot \frac{n\pi}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} \right) - \text{не сходится!}$$

интервал p/n

Пример

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$2x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \quad \text{сумма ряда равна } 2x \text{ на } (-\pi; \pi) \text{ по}$$

сх. 1-го порядка



$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1} \sin nx}{n}$$

Равенство Парсеваля

$L^2_R(I)$ - м.б.о. ф-ция, аде. унт. на I высеет $f(x)^2$.

Для компакто I $L^2_R(I) \subset L_R(I)$

Все кодиф. унт. - из $L^2_R(a; b)$

Если $f(x) \in L^2_R(-1; 1)$ и унт. нрмог 21 , то

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2 = \frac{1}{l} \int_{-1}^1 (f(x))^2 dx$$

В разном рзг чеба ср.

Пример

$$f(x) = x;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$f(x) = x^2;$$

$$\frac{2}{9} \pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^5}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Неравенство Вурцемере

$$\int_a^b f(x)^2 dx \leq C \int_a^b f'(x)^2 dx$$

Задача 2

$f(x)$ унт. нр. на $[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$

$$\text{Тогда } \int_a^b f(x)^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'(x)^2 dx$$

$$\square \text{ Рас-ум } \varphi(x) = f(x+a), \quad \varphi(a) = f(a) = 0$$

$$\varphi(b-a) = f(b) = 0$$

Продолж. по периодичности, задаем периодом $2 \cdot (b-a)$ ($l = b-a$)

Т.к. она чёт.-ч., p -период π , p/n



$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n x}{b-a} \quad \text{нет cos т.к. нечётная}$$

$$\varphi'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi n}{b-a} b_n \cos \frac{\pi n x}{b-a}$$

$$\frac{2}{b-a} \int_a^{b-a} \varphi(x)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$$

$$\frac{2}{b-a} \int_a^{b-a} \varphi'(x)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2}{(b-a)^2} b_n^2$$

~~12~~

Укелермиселанне ругеб

Ругеб $f(x)$ кыс-негн на $[-l; l]$, ун. негн $2l$

$$f(x) \sim \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{\text{ср. п. фуге}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right)$$

Тара $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \sim \frac{a_0 x}{2}$ - кыс. ун. на $[-l; l]$, $F(-l) = F(l)$

$F(x) = \frac{C}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{\pi n} a_n \sin \frac{\pi n x}{l} - \frac{b}{\pi n} b_n \cos \frac{\pi n x}{l} \right)$ - сугуне р/н с. п. фуге

$$C = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) dt$$

Еден $\frac{a_0 x}{2}$ не симметрик, да номер n не кысмет р/н.

