

Тригонометрические ряды Фурье

$f(x) \in L_2(-l, l)$ и ум. неявног зл

L_2 -адс. функ., т.е. $\int_{-l}^l f(x) dx$ адс. вх.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n t}{l} dt, \quad n=1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi n t}{l} dt, \quad n=1, 2, \dots$$

- косинусные коэффициенты

Норма Ряда

$$f(x) \in L_2(I) \Rightarrow \int_I f(t) \cos t x dt \rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow \infty$$

I - ограничен.

$$\int_I f(t) \sin t x dt \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

Следствие: $f(x) \in L_2(-l; l) \Rightarrow a_n, b_n \rightarrow 0$

$$\text{Фурье ряд } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right] - \text{ ряд Фурье } f(x)$$

Оценка

1. Если $f(x)$ неравна, то $a_n = 0$

Если $F(x)$ равна, то $b_n = 0$

2. $f(x)$ - неявног \Rightarrow универсал норма доказано методом сопоставления групп зл

Дифференциальное значение разложения в п. Фурье

(следует из оп. левого и правого)

1. $f(x) \in L_2(-l; l)$, ум. неявног зл

В т. x_0 имеет конечное одностороннее производ. $f'_+(x_0)$ и $f'_-(x_0)$.

Тогда ряд Ф. $f(x)$ в т. x_0 сходится к $f(x_0)$.

2. Ряд Ф. $f(x) \in L_2(-l; l)$, ум. неявног зл

x_0 - т. разрыва 1 рода, \exists конечное "одностороннее" одностороннее производное:

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+u) - f(x_0+0)}{u}, \quad \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0-u) - f(x_0-0)}{-u}$$

Тогда ряд Фурье в т. x_0 сходится к оп. асимпт. $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$



Yrašo $f(x)$, kai $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos nx + b_n \sin nx]$$

3agora 1

Palyginkime b p. Palyginkime $f(x) = \operatorname{sign} x$, $-\pi < x < \pi$

Isp. cymam pagal videsių spavy.



Q-uz neriei. $\Rightarrow a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \sin \frac{\pi n t}{\pi} dt \quad \text{-gur neriei, qd-mi}$$

$$B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \operatorname{sign} t \sin nt dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin nt dt = \left. \frac{2}{\pi n} (-\cos nt) \right|_0^\pi =$$

$$= \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n)$$

$$\operatorname{sign} x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n) \sin nx, \quad -\pi < x < \pi$$

Reik ne išbūgti pabnevezimo ex. nėt būt nenuosei, t. y. gura es palygina
(p/b ex. reik už nenuosei qd-mi un. nenuosei gura).

3agora 2

$$f(x) = x^2 \quad \text{na } -\pi < x < \pi$$

Cx-a b V_i, no t augeibino

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx dx, \quad b_n = 0$$



$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n (-1)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

Doci. že je p/m ex. p. typu

$f(x) \in L_2 [-1; 1]$, nепр. 2г, и яконо - непр. на $[-1; 1]$.

($f(x)$ непр. на $[-1; 1]$, $f'(x)$ яконо - непр. на $[-1; 1]$, т.е. един единичное
т. разрывка 2 рода). Тогда p -типе $f(x)$ ex. p/m на всем множестве определ.

Учебно: если $f'(x)$ опр. близко на отрезке, то и нее не может быть разрывок
2 рода. Поэтому в теореме о пам. ex. p.-типе в т. разрывка $f'(x)$ не опр.

Реш. 9. x^2 ex. p/m на $(-\infty; +\infty)$.

Чтв. 22-110

Решение: пог (для отрезка $[-\pi, \pi]$)

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ (1) ex. p/m на $(-\infty; +\infty)$. Тогда ее сумма
 $f(x)$ - непр. 2го - непр. 2го-го, и (1) - p -типе для суммы.

□ $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ - p/m ex. $\Rightarrow f(x)$ непр.

Сумма p/m ex. пог из непр. 2го-го - непр. 2го-го.

Имеет разрыв 2го-го рода.

P/m ex. пог из непр. 2го-го на конечном отрезке можно номинировать
как разрыв.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt dt + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nt dt \right) \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt$$

Если p/m ex. пог непрерывна на \mathbb{R} -го-го, он является p/m ex.

$f(x) \cos mx = \frac{a_0}{2} \cos mx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx \cos mx + b_n \sin nx \cos mx)$, m конс.
- ex. p/m.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt dt = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt dt + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \cos mt dt + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \cos mt dt \right) = 0 \text{ для } n \neq m$$

$$= \theta_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt \ dt$$

Операторните съществуващи $\{1, \cos t, \sin t, \dots, \cos nt, \sin nt, \dots\}$ броят на
които са неизвестни на отр. $[-\pi; \pi]$ са съвкупността импулси $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t) dt$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt$$

Sagara 22-111

It is in program Python?


1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ - rgy cx. p/m na R \Rightarrow rgy pypol ci chen yewnd
 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos nx$ - karp-ryu $\rightarrow 0$ \Rightarrow ne p. pypol

Zagora 4

$$f(x) = x \cos x, \quad -\pi \leq x \leq \pi \quad \text{- merkbar}, \quad a_n = 0$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos t \cdot \sin nt dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cdot (\sin(n+1)t + \sin(n-1)t) dt = \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{t \cos(n+1)t}{n+1} - \frac{t \cos(n-1)t}{n-1} \right) \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(n+1)t}{n+1} dt \stackrel{0}{=} 0 + \int_0^{\pi} \frac{\cos(n-1)t}{n-1} dt \right] = \\
 &= (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right) = (-1)^{n+1} \frac{2n}{n^2-1} - b_n \text{ for } n \geq 2
 \end{aligned}$$

$$n_{pm} \quad n=1 \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \sin 2t \, dt = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{2} t \cos 2t \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos 2t}{2} \, dt =$$



Reg ex. ne p/m

$$x \cos x = -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{2-1}} 2^n \sin nx$$

$$ka \left(-\bar{n}; \bar{n} \right)$$

Pazometne no cos u no sin

$$f(x) \in L_n(0; 1)$$


Esim. ēlē pāzometne no zēniem $\rightarrow f(x) \in L_n(-1; 1)$

Tā ēlē pāz. Pysce - pāzometne $f(t)$ no $(-1; 1)$ no cos

Esim. no nerēšamai, tāto no sin.

Zagara 1

$$P(x) = x^2 \quad 0 < x < \pi \quad \text{no sin}$$




Paz. cix. nepādzīvējošo (pazīvbu) na $(-\infty; +\infty)$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t^2 \sin nt dt$$

Zagara 2

Pazometne līdz pāz. $P(x) = x^2$ na $(0; 1)$ c nepāzīmē!



$$2t=1 \Rightarrow t=\frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 t^2 \cos 2\pi n t dt \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = 2 \int_0^1 t^2 \sin 2\pi n t dt$$

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x) \quad \text{na } 0 < x < 1$$

Paz. cix-a nepādzīvējošo na $(-\infty; +\infty)$ s.u. cīņas pazīvbu

Pazometne no sin un cos zēniem kā nerēšamai spārniem gzs

$$\textcircled{1} \quad P(x) \in L_n(0; \frac{1}{2})$$



$$P(x) = f(-x), \quad 0 < x < \frac{1}{2} \quad \text{- cīņas gzs. } x = \frac{1}{2}$$

Daudz no nerēšamai, garei cīņas gzs

Bītīm cīņas $a_n = b_n = 0$

$$b_{2n+1} = \frac{4}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{\pi(2n+1)t}{l} dt \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$\sum_{n=0}^{\infty} b_{2n+1} \sin \frac{\pi(2n+1)x}{l}$ - polynomne no sin nerēšuv ugvīvus gys

(2) $f(x) \in L_n(0; \frac{l}{2})$

$$f(x) = -f(l-x), \quad 0 < x < \frac{l}{2} \text{ - ceturkme sim. i. } (\frac{l}{2}; 0)$$



$$a_n = 0, \quad b_{n+1} = 0,$$

$$b_{2n} = \frac{4}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{2\pi nx}{l} dt$$

Polynomne no sin ierēšuv ap. gys
(polynomne no sin c nevienam l)

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \sin \frac{2\pi nx}{l}$$

(3) $f(x) = -f(l-x) \quad \text{na } 0 < x < \frac{l}{2} \text{ - ceturkme sim. i. } (\frac{l}{2}; 0)$

Danee no ierēšuv, garec c nevienam $\pm l$

$$b_n = 0 \quad a_{2n} = 0$$

$$a_{2n+1} = \frac{4}{l} \int_0^l f(t) \cos \frac{\pi(2n+1)t}{l} dt$$

Polynomne no cos nerēšuv ap. gys

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} \cos \frac{\pi(2n+1)x}{l}$$

(4) $f(x) = f(l-x) \quad 0 < x < \frac{l}{2} \quad \text{- ceturkme sim. } x = \frac{l}{2}$

Danee no ierēšuv, garec c nevienam $\pm l$



$$f_n = 0 \quad a_{2n+1} = 0$$

$$a_{2n} = \frac{4}{l} \int_0^l f(t) \cos \frac{\pi \cdot 2nx}{l} dt$$

Polynomne no cos ierēšuv ap. gys

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos \frac{\pi \cdot 2nx}{l}$$

(gatīv. polynomne no cos c nevienam l)

Zadacha 1

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Рассмотрим на \sin на $[0, 2]$ $\{z_2\}$



Функция симм. осн. $x = 1$

$$F(x) = f(2-x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

Рассмотрим на \sin нечетных кр. гус.

$$f_{2n+1} = \frac{4}{2} \int_0^1 t \sin \frac{\pi(2n+1)t}{2} dt$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 (2n+1)^2} \sin \pi(n+\frac{1}{2})x$$


Рассмотрим \cos -ы п/и на $(-\infty, +\infty)$ т.к. $f(x)$ имеет непр. в узком - максимумах на $[-n, n]$

Zadacha 2

Построим кр. синусов п/и. Рассмотрим \cos и \sin нечет. и четных кр. гус.

Сколько у них п/и?

$$f(x) = \sin x \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$$



одиночные неч. кр. гус.

одн. п/и т.к. мин.

непр. в. в узких
максимумах на $[-n, n]$

одиночные чет. кр. гус.

одн. не п/и т.к.

перегибы

комплексные неч. кр. гус.

одн. не п/и

комплексные чет. кр. гус.

одн. п/и

$$f(x) = \sin x + 1$$



симметрическое
с.н. ф/н

симметрическое
с.н. ф/н

косимметрическое
с.н. ф/н

косимметрическое
с.н. ф/н

Несимметрическое группировочное представление периодической функции

$\exists f(x)$ кн. нечетная 21 в квадрате на $[-l; l]$, т.к.:

1. Равн. ф. с.н. ф/н на $(-\infty, +\infty)$

2. Равн. ф. имеет нечетные групп.

$$\text{Если } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right]$$

то ф. $f'(x)$ (к-пд квадратично на $[-l; l]$) имеет групп. групп. поэзия f :



$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(-a_n \cdot \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} + b_n \frac{n\pi}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} \right) - \text{не однозначно!}$$

неравн. ф/н

Пример

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$2x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \quad \text{сумма первых членов } 2x \text{ на } (-\pi; \pi) \text{ не симм. и непр.}\text{.}$$



$$-\pi < x < \pi$$

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

Равенство Парсеваля

$L_R^2(\mathbb{I})$ - инт. кв. оп-ии, адс. инт. на \mathbb{I} бывшее с $f(x)^2$.

Для некоторо $\mathbb{I} \subset L_R^2(\mathbb{I}) \subset L_R(\mathbb{I})$

Бес. квад. инт. - из $L_R^2(a; b)$

Если $f(x) \in L_R^2(-l; l)$ и инт. неог $\neq l$, то

$$\frac{d_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l (f(x))^2 dx$$

В равном пг. сеяа ср.

Пример

$$f(x) = x;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$f(x) = x^2;$$

$$\frac{2}{9}\pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^4}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Королевство Руркенера

$$\int_a^b f(x)^2 dx \leq C \int_a^b f'(x)^2 dx$$

Задача 2

$f(x)$ ну. в. на $[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$

$$\text{тогда } \int_a^b f(x)^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'(x)^2 dx$$

□ Расс-ии $\varphi(x) = f(x+a)$, $\varphi(a) = f(a) = 0$

$$\varphi(b-a) = f(b) = 0$$

Prayer. no nėrėinom, žiūremo neveogam $z \cdot (B-a)$ ($l = B-a$)

T. k. ona yra - ve., p. yra prie ca, p/n

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n x}{B-a}$$



$$\varphi'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\pi n}{B-a} \cos \frac{\pi n x}{B-a}$$

$$\frac{2}{B-a} \int_0^{B-a} \varphi(x)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$$

$$\frac{2}{B-a} \int_a^{B-a} \varphi'(x)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2}{(B-a)^2} b_n^2$$



Интегрирование рядов

Ряд $f(x)$ квад. -непр. на $[-l, l]$, не.неп. 2л

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

un. p.
действ

$$\text{Тогда } F(x) = \int_{-l}^x f(t) dt = \frac{a_0 x}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b_n}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} - \frac{a_n}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{l} \right) - \text{сумма рfn ex. p. действ}$$

$$C = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(t) dt$$

Если $\frac{a_0 x}{2}$ не симметрическое, то comes n не симметрическое.

Равномерное сходимость Ряда

Если $f(x)$ квад. н. на $[-l, l]$ и не.неп. 2л, то $a_n, b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$

$F(x)$ - квад.непр. функц. на $[-l, l]$, если $F'(x)$ квад.непр., то $|F'(x)| \leq C$,

тогда $f(x)$ квад.непр. в $[-l, l]$.

Конечно ряд $\sum a_n \cos nx + b_n \sin nx$

$f(x)$ квад.непр. и не.непр. в квад.непр. функц.

Например, $\text{sign } x$ - квад.непр. функц., но не квад. н.

Однозначность

Часть A. Если $f(x)$ не.неп. 2л и $f^{(k-1)}(x)$ квад. н. на $[-l, l]$,
то коэф. Ряда $a_n, b_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right)$

Часть B. Если $f(x)$ не.неп. 2л, $f^{(k-1)}(x)$ квад. н. на $[-l, l]$, $f^{(k-1)}(x)$
квад.непр., то $a_n, b_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right)$

Задача: доказать равномерную сходимость Ряда.

Пример

$$f(x) = x^2 \text{ на } [-\pi; \pi], \text{ с непр. } 2\pi$$

A) $k_{-1} = 0, k=1 \quad a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), b_n = 0$

$k_{-2} = 0, k_{-1} = 1, k=2 \quad a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ - условие применим

$$f(x) = x^3$$

A) нечетенное (одд симметрия в квадрате)

B) $k_{-1} = 0, k=1 \quad b_n = O\left(\frac{1}{n}\right), a_n = 0$

$$f(x) = (\pi^2 - x^2)^2 \quad [-\pi; \pi] \text{ с непр. } 2\pi$$

Несколько граничных точек непр. в т. π и $-\pi$ (на концах много доказать непр.)

$$f(\pi) = f(-\pi) = 0 \quad - \text{непр.}$$

$$f'(x) = 2(\pi^2 - x^2) \cdot (-2x)$$

$$f'(\pi) = f'(-\pi) = 0$$

$$f''(\pi) = f''(-\pi) \quad - \text{квад. непр.}$$

$$f'''(\pi) \neq f'''(-\pi) \quad - \text{квад. непр.}$$

A) $a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad b_n = 0$

B) $a_n = O\left(\frac{1}{n^3}\right) \quad - \text{на практике лучше брать B!}$

Задача 1

$$f(x) = \pi^3 x - x^3, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{парн. к p.} \quad \text{Рассмотрим sin.}$$

Форма кривой симметрична относительно оси ординат.



Фиг



Фиг'



Фиг''

Генуябенне ряб мережен геометрических

$$\text{Если } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = a$$

Однаково неверно, $(-1)^n$ - посл., ср-арифм. $\rightarrow 0$.

Ряд $1+2-3+1+2-3+\dots$ расходящийся (однако ряд ряда $\rightarrow 0$)

$$S_n = \begin{cases} 0, & n=3k \\ 1, & n=3k+1 \\ 3, & n=3k+2 \end{cases}$$

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n} \quad - \text{меридиан Римера (меридиан ср-арифм.)}$$

$$\sigma_n = \begin{cases} \frac{4}{3} = \frac{4}{3}, & n=3k \\ \frac{4k+1}{3k+1}, & n=3k+1 \\ \frac{4k+4}{3k+2}, & n=3k+2 \end{cases} \quad \sigma_{3k} = \frac{4}{3} \quad \sigma_{3k+1} \rightarrow \frac{4}{3} \quad \sigma_{3k+2} \rightarrow \frac{4}{3} \quad \sigma_n \rightarrow \frac{4}{3}$$

Задача 1

$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx + \dots$ - ряд сходящийся $\Leftrightarrow x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

А бүт мөнеген Римера сурьжылыш: $S_n = \sum_{k=1}^n \sin kx$ - компонентел үзүүлэлт

$$S_n = \frac{2 \sum_{k=1}^n \sin kx \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sum_{k=1}^n \cos(k-\frac{1}{2})x - \cos(k+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(n+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} =$$

$x \neq 2\pi k$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{2} - \frac{\cos(n+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$\sigma_n = \frac{\sum_{k=1}^n S_k}{n} \quad - \text{компонентел үзүүлэлт Римера}$$

$$\sigma_n = \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{2} - \frac{2 \sum_{k=1}^n \cos(k+\frac{1}{2})x \sin \frac{x}{2}}{n \cdot 4 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{2} - \frac{\sum_{k=1}^n (\sin((k+1)x) - \sin kx)}{n \cdot 4 \sin^2 \frac{x}{2}} =$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{2} - \frac{\sin((n+1)x) - \sin x}{4 \sin^2 \frac{x}{2}}, \quad n \rightarrow \infty$$

$$\lim \sigma_n = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \frac{x}{2}, & x \neq 2\pi k \\ 0, & x = 2\pi k \end{cases}$$



Симметризация p-Пурье на конечном Рейнхардте

Пусть $f(x) \in L_p(-l, l)$, α_n нечетные $2l$ и непр. в x_0 . Тогда при p -Пурье $f(x)$ симметризация $T_{x_0} \times f(x_0)$ неявна Рейнхардт.

Равномерное неяв. симметризование

Пусть $f(x)$ неяв. нечетные $2l$ и неяв. на $[-l, l]$. Тогда p -Пурье F равномерно симметрично $\times f(x)$ неявна Рейнхардт на $(-\infty, +\infty)$ ($\sigma_n(F, x) \xrightarrow[R]{} f(x)$)

Усл

Пусть $f(x) \in L_p(-l, l)$ и неяв. в x_0 , кроме p -Пурье в x_0 и x_0 .
Тогда он симметричен $\times f(x_0)$.

Теорема Бейнингеровской гармонической (согласие из нея).

Пусть $f(x)$ неяв. на $[-l, l]$, $f(-l) = f(l)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists$ гармонико-аналог $\tilde{T}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos \frac{\pi k x}{l} + \beta_k \sin \frac{\pi k x}{l})$, кроме $\forall x \in [-l, l] \rightarrow |f(x) - \tilde{T}(x)| < \varepsilon$.

Нормированное пространство

Норм.пр.-бо L наз-ся нормированным (НП), если в нем обеяне норма.

$\forall x \in L$ смыс. $\|x\| \in \mathbb{R}$, такое, что

$$1. \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$2. \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$$

$$3. \|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Для Евклидова пр.-бо $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$

НП \Rightarrow метрика, если $d(x, y) = \|x-y\|$

Нес-ко $x_n \rightarrow x$ в НП L , если $\|x_n - x\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$

$$(\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists n_0 : \forall n > n_0 \rightarrow \|x_n - x\| < \varepsilon)$$

Нес-ко x_n в НП \Rightarrow сходимость, если

$$\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists n_0 : \forall n, m > n_0 \rightarrow \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

Нес-ко сходимости x_n сходимости. Однозначно (единственность).

НП называется нормой (функцией), если в нем норма определена и однозначна.

Пример: \mathbb{R}^n ($\|x\| = |x|$).

Важное свойство НП не содержит! (исключение из общего правила не буд.)

Будет, модуль непрерывной пр.-бо с модулем непрерывности.

① $C[a, b]$ - пр.-бо сп-ми, непр. на $[a, b]$, $\|f\| = \max_{[a, b]} |f(x)|$.

$f_n \rightarrow f$ в $C[a, b]$, если $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists n_0 : \forall n > n_0 \rightarrow \|f_n - f\| < \varepsilon$

$$\left(\max_{[a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \right)$$

По пр. Каждое о-правиле пр.-ми, $C[a, b]$ нормал.

② $C'[a, b]$ - пр.-бо сп-ми, непр. диф. на $[a, b]$, $\|f\| = \max_{[a, b]} |f(x)| + \max_{[a, b]} |f'(x)|$

$C'[a, b]$ - нормал.

□ Пусть $f_n \subset C[a, b]$ и $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists n_0 : \forall n, m > n_0 \rightarrow \|f_n - f_m\| < \varepsilon$.

$$\forall x \in [a, b] \rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \text{ и } |f'_n(x) - f'_m(x)| < \varepsilon, \Rightarrow$$

Teorema \exists $f_n(x) \in C^1[a, b]$, $\exists x_0 \in [a, b] : f_n(x_0)$ cx.,

$f'_n(x) \Rightarrow \psi(x)$ na $[a, b]$, $\forall x \in [a, b] \Rightarrow f(x) = f_n(x)$,

$f(x) \in C^1[a, b]$, $f'(x) = \psi(x)$.

\Rightarrow No sp. Kumm p-w cx-sm, $f_n(x) \text{ u } f'_n(x)$ p/w cx. na $[a, b]$.

$f_n(x) \Rightarrow f(x)$, $f'_n(x) \Rightarrow \psi(x) = f'(x)$

$f(x) \in C^1[a, b]$, $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists n_0 : \forall n > n_0 \quad \forall x \in [a, b] \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ $|f'_n(x) - f'(x)| < \varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow f_n \rightarrow f$ & $C^1[a, b]$, i.e. $C^1[a, b]$ normo.

③ Пример ненормо np-fa

Mn-ho nesp. qm-va na $[a, b]$ c normoi $\|f\| = \max_{[a, b]} |f(x)|$,

Bozinen $f(x) = |x|$ na $[-\bar{x}; \bar{x}]$, jaree ' nemogen \bar{x} - kymas - mayas' na $[-\bar{x}; \bar{x}]$ u nesp. \Rightarrow p. Pysse cx-a pribuzdys: $S_n(f, x) \Rightarrow f(x)$

T.e. ona qmymasivina (nem-ho nesp. qm-va), no npege ne zhe \Rightarrow nesp. qm-va. \Rightarrow normo ne slb-a vaygyniice b' numen np-be.

Zman ona nenevel.

Dymne normo b' np-be nesp. qm-va

$$L^2_c[a, b] \quad \|f\| = \sqrt{\int_a^b (f(x))^2 dx} \quad - \text{nenevel}$$

$$L^1_c[a, b] \quad \|f\| = \int_a^b |f(x)| dx$$

$(C[a, b])$ $f_n \rightarrow f$, $\exists \lim \|f_n - f\|_c \rightarrow 0$ - pribuzdys cx-iz

$L^2_c[a, b]$ $\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$: $\int_a^b |f_n - f|^2 dx \rightarrow 0$ - cx-iz B qyymen abayraimman

$L^1_c[a, b]$ $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$: $\int_a^b |f_n - f| dx \rightarrow 0$ - cx-iz B qyymen



Bere q-un neng.

p/n cx-iz - called convex.

\Rightarrow n̄l̄ w̄l̄ w̄ḡl̄ cx-iz & sp. ab.

$$\|f_n - f\|_c \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_2 &\rightarrow 0 : \int_a^b (f_n - f)^2 dx \leq \\ &\leq \|f_n - f\|_c^2 \cdot \int_a^b 1 dx = (b-a) \|f_n - f\|_c^2 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Analogous, p/n cx. \rightarrow cx. sp.

\Rightarrow cx. & sp. ab. \rightarrow cx. sp.

$$\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$$

$$\|f_n - f\|_1 = \int_a^b |f_n - f| dx \leq \sqrt{\int_a^b (f_n - f)^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b 1 dx} = \sqrt{b-a} \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$$

B ebungsaufg. sp. ab. L^2

$$\left| \langle f, g \rangle \right| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

$$\int_a^b f(x) g(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g(x)^2 dx}$$

nepavienība Korn - Sjvansobrāzno

Pac-nam $f_n(x)$:



Kāda da n̄l̄ da n̄l̄ bērija h_n ir gora, n̄l̄reinheits cx-iz $\rightarrow 0$.

$$\forall x \in [0, 1] \quad f_n(x) \rightarrow f(x) \leq 0$$

- p/n cx-iz $\Leftrightarrow h_n \rightarrow 0$: $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = h_n$

$$\|f_n - f\|_1 = \int_a^b |f_n - f| dx = \frac{h_n}{2n}$$

- $Cx-iz$ & sp. abg., $\text{esm } h_n = O(n)$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_2 &= \sqrt{\int_a^b (f_n - f)^2 dx} = \sqrt{2 \int_0^{1/2n} (kx)^2 dx} = \sqrt{2 \cdot \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{3} h_n^3} = \sqrt{\frac{h_n^3}{3n}} \\ &= \sqrt{2 \cdot 4 \cdot h_n^2 \cdot \frac{1}{3n}} = \sqrt{\frac{8h_n^2}{3n}} = \sqrt{\frac{8}{3} \cdot \frac{1}{n}} \end{aligned}$$

- $Cx-iz$ & sp. abg., $\text{esm } h_n = O(\sqrt{n})$

Esm $h_n = 1$: esm & sp. abg., net reibnepnas.

Esm $h_n = \sqrt{n}$: esm & sp. abg., net & sp. abg.

Esm $h_n = n$: esm n̄l̄reinheits, net s̄l̄vānu l̄ngab

