ÁCIDO TRANEXÁMICO: DOSIS POR ESCENARIO

Ácido tranexámico: dosis por escenario

Tarjeta de consulta rápida — el factor común es administrarlo pronto

2026 · Tarjeta derivada de PBM-08 · CAUSA / SACYL

Idea: el TXA reduce muerte por hemorragia (trauma, posparto) y transfusión (cirugía); cuanto antes, mejor.

PAUTAS POR ESCENARIO (TAL COMO EN LOS ENSAYOS)

Escenario	Pauta	Efecto / matiz	Ensayo
Trauma con hemorragia	1 g IV en 10 min + 1 g en 8 h; iniciar < 3 h de la lesión	↓ mortalidad (RR 0,91); máximo si precoz	CRASH-2 [1]
Hemorragia posparto	1 g IV; repetible a los 30 min si persiste	↓ muerte por hemorragia (RR 0,81; 0,69 si < 3 h)	WOMAN [2]
TCE leve-moderado	1 g + 1 g/8 h; < 3 h	↓ muerte por TCE en leve-moderado; **no** en grave	CRASH-3 [3]
Cirugía (cardíaca/mayor)	Bolo + infusión perioperatoria	↓ transfusión y reoperación; ↑ convulsiones a dosis altas	ATACAS [4]

Pautas de los ensayos pivotales. Ajustar a protocolo local y ficha técnica; vigilar dosis altas en insuficiencia renal y cirugía cardíaca (convulsiones).

REGLA DE ORO

En el sangrado de trauma y posparto, el TXA salva vidas **solo si se da pronto** (idealmente < 3 h). No lo retrases esperando pruebas.

DÓNDE NO ESPERAR GRAN BENEFICIO

En el **TCE grave establecido** el efecto es limitado [3]. A **dosis altas en cirugía cardíaca**, vigilar convulsiones [4].

ACTUALIZACIÓN NICE NG24 (2026)

NICE ya **no exige estimar la pérdida sanguínea**: ofrece TXA en **cualquier procedimiento con riesgo hemorrágico**. Fuera de quirófano (radiología intervencionista, urgencias), si la pérdida prevista supera 500 ml (adultos) o el 10 % del volumen sanguíneo (niños 1–15 años) [5].

Referencias

1. CRASH-2 trial collaborators (Shakur H, Roberts I, et al.). Effects of tranexamic acid... (CRASH-2). *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
2. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration... (WOMAN). *Lancet* 2017;389(10084):2105–2116. doi:10.1016/S0140-6736(17)30638-4 · PMID 28456509.
3. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid... traumatic brain injury (CRASH-3). *Lancet* 2019;394(10210):1713–1723. doi:10.1016/S0140-6736(19)32233-0 · PMID 31623894.
4. Myles PS, Smith JA, Forbes A, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Coronary-Artery Surgery. *N Engl J Med* 2017;376(2):136–148. doi:10.1056/NEJMoa1606424 · PMID 27774838.
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Blood transfusion (NG24): tranexamic acid — actualización. Londres: NICE; 26 feb 2026. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng24. *(Guía verificada en la web oficial de NICE; no indexada en PubMed.)*

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-03 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-08. Pautas de los ensayos pivotales verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*