P-QR-05 · ALG · tarjeta de consulta rápida · Quick-reference · sintetiza PBM-16

ANTITROMBÓTICOS · MARCO DE DECISIÓN PERIOPERATORIO

Manejo de antitrombóticos según fármaco y riesgo

Tarjeta de consulta rápida — balance trombosis vs sangrado, individualizado

2026 · Tarjeta derivada de PBM-16 · CAUSA / SACYL

Idea: decidir por fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico. Tiempos exactos: protocolo local.

MARCO DE DECISIÓN POR FAMILIA DE FÁRMACO

Fármaco	Conducta general perioperatoria
Aspirina (prev. 2.ª)	A menudo **mantener** en riesgo hemorrágico bajo-moderado; valorar según procedimiento.
Inhibidores P2Y$_{12}$ (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel)	**Suspender** unos días antes de cirugía mayor; decisión en equipo si stent reciente.
Doble antiagregación + stent reciente	**Posponer** la cirugía electiva; si inaplazable, decisión multidisciplinar (cardiología).
AVK (warfarina, acenocumarol)	Suspender con antelación, controlar INR; reversión urgente con **CCP + vitamina K**.
ACOD (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán)	Suspender según fármaco, función renal y riesgo hemorrágico; **habitualmente sin puente**.

Marco de decisión [1,2]; los **tiempos exactos de suspensión** se toman del protocolo local y la ficha técnica.

EL MITO DEL PUENTE (BRIDGE)

En fibrilación auricular, **no** hacer puente con heparina fue no inferior para tromboembolismo (0,4 vs 0,3 %) y **redujo la hemorragia mayor** (1,3 vs 3,2 %; RR 0,41) [1]. El puente sistemático **añade sangrado sin proteger**; resérvalo para alto riesgo trombótico seleccionado.

TRES PREGUNTAS ANTES DE DECIDIR

- ¿Qué **fármaco** y con qué vida media (y función renal)?
- ¿Qué **riesgo trombótico** tiene el paciente (motivo de la terapia)?
- ¿Qué **riesgo hemorrágico** tiene el procedimiento?

REANUDACIÓN

Reiniciar cuando la hemostasia quirúrgica lo permita, de forma escalonada y coordinada entre equipos. Reversión y rescate: → PBM-18 (CCP, agentes específicos).

Referencias

1. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al. Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation (BRIDGE). *N Engl J Med* 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. Management of severe peri-operative bleeding: ESAIC Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-05 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-16. Marco de decision verificado contra PubMed. Los tiempos exactos de suspension se toman del protocolo local y la ficha tecnica vigentes. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*