

Titel

Namen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Distortion example



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$\begin{aligned}x &= x_d + (x_d - x_c)(1 + K_1 r^2 + K_2 r^4) + P_1 (r^2 + 2(x_d - x_c)^2) + 2P_2(x_d - x_c)(y_d - y_c) \\y &= y_d + (y_d - y_c)(1 + K_1 r^2 + K_2 r^4) + 2P_1(x_d - x_c)(y_d - y_c) + P_2 (r^2 + 2((y_d - y_c)^2))\end{aligned}$$

Radial distortion:

Tangential distortion:

$K_n = n^{th}$ radial distortion coefficient

$P_n = n^{th}$ tangential distortion coefficient

(x_d, y_d) = distorted image point as projected on image plane

(x, y) = undistorted image point as projected on image plane

(x_c, y_c) = distortion center

$$r = \sqrt{(x_d - x_c)^2 + (y_d - y_c)^2}$$

Distortion example

$$x = x_d + (x_d - x_c)(1 + K_1 r^2 + K_2 r^4) + P_1 (r^2 + 2(x_d - x_c)^2) + 2P_2(x_d - x_c)(y_d - y_c)$$
$$y = y_d + (y_d - y_c)(1 + K_1 r^2 + K_2 r^4) + 2P_1(x_d - x_c)(y_d - y_c) + P_2 (r^2 + 2((y_d - y_c)^2))$$

Radial distortion:




Abbildung: radial distortion possibilities

Tangential distortion:





Abbildung: first order tangential distortion

pixel size detection



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

pixelSize = 1:



pixelSize = 8:

