

# Semana 1: Teoría de conjuntos

## 1. Conjuntos

En nuestra experiencia, *un conjunto* es un ente formado por objetos que satisfacen una condición dada, como el conjunto de puntos en el plano o el conjunto de los números pares. De manera precisa, un conjunto es un término no definido al que se le da significado a través de axiomas. Para el objetivo de este texto, sin embargo, bastará considerar la idea intuitiva de conjunto. Por esta razón, los términos *conjunto*, *elemento* y *pertenece a* se consideran primitivos y podrán ser usados en la forma intuitiva usual.

Usaremos como sinónimos las palabras *conjunto*, *familia* y *colección* y en general, utilizaremos las letras mayúsculas  $A, B, C$ , etc., para denotarlos. Para indicar que un objeto  $a$  es un elemento de un conjunto  $A$ , escribiremos  $a \in A$ . La negación de este enunciado se escribe simplemente como  $a \notin A$ . Supondremos que si  $a \in A$ , entonces  $A \notin a$  y en consecuencia para cada conjunto  $A$  debemos tener  $A \notin A$ . La igualdad entre conjuntos se define por su extensión. Es decir, diremos que  $A$  y  $B$  son *iguales*, en símbolos  $A = B$ , si están compuestos por exactamente los mismos elementos. En caso de ser lo anterior falso, escribiremos  $A \neq B$ .

Para especificar los elementos de un conjunto usaremos la escritura entre llaves. Por ejemplo, si  $A$  es un conjunto que contiene exclusivamente a los elementos  $a, b$  y  $c$  escribimos

$$A = \{a, b, c\}.$$

Es importante mencionar que bajo esta notación, el orden en que se listan los elementos es irrelevante y lo mismo lo es el número de veces que un elemento es mencionado. Esto es consecuencia de la igualdad entre conjuntos.

## 2. Subconjuntos

Si  $A$  y  $B$  son conjuntos y cada elemento de  $B$  es también un elemento de  $A$ , entonces diremos que  $B$  es un *subconjunto* de  $A$ . En símbolos esto se escribe  $B \subseteq A$ . Sinónimos para este fenómeno son las expresiones  *$B$  está contenido en  $A$*  y  *$B$  está incluido en  $A$* . De la igualdad entre conjuntos podemos observar que dos conjuntos  $A$  y  $B$  son iguales si y sólo si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$ . Es importante notar que  $A \subseteq A$  es siempre cierto; por esta razón diremos que  $B$  es un *subconjunto propio* de  $A$ , en símbolos  $B \subset A$ , si  $B \subseteq A$  pero  $A \neq B$ .

Si  $A$  es un conjunto y  $\alpha$  una propiedad, entonces todos los elementos de  $A$  que satisfacen  $\alpha$  forman un conjunto, el cual resulta en particular un subconjunto de  $A$ . A este conjunto lo escribimos como

$$\{x \in A \mid \alpha(x)\}.$$

Lo anterior se lee como «todos los elementos de  $A$  que satisfacen  $\alpha$ »

En todas las situaciones que abordaremos, todos los conjuntos considerados serán subconjuntos de un conjunto fijo. A tal conjunto se le denomina *conjunto universal* y aunque pocas veces se mencionará explícitamente, su existencia se asumirá en contexto. Usando esta convención, para una propiedad  $\alpha$ , el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}$$

indica la colección de todos los elementos  $x$  del conjunto universal que satisfacen  $\alpha(x)$ . Esto indica que los subconjuntos del conjunto universal pueden ser especificados sin hacer una mención explícita de éste.

**Ejemplo.** Afirmaremos que existe un único conjunto que carece de elementos, el cual recibe el nombre de *conjunto vacío* y que denotaremos por el símbolo  $\emptyset$ . A este conjunto podemos especificarlo como

$$\emptyset = \{x \mid x \neq x\}.$$

En otras palabras, para cualquier elemento  $a$ , debemos tener  $a \notin \emptyset$ . Esta descripción nos permite afirmar para cualquier conjunto  $A$  que

$$\emptyset \subseteq A.$$

### 3. Operaciones en conjuntos

Usando el proceso de especificación descrito en la sección anterior, podemos pensar a los conjuntos como enunciados lógicos. Como en los enunciados lógicos, los conjuntos vienen equipados con algunas operaciones básicas.

**Definición 1.1.** Sean  $A$  y  $B$  conjuntos. La *unión de los conjuntos  $A$  y  $B$*  es el conjunto

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Bajo la definición anterior,  $a \in A \cup B$  si y sólo si  $a \in A$  o  $a \in B$ . Debemos recordar que en matemáticas, la disyunción, *o*, tiene un significado inclusivo a diferencia de nuestro lenguaje común, donde es interpretada con un sentido exclusivo. En el sentido exclusivo del término, el conjunto  $A \cup B$  está formado por elementos que pertenecen al conjunto  $A$ , al conjunto  $B$  o ambos.

**Ejemplo.** Consideramos los conjuntos  $A = \{a, b, c\}$  y  $B = \{c, d, e\}$ . La unión de éstos resulta simplemente el conjunto

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}.$$

Debe notarse que el elemento  $c$  que pertenece a ambos conjuntos está listado.

**Proposición 1.1.** Para conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ :

1.  $A \cup A = A$ .
2.  $A \cup B = B \cup A$ .
3.  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ .
4.  $A \subseteq A \cup B$  y  $B \subseteq A \cup B$ .

*Demostración.* Los cuatro enunciados deben ser inmediatos de las reglas lógicas asociadas a la disyunción. ■

Las reglas expuestas en la proposición son las mismas que gobiernan la disyunción en lógica proposicional. De hecho, la prueba de los enunciados se recarga completamente en el comportamiento de la disyunción. Si existiera alguna duda acerca del porqué la proposición debe ser cierta, es importante realizar todos los pasos en ella.

**Definición 1.2.** Sean  $A$  y  $B$  conjuntos. La intersección de los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Podemos describir de manera coloquial a la intersección de dos conjuntos como el proceso de tomar los elementos que tienen en común. Esto simplemente resulta de observar que existen dos condiciones que definen al conjunto y las cuales se deben cumplir simultáneamente.

**Ejemplo.** Considerando los conjuntos  $A = \{a, b, c, d\}$  y  $B = \{a, c, e, g\}$ , la intersección queda descrita como

$$A \cap B = \{a, c\}.$$

**Proposición 1.2.** Para conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ :

1.  $A \cap A = A$ .
2.  $A \cap B = B \cap A$ .
3.  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ .
4.  $A \cap B \subseteq A$  y  $A \cap B \subseteq B$ .

*Demostración.* Los cuatro enunciados son inmediatos de las reglas lógicas asociadas a la conjunción. ■

Como en el caso de la unión, las reglas para la intersección son las mismas que gobiernan la conjunción y su prueba se recarga completamente en el comportamiento de la conjunción. No debe sorprender que las leyes distributivas de la lógica proposicional hagan su aparición en las operaciones que hemos definido.

**Proposición 1.3.** Para conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ :

1.  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .
2.  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

*Demostración.* Se probará solamente 1, 2. se puede obtener por analogía. Si  $a \in A \cap (B \cup C)$ , entonces  $a \in A$  y  $a \in B \cup C$ ; además, si  $a \in B \cup C$ , entonces  $a \in B$  o  $a \in C$ . En suma,  $a \in A$  y  $a \in B$  o  $a \in C$ . Como la conjunción distribuye sobre la disyunción, entonces  $a \in A$  y  $a \in B$  o  $a \in A$  y  $a \in C$  por lo que  $a \in A \cap B$  o  $a \in A \cap C$ , lo cual implica que  $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ . Esto significa que

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

La otra contención se obtiene por analogía, obteniendo el resultado que buscamos. ■

**Definición 1.3.** Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. La *diferencia entre  $A$  y  $B$* , es el conjunto

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Si  $B \subseteq A$  entonces a  $A \setminus B$  se dice *el complemento de  $B$  relativo a  $A$* . En particular, el complemento de  $A$  relativo al conjunto universal, al que se le denomina simplemente *el complemento de  $A$* , se denota con el símbolo  $A^c$ .

**Ejemplo.** Consideremos el conjunto  $A = \{a, b, c, d, e, f\}$  y  $B = \{a, b, c\}$ . Entonces, la diferencia  $A$  entre  $B$  queda expresa por el conjunto

$$A \setminus B = \{d, e, f\}.$$

**Ejemplo.** Considerando como conjunto universo a  $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f, g\}$  y tomando al conjunto  $A = \{a, d, f\}$ , el complemento de  $A$  es el conjunto

$$A^c = \{b, c, e, f\}.$$

Aunque la definición no da una expresión explícita del complemento de  $A$ , es sencillo encontrarla usando nuestra convención acerca del conjunto universal:

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}.$$

De nueva cuenta, este conjunto está asociado con una operación utilizada en lógica, la negación, y se comporta de manera similar.

**Proposición 1.4.** Sea  $U$  el conjunto universal y sea  $A$  un conjunto cualquiera. Entonces:

1.  $(A^c)^c = A$ .
2.  $A \cup A^c = U$ .
3.  $A \cap A^c = \emptyset$ .

*Demostración.* El primer enunciado es inmediato de la doble negación de un enunciado. El segundo del principio del medio excluido que nos permite obtener tautologías. El tercer enunciado es resultado del principio de no contradicción. ■

Como en el caso de la conjunción, disyunción y negación, las operaciones de unión, intersección y complemento, interactúan a través de las denominadas *leyes de De Morgan*.

**Proposición 1.5** (Leyes de De Morgan). Para cualesquiera conjuntos  $A$  y  $B$ , son válidas:

1.  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .
2.  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .

*Demostración.* Es directa a partir de las leyes de DeMorgan aplicadas en los enunciados que definen a cada conjunto. ■

La diferencia entre conjuntos, aunque en apariencia diferente, representa también una versión de la negación en lógica y no está exenta de un comportamiento parecido.

**Proposición 1.6.** Para cualesquiera conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ , son válidas las igualdades:

1.  $A \setminus B = A \cap B^c$ .
2.  $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ .
3.  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ .

*Demostración.* Para probar 1, es necesario observar que  $a \in A \setminus B$  si y sólo si  $a \in A$  y  $a \notin B$ . Como  $a \notin B$  si y sólo si  $a \in B^c$ , es posible concluir que  $a \in A \setminus B$  si y sólo si  $a \in A \cap B^c$ . En otras palabras,

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Para probar 2, usaremos 1 y las leyes de DeMorgan:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cup C) &= A \cap (B \cup C)^c \\ &= A \cap (B^c \cap C^c) \\ &= (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) \\ &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

El enunciado en 3, se prueba de manera similar a 2. ■

## Ejercicios

*Ejercicio 1.1.* Sea  $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  el universo y sean  $A = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  $B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$  y  $C = \{2, 4, 6, 7, 8\}$ . Encuentra:

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. La unión de $A \cup B$ .     | 3. La diferencia $B \setminus C$ . |
| 2. La intersección $A \cap C$ . | 4. El complemento $A^c$ .          |

*Ejercicio 1.2.* Para los conjuntos del ejercicio anterior, encuentra:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. $(A \cup B) \setminus C$ . | 3. $(A \cup C) \setminus (C \cap A)$ . |
| 2. $(A \cup B)^c$ .           | 4. $(A) \setminus (B \cup C)^c$ .      |

*Ejercicio 1.3.* ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son iguales?  $A = \{a, b, a, b, a, c\}$ ,  $B = \{a, a, a, a, b, c, c\}$ ,  $C = \{a, a, a, c\}$ ,  $D = \{a, a\}$ ,  $E = \{a\}$ ,  $F = \{c, a\}$ .

*Ejercicio 1.4.* Sean  $A = \{1\}$  y  $B = \{1, 2\}$  conjuntos. Determina la validez de las siguientes afirmaciones.

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. $A \subset B$ | 4. $A \in B$     |
| 2. $A \neq B$    | 5. $1 \subset A$ |
| 3. $1 \in A$     | 6. $1 \subset B$ |

*Ejercicio 1.5.* Determina la validez de las siguientes afirmaciones:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. $\emptyset \in \emptyset$     | 4. $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ |
| 2. $\emptyset \in \{\emptyset\}$ | 5. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$     |
| 3. $\emptyset \subset \emptyset$ | 6. $\emptyset \neq \{\emptyset\}$                       |

*Ejercicio 1.6.* Sean  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{\{1\}, \{2\}\}$ ,  $C = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$  y  $D = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$  conjuntos. Discute la validez de las siguientes afirmaciones.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ■ $A = B$ .       | ■ $B \subset C$ . |
| ■ $A \subset B$ . | ■ $B \subset D$ . |
| ■ $A \in C$ .     | ■ $B \in D$ .     |
| ■ $A \subset C$ . | ■ $A \in D$ .     |
| ■ $A \subset D$ . |                   |

(Sugerencia: A veces, los conjuntos pueden tener como elementos otros conjuntos. Ten en cuenta que en algunos de los conjuntos de este ejercicio, éste es el caso.)

*Ejercicio 1.7.* Si dos conjuntos  $A$  y  $B$  son tal que su unión y su intersección son iguales, ¿qué se puede decir de ellos?

*Ejercicio 1.8.* Sean  $A$  y  $B$  conjuntos cualquiera y sea  $S \subseteq A$  y  $S \subseteq B$ . Demuestra que  $S \subseteq A \cap B$ .

## Referencias

[Apo84] Apostol, Tom M.: *Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal*. Editorial Reverté, 1984.

[Spi12] Spivak, Michael: *Cálculo Infinitesimal*. Editorial Reverté, 3<sup>a</sup> edición, 2012.

Considerar notas el texto precedente es producto de la imaginación febril de autor. El único propósito al que sirven es dar una interpretación personal de algunos de los temas contenidos en [Spi12] y con ellos preparar el curso de «Cálculo Diferencia e Integral I» impartido en la carrera de Actuaría de la FES Acatlán. Es muy probable que el presente texto esté lleno de errores gramaticales, imprecisiones técnicas y es sujeto a cambios constantes.