

Semana 13: Análisis geométrico de las funciones diferenciables

1. Convexidad y concavidad

Mucho de lo que expondremos aquí es un resumen que conecta lo que afirman los textos [Spi12] y [Pis77], los cuales se complementan uno al otro. Es importante notar que un par de definiciones ligeramente distintas una de la otra de las cuales probaremos siguen una de la otra.

Definición 13.1. Una función es *convexa en un intervalo*, si para todo a y b en el intervalo, el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se sitúa por encima de la gráfica de f .

El único punto que requiere aclaración de la definición, es la expresión *se sitúa*. Es sencillo predecir que esto significa que, si $L_{a,b}$ es la recta que uno los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ entonces, para todo $x \in (a, b)$, se cumple

$$L_{a,b}(x) > f(x).$$

Lema 13.1. Una función es convexa en el intervalo I si y sólo si, dados $a, b \in I$, para todo $x \in (a, b)$ se satisface

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Demostración. Observemos primero que el segmento rectilíneo que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ está representado por la función

$$L_{a,b}(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

En ese caso, si asumimos que la función es convexa en I , eso quiere decir que, para todo $x \in I$, se cumple $f(x) < L_{a,b}(x)$. En otras palabras,

$$f(x) - f(a) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

En particular, lo anterior se debe cumplir si $x \in (a, b)$ y de lo cual obtenemos

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si suponemos ahora que la desigualdad es cierta, entonces no es difícil manipularla para obtener para cada $a, b \in I$ y $x \in (a, b)$ que

$$f(x) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Lo cual quiere decir simplemente que para cada par de números $a, b \in I$, el segmento rectilíneo que une a los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ está por encima de la gráfica de la función. ■

Es de notar que el lema anterior permite caracterizar por completo el concepto de función convexa por lo que pueden reemplazar completo a la definición que hemos dado con la ventaja que no depende de conceptos geométricos sino de desigualdades.

Definición 13.2. Sea f una función cualquiera y sea a un punto en su dominio. El punto $(a, f(a))$, donde la recta tangente y la gráfica de la función f se cruzan, se denomina *punto de contacto*.

Lema 13.2. Sea f una función convexa en un intervalo I . Si f es diferenciable para algún $a \in I$, entonces la gráfica de f se sitúa por encima de la tangente a f en el punto $(a, f(a))$, excepto en el mismo punto de contacto.

Demostración. Definimos la función

$$g(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Si $0 < h_1 < h_2$, como f es convexa, el lema 13.1 garantiza que se satisface $g(h_1) < g(h_2)$ cuando se aplica a los puntos $a < a + h_1 < a + h_2$. Esto implica que g es creciente y a su vez que, para $h > 0$, se cumple

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} g(h) < \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

De manera similar podemos concluir

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} g(h) > \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

para $h < 0$ observando que la función decrece g para estos valores. De la primera desigualdad podemos concluir que la recta tangente en a para f tiene pendiente menor que la secante que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$. Como ambas pasan por el punto $(a, f(a))$ podemos concluir que para $h > 0$ la recta secante está encima de la recta tangente. De manera similar, para $h < 0$ la recta tangente tiene una pendiente mayor que la secante que pasa por los puntos $(a+h, f(a+h))$ y $(a, f(a))$ pasando ambas por el punto $(a, f(a))$. Esto quiere decir que la recta secante para por encima de la recta tangente. En resumen, si $b \in I$ tal que $b \neq a$, entonces podemos escribirlo como $b = a + h$ y como la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ pasa siempre por encima de la función se debe tener el resultado. ■

Corolario 13.3. Si la función f es diferenciable en I , entonces f' es creciente en I .

Demostración. Supongamos que $a < b$. Según el resultado anterior,

$$f'(a) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

y también

$$f'(b) > \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

De esto simplemente resulta $f'(a) < f'(b)$ mostrando que f' es creciente en I . ■

Vamos ahora a construir un resultado que revela más estructura de las funciones convexas y representa un paso adicional a una caracterización del concepto en el marco de las funciones diferenciables.

Lema 13.4. *Sea f una función diferenciable en I de forma que f' es creciente. Entonces, si $a < b$ y $f(a) = f(b)$, se debe cumplir $f(x) < f(a) = f(b)$ para todo $x \in (a, b)$.*

Demostración. Procedemos por contradicción suponiendo que $f(x) \geq f(a)$ para algún $x \in [a, b]$. Como la función f es diferenciable en el intervalo ha de ser continua también. Considerando solamente el intervalo, $[a, b]$ debe existir un punto $c \in (a, b)$ de forma que éste sea el punto máximo de f en dicho intervalo. Pero según el teorema del valor intermedio, debe existir además un punto $c_1 \in (a, c)$ de forma que

$$f'(c_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq 0.$$

la anterior desigualdad afirma que $f'(c) \leq f'(c_1)$ por lo que la función f no es creciente contradiciendo una de las hipótesis. El resultado entonces sigue. ■

Teorema 13.5. *Si f es diferenciable en I y f' es creciente, entonces f es convexa.*

Demostración. Sean $a < b$ elementos del intervalo I . Definimos

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Entonces, g es diferenciable en I y además, $g'(x) = f'(x)$ para todo $x \in I$ exhibiendo con esto que g' es creciente en el intervalo I . Además, $g(a) = g(b) = f(a)$ por lo que aplica el lema anterior permitiendo afirmar que $g(x) < g(a) = f(a)$ para todo $x \in (a, b)$, i.e.,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \blacksquare$$

Corolario 13.6. *Si f es 2-diferenciable en I y $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es convexa.*

Demostración. No es más que una observación acerca de f'' . Como $f''(x) > 0$ en I , podemos concluir que f' es creciente en I y el resultado sigue del teorema. ■

Corolario 13.7. *Si f es diferenciable en I y la tangente a cada punto está debajo de la gráfica de f , entonces f es convexa.*

Demostración. Considerando $a < b$ podemos definir las rectas tangentes a la función en los puntos a y b , i.e.,

$$L_a(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$$

y

$$L_b(x) = f'(b)(x - b) + f(b).$$

Según las hipótesis, se debe satisfacer que $f(b) > L_a(b)$ y $f(a) > L_b(a)$ lo cual nos lleva a tener

$$f(b) > f'(a)(b - a) + f(a) > (f'(a) - f'(b))(b - a) + f(b)$$

lo cual significa simplemente que

$$(f'(a) - f'(b))(b - a) < 0$$

lo cual solamente es posible si $f'(a) < f'(b)$. En ese caso, f' es creciente en el intervalo I y según el teorema ■

Este último corolario y el lema 13.2 nos permiten caracterizar por completo que una función diferenciable es convexa si y sólo si la tangente a cada punto está debajo de la gráfica de f .

Ejemplo. La función $f(x) = x^4$ es convexa en cualquier intervalo. Lo anterior se debe que su $f''(x) = 12x^2$ es siempre positivo y según el corolario 13.6, esto es suficiente para garantizar que la función es convexa en cualquier intervalo.

Definición 13.3. Una función f se dice *cóncava en un intervalo* si $-f$ es convexa en el mismo intervalo.

Todos los resultados de funciones convexas pueden ser formulados para funciones cóncavas de manera muy sencilla, basta escribirlos con todas la paciencia del mundo.

Ejemplo. La función $f(x) = -x^2 + 7x$ es cóncava en todo punto pues al calcular $f''(x) = -2 < 0$ para todo x lo cual garantiza, según el corolario ?? formulado para funciones cóncavas, que la función f es cóncava en todo punto.

Finalmente, podemos dar una imagen mucho más general de las gráficas de la funciones diferenciables al estudiar su convexidad combinando los criterios establecidos en esta sección.

Ejemplo. Para estudiar el comportamiento de la función $f(x) = 2 - x^3$ usaremos los criterios que hemos descrito, primero observamos que $f''(x) = -6x$. Esto quiere decir que, si $x < 0$, entonces $f''(x) > 0$ y de la misma manera, si $x > 0$, entonces $f''(x) < 0$. Esto quiere decir que la función es convexa para $x < 0$ y cóncava para $x > 0$.

2. Puntos de inflexión

Como podría haberse notado en la discusión de máximos y mínimos, cuando un punto crítico no resultaba ni máximo ni mínimo, afirmábamos simplemente que éste era un punto de inflexión. Esta posición es por supuesto injustificada desde un punto de vista geométrico pero ahora estamos en posición de dar un análisis geométrico del porqué denominar así a estos puntos no es problemático.

Definición 13.4. Un punto a se dice *de inflexión* de la función f si existen intervalos (c, a) y (a, b) de forma que f es cóncava en (c, a) y convexa en (a, b) o viceversa.

En esencia, un punto de inflexión es aquel punto donde una función cambia su comportamiento entre cóncavo y convexo. Geométricamente, esta idea modela adecuadamente lo que debe resultar un punto de inflexión. Sin embargo, debemos ahora conectarlo con nuestra posición en el análisis de los puntos críticos. Esto es en realidad fácil de responder al no ser difícil mostrar que si a es un mínimo local, entonces existe un intervalo alrededor de a donde f será convexa. De manera similar, si a es un máximo local, existirá un intervalo alrededor de a de modo que f será cóncava.

Esto quiere decir que en los puntos máximos y mínimos locales la convexidad y concavidad de cada uno se preserva por lo que, si el punto crítico no es ni máximo ni mínimo, entonces cambiará la convexidad por concavidad o viceversa al pasar la función por éste. El concepto de punto de inflexión ligeramente más amplio como muestra el siguiente teorema.

Teorema 13.8. *Sea f una función 2-diferenciable para todo $x \in I$ con $x \neq a$ para $a \in I$. Si f'' no existe en a o existe y satisface $f''(a) = 0$ y además f'' cambia de signo al pasar por a , entonces a es un punto de inflexión.*

Demostración. Si $f''(x) < 0$ para $x < a$ y $f''(x) > 0$ para $x > a$, entonces f debe ser cóncava para $x < a$ y convexa para $x > a$ lo cual indica que a es un punto de inflexión. El otro caso sigue de manera similar. ■

El teorema anterior, aparte de permitirnos ampliar los objetos que llamamos puntos de inflexión, nos provee con un nuevo criterio para la clasificación de puntos críticos. En el fondo, nos dice que si la segunda derivada se anula, debemos observar los signos alrededor de ésta para determinar si el punto no será un punto de inflexión.

Ejemplo. Para estudiar la función $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ debemos observar su segunda derivada: $f''(x) = -2/9(x-1)^{-5/3}$. Dicha función simplemente no está definida en 1 pero debemos observar que $f''(x) > 0$ si $x < 1$ y también $f''(x) < 0$ si $x > 1$ por lo que 1 es un punto de inflexión de la función f .

Ejemplo. La función $f(x) = -x^4$ al cumplir con $f''(x) = -12x^2$ no puede tener puntos de inflexión pues nunca cambiar de signo y siempre ser cóncava.

Referencias

- [Apo84] Apostol, Tom M.: *Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal*. Editorial Reverté, 1984.
- [HLS90] Hassler, Norman B., LaSalle, Joseph P. y Sullivan, Joseph A.: *Análisis matemático. Curso de Introducción Vol. 1*. Editorial Trillas, 2ª edición, 1990.
- [Pis77] Piskunov, N.: *Cálculo diferencial e integral: Tomo I*. Editorial Mir, Moscú, 1977.
- [Spi12] Spivak, Michael: *Cálculo Infinitesimal*. Editorial Reverté, 3ª edición, 2012.

Considerar notas el texto precedente es producto de la imaginación febril de autor. El único propósito al que sirven es dar una interpretación personal de algunos de los temas contenidos en [Spi12] y con ellos preparar el curso de «Cálculo Diferencial e Integral I» impartido en la carrera de Actuaría de la FES Acatlán. Es muy probable que el presente texto esté lleno de errores gramaticales, imprecisiones técnicas y es sujeto a cambios constantes.