



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

La Guerra de las Galaxias: Rebelión e Imperio

Tesis presentada para optar al título de
Licenciado en Ciencias de la Computación

Leonel Exequiel Gómez

Director: Obi-Wan Kenobi

Codirector: Master Yoda

Buenos Aires, 2011

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS: REBELIÓN E IMPERIO

La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las malévolas Fuerzas Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader. El intrépido Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial “El Halcón Milenario”, y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo y rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la Galaxia (aprox. 200 palabras).

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

STAR WARS: REBELLION AND EMPIRE

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star's master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire's stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa's home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan's coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance's base on Yavin's fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi viejo.

CONTENTS

1. Introducción	1
1.1 Imágenes por resonancia magnética (MRI)	1
1.2 Resonancia magnética de difusión	2
1.3 Modelos de difusión	3
1.4 IQT	3
2. La guerra de las galaxias	5
2.1 Infancia y juventud	5
2.2 Rescate de la princesa	5
2.3 Sacrificio y victoria	5
3. El imperio contraataca	7
4. El regreso del Jedi	9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Imágenes por resonancia magnética (MRI)

La Resonancia Magnética es una técnica útil para generar imágenes de órganos internos del cuerpo, sin la necesidad de someter al mismo a un procedimiento quirúrgico. Estas imágenes permiten a los médicos hacer distintos tipos de diagnósticos. La imagen construida por esta técnica está fuertemente relacionada con la densidad de partículas de hidrógeno en un determinado voxel (píxel en tres dimensiones). Dicha densidad es representada con una intensidad dentro de la escala cromática.

Esta técnica, a grandes rasgos, se basa en los siguientes fenómenos físicos. El primero de ellos, es una propiedad que poseen las partículas de los núcleos de hidrógeno, llamada momento angular intrínseco (*spin angular momentum* en inglés). Dichas partículas se encuentran girando todo el tiempo en su propio eje a una frecuencia determinada. La razón de su momento angular intrínseco se la llama razón giromagnética (*gyromagnetic ratio* en inglés) y lo denotamos con el símbolo γ . El valor de esta razón es propio de cada sustancia y su unidad en el *sistema internacional* es de radianes sobre segundos por tesla. Debido a esto, dichos núcleos se encuentran magnetizados y se comportan como un pequeño imán bipolar, los cuales propagan cierto campo magnético en una cierta dirección. Es por ello, que podemos representarlos como un vector en tres dimensiones. La orientación del campo la representamos con la dirección del vector y la magnitud del campo con longitud del mismo.

El siguiente fenómeno, es la consecuencia de aplicar un campo magnético B a partículas que se encuentran girando en su propio eje. La consecuencia será que estas comenzarán a describir un movimiento de precesión alrededor de un eje. Dicho eje se encuentra alineado en la misma dirección que el campo magnético B . La frecuencia de este movimiento, en cada partícula será proporcional a B y a su razón giromagnética.

$$\omega = \gamma B \text{ [ecuación de Larmor]}$$

Medir el campo magnético de una única partícula (o inclusive de varias) resulta imposible. Debido a que, por un lado, el campo magnético es muy débil como para poder ser captado por las maquinarias de hoy en día. Y la distribución uniforme de las partículas de hidrógeno en los tejidos provoca que sus respectivos vectores se cancelen (es decir, que sumen una resultante nula).

Con el fin de poder medir el campo magnético que propagan las partículas, se les aplican una secuencia de campos magnéticos gradientes (es decir, que poseen distinta intensidad a lo largo de una dirección). Dichos campos magnéticos gradientes hacen que las partículas se alineen convenientemente y que a distintas posiciones en el espacio, posean distintas frecuencias de precesión. La posibilidad de alinearlas causa que la resultante de los vectores que representan a las partículas ya no se cancelen. Y que giren a distintas frecuencias en función de la posición, ayuda a discriminar de qué punto o plano del cuerpo proviene la señal que queremos medir.

Ya que podemos saber la frecuencia en la que giran las partículas en cierta posición (por la ecuación de Larmor). Y gracias al fenómeno físico conocido como *resonancia*, podemos generar un pulso radio magnético el cual incrementará considerablemente la velocidad de

giro a las partículas que estén girando a la misma frecuencia que dicho pulso. Excitar un conjunto de partículas de esta manera en una cierta posición, les aplica una gran cantidad de energía. Y ahora si, con esta energía adicional, el campo magnético que propagan los núcleos de hidrógeno excitados puede ser captado por una máquina. Con esta señal los escáners pueden construir las imágenes MRI.

1.2 Resonancia magnética de difusión

La resonancia magnética de difusión (dMRI del termino en ingles *Diffusion MRI*) es la extensión de MRI con el fin de poder además representar la difusión de las moléculas del agua dentro de los tejidos. En nuestro caso particularmente dentro de la materia blanca del cerebro. La importancia clínica de las imágenes de difusión cobro importancia cuando ? reportaron que con dichas imágenes es posible discriminar entre tejido normal y tejido isquémico. Ninguna otra técnica podía hacerlo, con la excepción de la tomografía con emisión de positrones.

Uno de los desafíos importantes de la física y de la química del siglo *xx*, fue como cuantificar la difusión de un liquido en un medio. En 1950 ? se dio cuenta la señal MRI era sensible a la difusión.

Fue así, que ? tuvieron la idea de sensibilizar los escáners de resonancia magnética al movimiento de las partículas de agua, modificando la secuencia de campos magnéticos gradientes.

Como la difusión de las partículas de agua es influenciada por la estructura del medio en el cual difunde, entonces la resonancia magnética puede usarse para entender la estructura de los tejidos de una manera no invasiva.

Casi una década después ? proponen una nueva secuencia llamada *Pulse Gradient Spin Echo* (PSGE). La cual agrega otro gradiente a la secuencia utilizada para generar las imágenes MRI. Este nuevo gradiente G añade velocidad de precesión a los núcleos en un determinado momento del experimento por un tiempo δ . Luego se apaga dicho campo magnético gradiente y se enciende otro exactamente igual, pero en sentido contrario y durante el mismo período de tiempo δ . El primer gradiente esta causando que los núcleos que están precediendo se desfacen. Desfasarse en este caso provoca que una componente de la resultante de los vectores que representan a los núcleos, se cancele, con lo cual el escáner percibirá una caída de señal mucho más rápida que con el experimento sin gradiente G . Ahora bien, el segundo gradiente, debería corregir esa diferencia de fase (ya que le aplica el mismo impulso, el mismo tiempo, pero en el sentido contrario). Sin embargo no es del todo cierto, y es porque las partículas no están quietas. Las mismas se están moviendo debido a la difusión. Entonces esa caída más abrupta de la señal nos aporta información de la difusión en ese punto. Es por ello, que para hablar de difusión lo que hacemos es comparar una imagen sin gradientes G y una con un gradiente no nulo G . Porque la diferencia que hay entre esas dos mediciones es debido a la difusión.

$$E(G, \Delta, \delta) = \frac{S(G, \Delta, \delta)}{S_0}$$

$$S_0 = S(q = 0)$$

A $E(G, \Delta, \delta)$ la llamamos *atenuación de la señal* y Δ es el tiempo entre la activación del primer gradiente y el segundo en sentido contrario, el cual describimos en el párrafo anterior. Esta señal nos habla únicamente de la difusión de las partículas de hidrógeno

en la misma dirección en la cual se aplicó el campo magnético gradiente G , en un voxel determinado del cerebro. Dicha G es un vector que representa la intensidad del campo gradiente y su dirección.

Cabe aclarar que la estructura del cerebro es *anisotrópica* en relación a la difusión de las partículas de hidrógeno. Esto quiere decir, que el valor medido en un determinado voxel depende de la dirección en la que se la mida. Es por ello, que para reconstruir los modelos que representan la difusión de las partículas de hidrógeno en el cerebro, es necesario hacer mediciones en varias direcciones distintas. Inclusive, existen modelos como NODDI (ref) que además de distintas direcciones precisan distintas intensidades de G .

Le brian introducir q

Tomar varias mediciones para distintos valores de gradientes, se lo llama muestrear el q -space, ya que en cierta forma se está muestreando la señal para varios valores de la variable q , siendo que G está codificada en dicha variable.

Con el correr de los años una de las líneas de investigación más importante en el área fue la interpretación física de la señal recibida por los escáners de MR.

1.3 Modelos de difusión

La materia blanca es uno de los varios tipos de tejidos que encontramos en el cerebro. Se sabe que la misma está conformada en su mayoría por axones [?]. Los axones son una prolongación larga que constituye la morfología de las células neuronales. Luego entender en que direcciones prefiere difundir el agua dentro de la materia blanca es útil para poder entender la estructura de los axones con un estudio *in-vivo* (ref). Dado que, aunque las partículas de hidrógeno pueden difundir hacia cualquier dirección del espacio, su gran mayoría encontrará menos obstáculos al difundir en una dirección alineada con el axón (o fajo de axones) que se disponga en ese lugar. Como la difusión es una propiedad anisotrópica, para representarla no basta un escalar. Precisamos un objeto matemático conocido como *tensor*, que sirve para representar magnitudes independientemente del espacio vectorial en el que se lo mida. Es así que ? propone medir la atenuación de la señal en varias direcciones y así aproximar el tensor de difusión D . [falta]

[Mencionar que hacen los modelos y listar un par]

[Introducir Tractografía]

1.4 IQT

[problema de la resolución] En MRI la resolución típica de las imágenes es del orden de los milímetros, mientras las escalas de las longitudes en los tejidos neuronales son del orden de los micrones. La típica resolución de los voxels de hoy en día es de $2 \times 2 \times 2 \text{ mm}^3$. Esta diferencia en escala, provoca groseros errores en los resultados de las tractografías. Es por ello, que es de suma importancia mejorar la resolución de las imágenes de difusión. Reducir el volumen del voxel es desafiante porque trae aparejado una mayor relación señal ruido en las mediciones.

Para apallear este problema se han propuestos varios métodos para obtener imágenes de alta resolución. Los cuales caen en dos grandes categorías. El primero de ellos toman como entrada una sola imagen en baja resolución y por medio de técnicas de *interpolación*

obtienen una imagen de mayor resolución. El segundo grupo, más conocido como *super-resolution*, toma como entrada varias imágenes en baja resolución y con ellas intenta construir una en alta resolución. [falta]

2. LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

2.1 Infancia y juventud

*There's nothing for me now. I want to learn the ways of
the Force and become a Jedi like my father.*
–Luke Skywalker

2.2 Rescate de la princesa

Here's where the fun begins!
–Han Solo

2.3 Sacrificio y victoria

*This will be a day long remembered.
It has seen the end of Kenobi.
It will soon see the end of the Rebellion.*
–Darth Vader

3. EL IMPERIO CONTRAATAACA

4. EL REGRESO DEL JEDI

BIBLIOGRAPHY

- P J Bassar, J Mattiello, and D LeBihan. MR diffusion tensor spectroscopy and imaging. *Biophysical journal*, 66(1):259–67, 1994. ISSN 0006-3495. doi: 10.1016/S0006-3495(94)80775-1. URL <http://www.cell.com/article/S0006349594807751/fulltext>.
- E. M. Carr, H. Y. and Purcell. Effects of Diffusion on Free Precession in Nuclear Magnetic Resonance Experiments. *Phys. Rev.*, 94(3):630—638, 1954. doi: 10.1103/PhysRev.94.630. URL <http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.94.630>.
- Erwin Hahn. Receive Coil Transmit Coil. *Phys. Rev*, 80(4):1–6, 1950.
- M. E. Moseley, Y. Cohen, J. Mintorovitch, L. Chileuitt, H. Shimizu, J. Kucharczyk, M. F. Wendland, and P. R. Weinstein. Early detection of regional cerebral ischemia in cats: Comparison of diffusion- and T2-weighted MRI and spectroscopy. *Magnetic Resonance in Medicine*, 14(2):330–346, 1990. ISSN 07403194. doi: 10.1002/mrm.1910140218.
- Dale Purves, George J Augustine, David Fitzpatrick, Willian C Hall, Anthony-Samuel Lamantia, James O Mcnamara, and S. Mark Willians. *Neuroscience*, volume 3. 2004. ISBN 0878937250. doi: 978-0878937257.
- E O Stejskal and J E Tanner. Spin Diffusion Measurements : Spin Echoes in the Presence of a Time, Dependent Field Gradient. *The Journal of Chemical Physics*, 42:288–292, 1965. ISSN 0021-9606. doi: 10.1063/1.1695690.