

Функциональное программирование

Лекция 2. Рекурсия и редукция

Денис Николаевич Москвин

СПбАУ РАН

15.09.2015

- 1 Теорема о неподвижной точке
- 2 Редексы и нормальная форма
- 3 Теорема Чёрча-Россера
- 4 Стратегии редукции

- 1 Теорема о неподвижной точке
- 2 Редексы и нормальная форма
- 3 Теорема Чёрча-Россера
- 4 Стратегии редукции

Схема β -преобразования $(\lambda n. M) N = M[n := N]$ даёт возможность решать простейшие уравнения на термы.

Пример

Найти F , такой что $\forall M, N, L \quad \lambda \vdash F M N L = M L (N L)$.

$$F M N L = M L (N L)$$

$$F M N = \lambda l. M l (N l)$$

$$F M = \lambda n. \lambda l. M l (n l)$$

$$F = \lambda m n l. m l (n l)$$

А если уравнение рекурсивное, например, $F M = M F$?

Схема β -преобразования $(\lambda n. M) N = M[n := N]$ даёт возможность решать простейшие уравнения на термы.

Пример

Найти F , такой что $\forall M, N, L \quad \lambda \vdash F M N L = M L (N L)$.

$$F M N L = M L (N L)$$

$$F M N = \lambda l. M l (N l)$$

$$F M = \lambda n. \lambda l. M l (n l)$$

$$F = \lambda m n l. m l (n l)$$

А если уравнение рекурсивное, например, $F M = M F$?

Оказывается, имеется универсальный способ решения!

Теоремы о неподвижной точке

Теорема

Для любого λ -терма F существует неподвижная точка:

$$\forall F \in \Lambda \quad \exists X \in \Lambda \quad \lambda \vdash FX = X$$

Доказательство

Введем $W \equiv \lambda x. F(x x)$ и $X \equiv WW$. Тогда

$$X \equiv WW \equiv (\lambda x. F(x x)) W = F(WW) \equiv FX \quad \blacksquare$$

Теорема

Существует комбинатор неподвижной точки Y , такой что

$$\forall F \quad F(YF) = YF.$$

Доказательство

Введём $Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f(x x))(\lambda x. f(x x))$. Имеем $YF \equiv$

$$(\lambda x. F(x x))(\lambda x. F(x x)) = F(\underbrace{(\lambda x. F(x x))(\lambda x. F(x x))}_{YF}) \equiv F(YF) \quad \blacksquare$$

Y-комбинатор и рекурсия

Y-комбинатор позволяет ввести рекурсию в λ -исчисление.

Пример

Факториал рекурсивно:

$$\text{fac} = \lambda n. \text{iif} (\text{iszro } n) 1 (\text{mult } n (\text{fac} (\text{pred } n)))$$

Переписываем в виде

$$\text{fac} = \underbrace{(\lambda f n. \text{iif} (\text{iszro } n) 1 (\text{mult } n (f (\text{pred } n))))}_{\text{fac}'} \text{fac}$$

Отсюда видно, что fac — неподвижная точка для вспомогательной функции fac' :

$$\text{fac} = Y \text{ fac}'$$

Как работает $\text{fac} \equiv Y \text{ fac}'$?

Пример

```
fac 3  =  (Y fac') 3
        =  fac' (Y fac') 3
        =  iif (iszro 3) 1 (mult 3 ((Y fac') (pred 3)))
        =  mult 3 ((Y fac') 2)
        =  mult 3 (fac' (Y fac') 2)
        =  mult 3 (mult 2 ((Y fac') 1))
        =  mult 3 (mult 2 (mult 1 ((Y fac') 0)))
        =  mult 3 (mult 2 (mult 1 1))
        =  6
```


- 1 Теорема о неподвижной точке
- 2 Редексы и нормальная форма
- 3 Теорема Чёрча-Россера
- 4 Стратегии редукции

Мы строили λ -исчисление как теорию о равенстве термов.

А как можно было бы доказать неравенство?

Мы строили λ -исчисление как теорию о равенстве термов.

А как можно было бы доказать неравенство?

Пример

$$\mathbf{K\ I} \equiv (\lambda x y. x) (\lambda z. z) = \lambda y z. z$$

$$\mathbf{I\ I\ K_*} \equiv (\lambda x. x) \mathbf{I\ K_*} = \mathbf{I\ K_*} \equiv (\lambda x. x) (\lambda y z. z) = \lambda y z. z$$

Видно, что процесс носит односторонний характер: термы при конверсиях «упрощаются». Для исследования подобного вычислительного аспекта вводят понятие **редукции**:

- $\mathbf{K\ I} \rightarrow_{\beta} \mathbf{K_*}$ — редуцируется за один шаг;
- $\mathbf{I\ I\ K_*} \twoheadrightarrow_{\beta} \mathbf{K_*}$ — редуцируется;
- $\mathbf{K\ I} =_{\beta} \mathbf{I\ I\ K_*}$ — конвертируемо (равно).

Определение

Терм вида $(\lambda x. M) N$ называется β -редексом.

Определение

Терм $M[x := N]$ называется *сокращением* редекса $(\lambda x. M) N$.

Пример

Терм $I (K I)$ содержит два редекса

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p))$$
$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p))$$

Может ли сокращение увеличить число редексов?

Понятие редукции

Определение

Бинарное отношение \mathcal{R} над Λ называют **совместимым** (с операциями λ -исчисления), если для любых $M, N, Z \in \Lambda$:

$$\begin{aligned}M \mathcal{R} N &\Rightarrow (Z M) \mathcal{R} (Z N), \\ &\quad (M Z) \mathcal{R} (N Z), \\ &\quad (\lambda x. M) \mathcal{R} (\lambda x. N).\end{aligned}$$

Определение

Совместимое отношение эквивалентности называют отношением **конгруэнтности** над Λ .

Определение

Совместимое, рефлексивное и транзитивное отношение называют отношением **редукции** над Λ .

Редукция за один шаг \rightarrow_β

Определение

Бинарное отношение β -*редукции за один шаг* \rightarrow_β над Λ :

$$(\lambda x. M) N \rightarrow_\beta M[x := N]$$

$$M \rightarrow_\beta N \Rightarrow \textcolor{blue}{Z} M \rightarrow_\beta \textcolor{blue}{Z} N$$

$$M \rightarrow_\beta N \Rightarrow M Z \rightarrow_\beta N Z$$

$$M \rightarrow_\beta N \Rightarrow \lambda x. M \rightarrow_\beta \lambda x. N$$

По определению \rightarrow_β является совместимым (с операциями λ -исчисления).

Пример: редуцируем терм $I (K I)$

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p)) \rightarrow_\beta (\lambda y z. y) (\lambda p. p) \rightarrow_\beta \lambda z p. p$$

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p)) \rightarrow_\beta (\lambda x. x) (\lambda z p. p) \rightarrow_\beta \lambda z p. p$$

Многошаговая редукция \rightarrow_β

Определение

Бинарное отношение β -*редукции* \rightarrow_β над Λ (индуктивно):

$$(a) \quad M \rightarrow_\beta M$$

$$(b) \quad M \rightarrow_\beta N \Rightarrow M \rightarrow_\beta N$$

$$(c) \quad M \rightarrow_\beta N, N \rightarrow_\beta L \Rightarrow M \rightarrow_\beta L$$

Отношение \rightarrow_β является **транзитивным** **рефлексивным** замыканием \rightarrow_β и, следовательно, отношением редукции.

Примеры

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p)) \rightarrow_\beta (\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p))$$

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p)) \rightarrow_\beta (\lambda y z. y) (\lambda p. p)$$

$$(\lambda x. x) ((\lambda y z. y) (\lambda p. p)) \rightarrow_\beta \lambda z p. p$$

Отношение конвертируемости $=_\beta$

Определение

Бинарное отношение $=_\beta$ над Λ (индуктивно):

- (a) $M \rightarrow_\beta N \Rightarrow M =_\beta N$
- (b) $M =_\beta N \Rightarrow N =_\beta M$
- (c) $M =_\beta N, N =_\beta L \Rightarrow M =_\beta L$

Отношение $=_\beta$ является отношением конгруэнтности.

Утверждение


$$M =_\beta N \Leftrightarrow \lambda \vdash M = N.$$

Доказательство


Индукция по определениям. ■

Отношение конвертируемости $=_\beta$ (интуитивно)

Интуитивно: два терма M и N связаны отношением $=_\beta$, если есть связывающая их цепочка \rightarrow_β -стрелок:



Пример. $K I =_\beta I I K_*$



Нормальная форма

Определение

λ -терм M **находится** в β -нормальной форме (β -NF), если в нем нет подтермов, являющихся β -редексами.

Определение

λ -терм M **имеет** β -нормальную форму, если для некоторого N выполняется $M =_{\beta} N$ и N находится в β -NF.

Примеры

- Терм $\lambda x y. x (\lambda z. z x) y$ находится в β -нормальной форме.
- Терм $(\lambda x. x x) y$ не находится в β -нормальной форме, но имеет в качестве β -nf терм $y y$.

Нормальная форма (2)


Утверждение

Не все термы имеют β -нормальную форму.

Пример

$$\begin{aligned}\Omega &\equiv \omega \omega \\ &\equiv (\lambda x. x x) (\lambda x. x x) \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda x. x x) (\lambda x. x x) \\ &\rightarrow_{\beta} \dots\end{aligned}$$

Это пока не доказательство! Может быть существует терм N в β -NF, такой что $\Omega =_{\beta} N$, например, так



Нормальная форма (3)

Бывают термы, «удлинняющиеся» при редукции.

Пример

$$\begin{aligned}\Omega_3 &\equiv \omega_3 \omega_3 \\ &\equiv (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) \\ &\rightarrow_\beta (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) \\ &\rightarrow_\beta (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) (\lambda x. x x x) \\ &\rightarrow_\beta \dots\end{aligned}$$

С какой скоростью будет расти $\Omega_4 \equiv \omega_4 \omega_4$?

Нормальная форма (4)

Не все последовательности редукций приводят к β -NF.

Пример

$$\begin{aligned} \mathbf{KI}\Omega &\equiv \mathbf{KI}((\lambda x. x\ x)(\lambda x. x\ x)) \\ &\rightarrow_{\beta} \mathbf{KI}((\lambda x. x\ x)(\lambda x. x\ x)) \\ &\rightarrow_{\beta} \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{KI}\Omega &\equiv (\lambda x\ y. x)\mathbf{I}\Omega \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda y. \mathbf{I})\Omega \\ &\rightarrow_{\beta} \mathbf{I} \end{aligned}$$

(синим отмечен сокращаемый редекс)

Редукционные графы (1)

Определение

Редукционный граф терма $M \in \Lambda$ (обозначаемый $G_\beta(M)$) — это ориентированный мультиграф с вершинами в $\{N \mid M \rightarrow_\beta N\}$ и дугами \rightarrow_β .

$$G_\beta(I(Ix)) = \bullet \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \longrightarrow \end{array} \bullet \longrightarrow \bullet \quad G_\beta(\Omega) = \bullet \begin{array}{c} \curvearrowright \end{array}$$

$$G_\beta((\lambda x. I) \Omega) = \bullet \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \longrightarrow \end{array} \bullet \quad G_\beta(KI\Omega) = \bullet \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \longrightarrow \end{array} \bullet \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \longrightarrow \end{array} \bullet$$

$$G_\beta(\Omega_3) = ??? \quad G_\beta((\lambda x. I) \Omega_3) = ???$$

Редукционные графы (2)

Не все редукционные графы конечны.

Пример

$$G_{\beta}(\Omega_3) = \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \dots$$

Не все бесконечные редукционные графы не имеют нормальной формы.

Пример


$$G_{\beta}((\lambda x. I) \Omega_3) = \begin{array}{ccccccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet & \longrightarrow & \bullet & \longrightarrow & \bullet \longrightarrow \dots \\ & \downarrow & \nearrow & \nearrow & \nearrow & & \\ & \bullet & & & & & \end{array}$$

- 1 Теорема о неподвижной точке
- 2 Редексы и нормальная форма
- 3 Теорема Чёрча-Россера**
- 4 Стратегии редукции

Теорема [Чёрч-Россер]

Если $M \twoheadrightarrow_{\beta} N$, $M \twoheadrightarrow_{\beta} K$, то существует L , такой что $N \twoheadrightarrow_{\beta} L$ и $K \twoheadrightarrow_{\beta} L$.

- Иначе говоря, β -редукция обладает *свойством ромба*:



- Иногда используют термин *конфлюентность*.


Следствия теоремы Чёрча-Россера (1)

Теорема о существовании общего редукта

Если $M =_{\beta} N$, то существует L , такой что, $M \rightarrow_{\beta} L$ и $N \rightarrow_{\beta} L$.

Доказательство (индукция по генерации $=_{\beta}$)

- $M =_{\beta} N$, поскольку $M \rightarrow_{\beta} N$. Возьмем $L \equiv N$.
- $M =_{\beta} N$, поскольку $N =_{\beta} M$. По гипотезе индукции имеется общий β -редукт L_1 для N, M . Возьмем $L \equiv L_1$.
- $M =_{\beta} N$, поскольку $M =_{\beta} N'$, $N' =_{\beta} N$. Тогда



Следствия теоремы Чёрча-Россера (2)

Теорема [Редуцируемость к NF]

Если M имеет N в качестве β -NF, то $M \rightarrow_{\beta} N$.

Теперь мы можем доказать отсутствие NF у Ω . Иначе выполнялось бы

$$\Omega \rightarrow_{\beta} N, \quad N \text{ является } \beta\text{-NF.}$$

Но Ω редуцируется лишь к себе и не является β -NF.

Теорема [Единственность NF]

λ -терм имеет не более одной β -NF.

Теперь мы можем доказывать «неравенства», например

$$\lambda \not\vdash \text{tru} = \text{fls}.$$


Иначе было бы $\text{tru} =_{\beta} \text{fls}$, но это две разные NF, что противоречит единственности.

- 1 Теорема о неподвижной точке
- 2 Редексы и нормальная форма
- 3 Теорема Чёрча-Россера
- 4 Стратегии редукции**

- Как мы можем редуцировать терм?
 - Переменная: v — редукция завершена.
 - Абстракция: $\lambda x. M$ — редуцируем M .
 - Аппликация: $M N$. Все варианты отсюда.
- Разбираем аппликацию до не-аппликации (обычно влево)
 - $(\dots ((v N_1) N_2) \dots N_k)$ — редуцируем отдельно все N_i (обычно слева направо).
 - $(\dots (((\lambda x. M) N_1) N_2) \dots N_k)$. Все варианты отсюда.
- **Нормальная стратегия:** сокращаем редекс $(\lambda x. M) N_1$.
- **Аппликативная стратегия:** редуцируем отдельно все N_i (обычно слева направо) до нормальной формы N'_i , затем сокращаем редекс $(\lambda x. M) N'_1$.

Синтаксические деревья для λ -термов

Пример: дерево для терма $((\lambda x. M) N_1) N_2$



- Узлы $@$ задают аппликацию, узлы λ — абстракцию.
- Узлы $@$ могут задавать редекс ($@$) или нет ($@$).
- В первом случае при поиске редекса — кандидата на сокращение есть три варианта (нашли, влево, вправо), во втором — два (влево, вправо).

Аппликативная структура терма

Теорема

Лямбда-терм может иметь одну из двух форм:

$$\begin{aligned}\lambda \vec{x}. y \vec{N} &\equiv \lambda x_1 \dots x_n. \textcolor{blue}{y} N_1 \dots N_k, \quad n \geq 0, k \geq 0 \\ \lambda \vec{x}. (\lambda z. M) \vec{N} &\equiv \lambda x_1 \dots x_n. (\textcolor{red}{\lambda z. M}) \textcolor{red}{N}_1 \dots N_k, \quad n \geq 0, k > 0\end{aligned}$$

Определение

Первая форма называется *головной нормальной формой* (HNF). Переменная $\textcolor{blue}{y}$ называется *головной переменной*, а редекс $(\textcolor{red}{\lambda z. M}) \textcolor{red}{N}_1$ — *головным редексом*.

Переменная $\textcolor{blue}{y}$ может совпадать с одной из x_i .

Определение

Слабая головная нормальная форма (WHNF) — это HNF или лямбда-абстракция, то есть не редекс на верхнем уровне.

Операционная семантика нормальной стратегии

Синтаксические категории:

- Нормальные формы $NF ::= \lambda x. NF \mid NANF$
- Нормальные формы (не абстракции) $NANF ::= v \mid NANF NF$
- Не абстракции $NA = v \mid PQ$

Операционная семантика *нормальной* стратегии:

$$\frac{NA \rightarrow NA'}{NA \ N \rightarrow NA' \ N} \quad (\text{Аппл1})$$

$$\frac{N \rightarrow N'}{NANF \ N \rightarrow NANF \ N'} \quad (\text{Аппл2})$$

$$\frac{M \rightarrow M'}{\lambda x. M \rightarrow \lambda x. M'} \quad (\text{Абстр})$$

$$(\lambda x. M) N \rightarrow M[x := N] \quad (\text{Редук})$$

Нормальная стратегия всегда сокращает самый левый внешний редекс (leftmost outermost).

Операционная семантика аппликативной стратегии

Синтаксические категории:

- Нормальные формы $NF ::= \lambda x. NF \mid NANF$
- Нормальные формы (не абстракции) $NANF ::= v \mid NANF NF$
- Не абстракции $NA = v \mid PQ$

Операционная семантика *аппликативной* стратегии:

$$\frac{NA \rightarrow NA'}{NA \ N \rightarrow NA' \ N} \text{ (Аппл1)}$$

$$\frac{N \rightarrow N'}{NANF \ N \rightarrow NANF \ N'} \text{ (Аппл2)}$$

$$\frac{M \rightarrow M'}{\lambda x. M \rightarrow \lambda x. M'} \text{ (Абстр)}$$

$$(\lambda x. M) \text{NF} \rightarrow M[x := \text{NF}] \text{ (Редук)}$$

$$\frac{N \rightarrow N'}{(\lambda x. M) \ N \rightarrow (\lambda x. M) \ N'} \text{ (Аппл3)}$$

Аппликативная стратегия сокращает самый левый внутренний редекс (leftmost innermost).

Теорема о нормализации

Аппликативная vs нормальная стратегии

$$\mathbf{KI} \Omega \equiv \mathbf{KI} ((\lambda x. x x) (\lambda x. x x)) \rightarrow_{\beta} \dots$$

$$\mathbf{KI} \Omega \equiv (\lambda x y. x) \mathbf{I} \Omega \twoheadrightarrow_{\beta} \mathbf{I}$$

Теорема о нормализации

Если терм M имеет нормальную форму, то последовательное сокращение самого левого внешнего редекса приводит к этой нормальной форме.

- То есть **нормальная стратегия** гарантированно нормализует нормализуемое.
- Можем доказывать отсутствие NF. Например, $\mathbf{K} \Omega \mathbf{I}$.

Недостаток нормальной стратегии — возможная неэффективность, достоинство — не считает ничего «лишнего».

Нормальная vs аппликативная стратегии

- Пусть N — «большой» терм

$$(\lambda x. F x (G x) x) N \rightarrow_{\beta} F N (G N) N$$

В процессе дальнейших редукций редексы в N придётся сокращать три раза.

- Зато в

$$(\lambda x y. y) N \rightarrow_{\beta} \lambda y. y$$

нормальная стратегия не вычисляет N ни разу.

- Аппликативная стратегия в обоих примерах вычислит N один раз.

- Аппликативная стратегия похожа на стратегию вычислений («энергичную», eager) большинства языков программирования. Сначала вычисляются аргументы, затем происходит применение функции.
- Нормальная стратегия похожа на способ вычисления в «ленивых» (lazy) языках (Haskell, Clean).
- Для решения проблем с эффективностью в «ленивых» языках используют *механизм разделения* (через вычисления в контекстах или через редукцию на графах).

Стратегии редукции и ЯП (2)

- Нет необходимости всегда доводить редукцию до NF. На практике часто ограничиваются WHNF.
- Это позволяет избежать захвата переменной в замкнутом терме (почему?)
- При наличии констант (в расширенных системах) понятие WHNF (и HNF) дополняют частично применёнными константными функциями, например

`and true`

поскольку его можно записать в η -эквивалентном WHNF-виде

`$\lambda x.$ and true x`

- В Haskell к WHNF относят и полностью применённый конструктор данных.

- **Механизм вызова** — термин, применяемый при исследовании высокоуровневых языков программирования.
- В функциональных языках:
 - «вызов по значению» — аппликативный порядок редукций до WHNF;
 - «вызов по имени» — нормальный порядок редукций до WHNF;
 - «вызов по необходимости» — «вызов по имени» плюс разделение.