

Функциональный анализ (6 семестр)

[Скачать PDF](#)[Открыть на HackMD](#)

Ссылки

Конспект + теормин от Артёма Жолуса:

- [Линейные операторы в банаховых пространствах](#)
 - [Сопряженный оператор](#)
 - [Ортогональное дополнение в банаховых пространствах](#)
- [Элементы спектральной теории линейных операторов](#)
 - [Определение спектра и резольвенты оператора](#)
 - [Альтернатива Фредгольма-Шаудера](#)
- [Теорема Гильберта-Шмидта](#)

Конспекты: [Дина](#), [Аня](#), [Рома](#)

Гуглодоки: [5 семестр + 6 семестр](#)

Викиконспекты: [Функциональный анализ + теормин + ещё конспект](#)

Полезное: лекции [МГУ](#), [ВШЭ](#)

Напоминания

Векторное (или линейное) пространство — набор векторов, для которых определены операции сложения и умножения на скаляр + 8 аксиом.

Метрическое пространство — множество с метрикой $(X, \rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R})$.

Полное метрическое пространство — метрическое пространство, в котором каждая фундаментальная последовательность $(\{x_n\} : \rho(x_i, x_j) \rightarrow 0)$ сходится к элементу этого же пространства.

Нормированное пространство — векторное пространство с нормой.

Банахово пространство — нормированное векторное пространство $B = (X, \|\cdot\|)$, полное по метрике, порождённой нормой.

Евклидово/Унитарное пространство — векторное пространство над \mathbb{R}/\mathbb{C} с определенным скалярным произведением.

Сепарабельное пространство — пространство (X, T) , в котором есть счетное всюду плотное подпространство $E : Cl(E) = X$.

Гильбертово пространство — унитарное пространство H , полное по метрике, порожденной нормой.

Компактное пространство — топологическое пространство, в любом покрытии которого открытыми множествами найдётся конечное подпокрытие.

Множество **относительно компактно**, если его замыкание компактно.

Пусть X — метрическое пространство, A, B — множества, $\varepsilon > 0$. Тогда A называется **ε -сетью** для B , если $\forall b \in B \exists a \in A : \rho(a, b) < \varepsilon$

Метрическое пространство X **вполне ограничено**, если для каждого $\varepsilon > 0$ в X существует конечная ε -сеть.

Пусть X — полное метрическое пространство, $E \subset X$. Тогда E — вполне ограничено $\Leftrightarrow E$ — относительно компактно.

Линейный оператор — отображение $A : X \rightarrow Y$, такое что $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha A(x_1) + \beta A(x_2)$

Множество значений оператора — $R(A) := \{Ax \mid x \in X\}$

$L(X, Y)$ — нормированное пространство ограниченных линейных операторов из X в Y , где **норма линейного оператора** — это $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$.

Линейный оператор $A : X \rightarrow Y$ в нормированном пространстве называется **ограниченным**, если существует такое число $C > 0$, что $\|Ax\| \leq C\|x\|$

Оператор A^{-1} называется **обратным** к оператору A , если $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, где $I : Ix = x$ — единичный оператор. Если выполняется только соотношение $A^{-1}A = I$ или только $AA^{-1} = I$, то оператор A^{-1} называется **левым обратным** или **правым обратным** соответственно. Если оператор A имеет левый обратный и правый обратный и они равны между собой, то оператор A является **обратимым**.

$X^* := L(X, \mathbb{R}) = \{f : X \xrightarrow[\text{непр}]{\text{лин}} \mathbb{R}\}$ — **сопряженное пространство** к X (над \mathbb{R}). Сопряженное пространство всегда является банаховым пространством.

Равномерная сходимость — $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

Пусть L — линейное пространство. **Собственным вектором** линейного преобразования $A : L \rightarrow L$ называется такой ненулевой вектор $x \in L$, что для некоторого $\lambda \in K$ выполняется равенство $Ax = \lambda x$.

Ортогональный (ортонормированный) базис — ортогональная (ортонормированная) система элементов линейного пространства со скалярным произведением, обладающая свойством полноты.

Лемма Рисса

Пусть Y — нормированное пространство, X — его собственное подпространство ($X \subsetneq Y$). Тогда для любого $0 < \varepsilon < 1$ существует точка $z_\varepsilon : \|z_\varepsilon\| = 1, p(z_\varepsilon, X) \geq 1 - \varepsilon$

Теорема Банаха о гомеоморфизме

Пусть $A : X \rightarrow Y$ — ограниченный линейный оператор, причем осуществляющий биекцию, тогда A^{-1} — ограниченный линейный оператор.

Полунорма — норма, которая может быть равна нулю на ненулевых точках.

Теорема Хана-Банаха и следствия

Пусть X, Y — линейные многообразия над полем \mathbb{R} такие, что $X \subset Y, p(y)$ — полунорма на $Y, f : X \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, $|f(x)| \leq p(x)$ на X . Тогда существует линейный функционал $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$, такой что:

1. $g|_X = f$ (сужение линейного функционала g на X равно f)
2. $|g(y)| \leq p(y)$ на Y

Билеты

- ✓ — готов
- ✗ — не готов
- i — только формулировки
- ♥ — проходили, но в билеты не включено
- 割 — было у прошлых курсов
- 🔄 — требует обновления/проверки

Если не оговорено иного, считаем, что мы находимся в B -пространствах.

✓ 1. Норма сопряженного оператора

Введём на X^* норму как норму линейного функционала: $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$.

Пусть X, Y - нормированные пространства, $A \in L(X, Y)$ - линейный ограниченный оператор: $X \rightarrow Y$, $\varphi \in Y^*$. Рассмотрим $f(x) = \varphi(Ax)$, $|f(x)| \leq \|\varphi\| \|Ax\|$, $f \in X^*$.

Тогда **сопряженный оператор** к A это $A^*(\varphi) := \varphi \circ A$, где $A^* : Y^* \rightarrow X^*$.

Утверждение: Если A непрерывный, то A^* тоже непрерывный.

Теорема: $\|A^*\| = \|A\|$

Доказательство:

- **Жолус:** Теорема 1.2
- **Дина:** 1 стр.

♥ 1.5. Общий вид линейных функционалов в пространстве Гильберта

Теорема (Рисс)

Пусть H – гильбертово пространство. Тогда $\forall f \in H^*$, f можно представить как $f(x) = \langle x, y \rangle$, где $y \in H$ – единственна, $\|f\| = \|y\|$.

Доказательство:

- **Жолус:** Теорема 1.3
- **Дина:** 3 стр.
- **МГУ:** 6 стр.

✓ 2. Ортогональные дополнения X и X^*

Пусть $S \subset X$. **Ортогональное дополнение** в B -пространстве это $S^\perp := \{f \mid f \in X^*, \forall x \in S \Rightarrow f(x) = 0\}$

Пусть $S \subset X^*$. **Ортогональное дополнение** в сопряженном пространстве это $S^\perp := \{x \mid x \in X, \forall f \in S \Rightarrow f(x) = 0\}$

Теорема: $X^\perp = X^{*\perp} = \{0\}$

Доказательство:

- **Жолус:** Утверждение 1.4
- **Дина:** 5 стр.

✓ 3. Ортогональное дополнение $\text{Ker}(A^*)$

Пусть $A \in L(X, Y)$.

$\text{Ker } A = \{x : Ax = 0\}$ – ядро оператора A

$R(A) := \{Ax \mid x \in X\}$ – множество значений оператора A .

Теорема: $\text{Cl } R(A) = (\text{Ker } A^*)^\perp$

Доказательство:

- **Жолус:** Теорема 1.5
- **Дина:** 6 стр.

✔ 4. Ортогональное дополнение $\text{Ker}(A)$

Теорема: $R(A^*) = (\text{Ker } A)^\perp$, если $R(A)$ замкнуто.

Доказательство:

- [Жолус](#): Теорема 1.6
- [Дина](#): 7-8 стр.

✔ 5. Априорная оценка решения $y = Ax$ замкнутость $R(A)$

Пусть $A : X \rightarrow Y$ – линейный оператор и $\exists \alpha = \text{const} : \|x\| \leq \alpha * \|y\|$, где $y = Ax$.

Коэффициент α называется **априорной оценкой** решения операторного уравнения.

Теорема: Если A – линейный оператор, такой что для уравнения $y = Ax$ существует априорная оценка, то $R(A)$ – замкнуто.

Доказательство:

- [Жолус](#): Теорема 1.7
- [Дина](#): 8 стр.

✔ 6. Определение спектра и резольвенты, замкнутость спектра

$I : Ix = x$ — тождественный оператор

Регулярная точка оператора A — это такая $\lambda \in \mathbb{C}$, что оператор $\lambda I - A$ непрерывно обратим (то есть $(\lambda I - A)^{-1}$ непрерывен).

Резольвента — $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda - \text{регулярная точка } A\}$

Резольвентный оператор — $R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1}$

Спектр оператора — $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$

Утверждение: $\rho(A)$ является открытым в \mathbb{C} .

Следствие: $\sigma(A)$ является замкнутым в \mathbb{C} .

Доказательство:

- [Жолус](#): Утверждение 2.1 и Следствие 2.2
- [Викиконспекты](#) (скриншот)
- [Дина](#): 10 стр.

✔ 7. Спектральный радиус и его вычисление

Спектральный радиус: $r_\sigma(A) := \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$

Эквивалентное определение: $r_\sigma(A) := \inf_{n \in \mathbb{N}} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Теорема: $r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)
- [Жолус](#): Утверждение 2.4
- [Дина](#): 11-12 стр.
- [Рома](#): 5-7 стр.

- [Аня](#): 9-11 стр.

✔ 8. Оценка протяженности спектра через спектральный радиус

Утверждение: $\sigma(A) \subset \{\lambda : |\lambda| \leq r_\sigma(A)\}$

Доказательство:

- [Жолус](#): Теорема 2.5
- [Викиконспекты](#) (скриншот)

✔ 9. Аналитичность резольвенты

Тождество Гильберта (+ [доказательство](#)): $R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\lambda - \mu) * R_\lambda(A) * R_\mu(A)$

Утверждение: $R_\lambda(A)$, как функция из комплексного числа в ограниченный оператор, аналитична в $\rho(A)$ и в бесконечно удаленной точке комплексной плоскости.

Доказательство:

Примечание: в доказательстве рассматривается **аналитичность по Вейерштрассу** (в окрестности точки λ функция раскладывается в степенной ряд).

- [Викиконспекты](#) (скриншот)
- [Аня](#): 9-10 стр.

✔ 10. Непустота спектра ограниченного линейного оператора

Теорема: Если оператор A ограничен, то $\sigma(A) \neq \emptyset$.

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)
- [Дина](#): 11 стр. (нет доказательства)

✔ 11. Теорема об отображении спектра полиномом

Лемма: $P(A)$ - непрерывно обратим $\Leftrightarrow 0 \notin P(\sigma(A))$

Теорема: $P(\sigma(A)) = \sigma(P(A))$ для произвольного полинома P .

Примечание: под действием полинома на множество понимается поточечное применение:

$$P(S) = \{P(x) \mid x \in S\}$$

Доказательство:

- [Додонов](#): 1-2 стр.
- [Жолус](#): Теорема 2.6
- [Дина](#): 13 стр.

✔ 12. Элементарные свойства линейных компактных операторов (произведение ограниченного и компактного операторов, равномерный предел последовательности компактных операторов)

Оператор $A : X \rightarrow Y$ называется **компактным** (или вполне непрерывным), если он каждое ограниченное множество переводит в относительно компактное (т.е. $\forall M$ – ограниченного множества, $Cl A(M)$ – компактно).

Утверждение: Пусть A – компактный оператор, B – ограниченный оператор. Тогда AB и BA – компактные операторы.

Доказательство:

- [Додонов](#): 3-4 стр.

- Жолус: Утверждение 2.8
- Дина: 16 стр.
- Рома: 7-8 стр.
- Аня: 16-17 стр.

Утверждение: A_n – компактные, $A_n \xrightarrow{\text{равн}} A$ в $L(X, Y) \Rightarrow A$ – компактный.

Доказательство:

- Додонов: 3-4 стр.

✓ 13. Компактность оператора, сопряженного с компактным оператором

Утверждение: A – компактный, тогда A^* – тоже компактный.

Доказательство:

- Викиконспекты (скриншот)
- Рома: 9 стр.
- Аня: 27 стр.

✓ 14. Базис Шаудера, координатное пространство

X - бесконечномерное B -пространство, $e_1, e_2 \dots e_n, \dots$ - линейно-независимые точки, такие, что любой $x \in X$ единственным образом представим в виде $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i$, тогда $\{e_i\}$ — базис Шаудера.

Следует помнить, что не у любого B -пространства есть базис, но большинство типов пространств, например, $C[a, b]$, его имеет.

Определим F , как $\{\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_n \dots) \mid \exists x \in X : \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i \rightarrow x\}$ — это линейное пространство.

Так как ряд сходится, можно определить координатное пространство F , состоящее из числовых последовательностей $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_n \dots)$, определив норму как $\|\alpha\| = \sup_n \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|$.

Теорема: Координатное пространство F — банахово.

Доказательство:

- Додонов: 5-6 стр.
- Викиконспекты (не полное)
- Дина: 16-17 стр.
- Аня: 18 стр.

✓ 15. Почти конечномерность компактного оператора в пространстве с базисом Шаудера

Оператор A конечномерный, если $R(A)$ лежит в конечномерном пространстве.

Пусть X банахово и имеет базис Шаудера, $A : X \rightarrow X$ компактный, тогда в X существует последовательность конечномерных операторов B_n таких, что $\|B_n - A\| \rightarrow 0$

Доказательство:

- Додонов: 7-8 стр.
- Викиконспекты
- Дина: 17 стр.

✔ 16. Размерность $\text{Ker}(I - A)$ где A – компактный оператор

Теорема: A – компактный, $T = I - A$. Тогда $\dim(\text{Ker } T) < +\infty$

Доказательство:

- [Жолус](#): Утверждение 2.12

Примечание: последний переход в доказательстве осуществляется за счет применения леммы Рисса, что если X – бесконечномерное НП, то любой шар в нем – не компакт.

✔ 17. Замкнутость $R(I - A)$ где A – компактный оператор

Теорема: A – компактный, $T = I - A$, тогда $R(T)$ замкнуто, т.е. $\text{Cl } R(T) = R(T)$.

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)
- [Жолус](#): Теорема 2.13 (не дописанное доказательство)

✔ 18. Существование N , начиная с которого $\text{Ker}(I - A)^n = \text{Ker}(I - A)^{n+1}$ где A – компактный оператор

Утверждение: Пусть $M_n = \text{Ker}((I - A)^n)$, $n \in \mathbb{N}$, A – компактный оператор. Тогда $\exists n_0 : M_{n_0} = M_{n_0+1}$.

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

✔ 19. Критерий равенства $R(I - A) = X$ где A – компактный оператор

Утверждение: Пусть A – компактный оператор на банаховом X , $T = I - A$. Тогда $R(T) = X \Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0\}$.

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

Примечание: предыдущее утверждение из доказательства – это утверждение из 18 билета.

✔ 20. Альтернатива Фредгольма-Шаудера

Теорема: Пусть $A : X \rightarrow X$ – компактный оператор и $T = \lambda I - A$. Тогда возможно только две ситуации:

1. $\text{Ker } T = \{0\}$, тогда $y = Tx$ разрешимо для любого y
2. $\text{Ker } T \neq \{0\}$, тогда $y = Tx$ разрешимо только для $y \in (\text{Ker } T^*)^\perp$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

Примечание: первая теорема из параграфа в доказательстве это теорема из 17 билета. Общие теоремы о сопряженном операторе это 3 и 4 билета.

✔ 21. Теорема о спектре компактного оператора

Теорема: A – компактный, тогда $\sigma(A)$ не более чем счётен и его предельной точкой может быть только 0.

Доказательство:

- [Жолус](#): Теорема 2.14
- [Викиконспекты](#)

✔ 22. Вещественность спектра самосопряженного оператора

Оператор A в H называется самосопряжённым ($A = A^*$), если $\forall x, y : \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$.

Теорема: Спектр самосопряженного оператора в H – вещественный.

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

✔ 23. Критерий включения в резольвенту самосопряженного оператора

Теорема: Пусть $A = A^*$ – самосопряжённый оператор. Тогда:

$$\lambda \in \rho(A) \Leftrightarrow \exists m > 0 : \forall x \in H : \|(\lambda I - A)x\| \geq m\|x\|$$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

✔ 24. Критерий включения в спектр самосопряженного оператора

Теорема: Пусть A — самосопряжённый оператор. Тогда: $\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \exists x_n : \|x_n\| = 1, \|(\lambda I - A)x_n\| \rightarrow 0$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

✔ 25. Оценка протяженности спектра самосопряженного оператора через его границы m_- и m_+

$$m^+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle - \text{верхняя граница}$$

$$m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle - \text{нижняя граница}$$

Теорема: Для самосопряженного оператора A верно, что:

1. $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$
2. $m_-, m_+ \in \sigma(A)$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

Примечание: критерий принадлежности спектру берется из 24 билета.

✔ 26. Теорема о спектральном радиусе самосопряженного оператора

Теорема: $r_\sigma(A) = \max\{|m_-|, |m_+|\}$ и $r_\sigma(A) = \|A\|$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#) (скриншот)

Примечание: первое равенство – тривиальное следствие билета 25 и $r_\sigma(A) := \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$

✔ 27. Теорема Гильберта-Шмидта о базисе из собственных векторов компактного самосопряженного оператора

Теорема: Пусть H – сепарабельное ГП, A – самосопряженный компактный оператор $H \rightarrow H$. Тогда из собственных векторов этого оператора можно построить ортонормированный базис.

Доказательство:

- [Жолус](#): Теорема 3.10
- [Викиконспекты](#)

✓ 28. Следствие теоремы Гильберта-Шмидта о разложении компактного самосопряженного оператора и его резольвенты

Следствие: Пусть A - самосопряженный компактный оператор, тогда (из теоремы) для любого $x \in H$ можно построить:

$$Ax = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \text{ а значит}$$

$$R_{\lambda}(A)(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle y, e_n \rangle / (\lambda - \lambda_n) e_n, \text{ где } e_1, e_2, \dots \text{ — собственные вектора.}$$

Доказательство:

- [Викиконспекты](#)

❗ 29. Теорема о положительности произведения положительных самосопряженных операторов

Пусть A - самосопряженный оператор.

$$A \geq 0 \Leftrightarrow \forall x \in H : \langle Ax, x \rangle \geq 0$$

$$B \geq A \Leftrightarrow B - A \geq 0 \text{ (частичный порядок)}$$

$$\text{Пример: } A^2 \geq 0, \text{ т.к. } \langle A^2 x, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle = \|Ax\|^2 \geq 0$$

По теореме о спектральном радиусе самосопряженного оператора получаем $0 \leq A \leq B \Rightarrow \|A\| \leq \|B\|$

Пусть $A, B \geq 0$ – самосопряженные, $AB = BA$. Тогда $AB \geq 0$.

Схема доказательства: Додонов

❗ 30. Существование сильного предела у монотонной, ограниченной последовательности самосопряженных операторов

Пусть $\exists M = \text{const} : A_n \leq A_{n+1} \leq M$. Тогда существует самосопряженный A такой, что:

1. $\forall x \in H \Rightarrow Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x$
2. $A_n B = B A_n \Rightarrow AB = BA$

Схема доказательства: Додонов

❗ 31. Проекторы в гильбертовом пространстве – критерий

По основной теореме гильбертовых пространств, если H_1 – подпространство H , то $H = H_1 \oplus H_1^{\perp}$. Значит любой $x \in H$ представим в виде $x = x_1 + x_1^{\perp}$, где $x_1 \in H_1$ – единственный. Тогда $P_{H_1}(x) = P(x) = x_1$ — проектор H на H_1 .

Теорема: Пусть $P : H \rightarrow H$ – ограниченный линейный оператор.

P – проектор на $H \Leftrightarrow P$ – самосопряженный и $P^2 = P$.

Схема доказательства: Додонов

❗ 32. Критерий разложения проектора в сумму проекторов

Проекторы P_1 и P_2 ортогональны ($P_1 \perp P_2$), если $P_1 \circ P_2 = 0$.

Утверждение: Пусть P_1, P_2 - проекторы. Тогда $P_1 + P_2$ - тоже проектор, если $P_1 \perp P_2$.

❶ 33. Критерий положительности разности двух проекторов

$$P_2 \geq P_1 \Leftrightarrow P_2 - P_1 \geq 0$$

Утверждение: Пусть P_1, P_2 - проекторы на H_1, H_2 . Тогда $P_1 \leq P_2 \Leftrightarrow P_2 \circ P_1 = P_1 \Leftrightarrow H_1 \subset H_2$

❶ 34. Положительность $p(L)$ где p – положительный полином на $[m_-, m^+]$

Лемма: Пусть L – ограниченный самосопряженный оператор, $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$ – полином с вещественными коэффициентами. Если $p(t) \geq 0$ при $t \in [m_-, m^+]$, то $p(L) \geq 0$.

❶ 35. Определение и существование $f(L)$ для непрерывной на $[m_-, m^+]$ функции f

Пусть A – самосопряженный ограниченный оператор, m_-, m^+ – его границы, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывна на $[m_-, m^+]$. По теореме Вейерштрасса существует последовательность полиномов $p_n: p_n \xrightarrow{\text{равн}} f$, которые аппроксимируют f .

Определим $f(L)$ как предел последовательности операторов: $f(L) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(L)$.

Теорема: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(L)$ всегда существует.

❷❶ 36. Свойства $f \rightarrow f(L)$ (сохранение знака, нормы и арифметика)

1. $\forall x \in [m_-, m^+] f(x) \geq 0 \Rightarrow f(L) \geq 0$ (сохранение знака)
2. $(f + g)(L) = f(L) + g(L)$
3. $(f \cdot g)(L) = f(L)g(L)$
4. $\|f(L)\| \leq \sup_{\lambda \in [m_-, m^+]} |f(\lambda)|$ (сохранение нормы)

❷❶ 37. Определение и существование $f(L)$ для полунепрерывной сверху функции

Пусть L – самосопряженный ограниченный оператор. f называется **полунепрерывной сверху** в точке x_0 , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \forall x: |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < f(x_0) + \varepsilon$

Из матана известно, что любая полунепрерывная сверху функция f является поточечным пределом убывающей последовательности непрерывных функций f_n .

Определим $f(L)$ как поточечный предел: $f(L)x = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(L)x$

Теорема: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(L)x$ всегда существует.

❷❶ 38. Определение спектральной функции самосопряженного оператора и ее основные свойства (сильная непрерывность справа, коммутруемость, монотонность)

Пусть A – самосопряженный ограниченный оператор. Введём функции $P_\lambda(t)$:

$$P_\lambda(t) = \begin{cases} 1, & t \leq \lambda \\ 0, & t > \lambda \end{cases}$$

Они являются полунепрерывными, поэтому их можно применить к оператору A . Можно показать, что получившиеся операторы будут проекторами.

Множество операторов $\{P_\lambda(A) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ назовём **спектральным семейством** оператора A . Функцию, сопоставляющую λ оператор $P_\lambda(A)$, назовём **спектральной функцией** оператора A .

Эта функция обладает следующими свойствами:

1. $\lambda_1 \leq \lambda_2 \Rightarrow P_{\lambda_1} \leq P_{\lambda_2}$ (монотонность)

2. $\forall x P_\lambda x \xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_0 + 0} P_{\lambda_0} x$ (непрерывна справа)
3. $\lambda < m_- \Rightarrow P_\lambda = 0$
 $\lambda \geq m^+ \Rightarrow P_\lambda = I$
4. Проекторы $P_\lambda(A)$ коммутируют друг с другом и с любым B , который коммутирует с A .

39. Разложение самосопряженного оператора посредством спектральной функции

Пусть A – ограниченный самосопряженный оператор и $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $[m_-, m^+]$. Тогда $f(A, ?) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) dP_\lambda$ (???), интеграл в смысле Римана-Стилтьеса, $f(A, ?): H \rightarrow H$

40. Теорема о спектральном исчислении

Используя определение $f(L)$ для непрерывных функций f и тот простой факт, что при $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \lambda_4$ будет $P_{\lambda_2} - P_{\lambda_1} \perp P_{\lambda_4} - P_{\lambda_3}$, легко получаем следующую теорему.

Теорема: Пусть L – самосопряженный оператор, P_λ – его спектральная функция, f – (???). Тогда:

1. $f(A) = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) dP_\lambda$
2. $f(A)x = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) dP_\lambda(x)$
3. $\langle f(L)x, y \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) d\langle P_\lambda x, y \rangle$

Билеты ниже – то, что было у предыдущих курсов

XX. Локальная сходимость метода последовательных приближений

Пусть V – замкнутый шар в B -пространстве, x^* из V , $x^* = T(x^*)$, $T'(x^*) = 0$, где T' – производная Фрише, тогда метод простых итераций, $x_{n+1} = T(x_n)$ сходится к x^* .

XX. Локальная сходимость метода Ньютона

Пусть $X^*: F(X^*) = 0$, и в некотором шаре с центром в X^* это отоб. непрер. дифф-тся. Тогда в $x_0 \approx x^*$: $x_{n+1} = x_n - F(x_n)/F'(x_n)$ - метод Ньютона будет сх. к x^* . x_0 должна быть в окрестности.

XX. Равномерный предел последовательности непрерывных, компактных операторов

$T_n \rightarrow$ (равномерно) T на G , $T_n(G)$ - относит. компакт. $\Rightarrow T(G)$ - относит. компакт.

XX. Проекторы Шаудера

Пусть дано некоторое множество M из B -пространства. M – замкнуто, выпукло и ограничено.

Пусть $T: M \rightarrow M$ – компактный оператор (вполне непрерывный), $\text{Convex}(T(M))$ тоже относительно компактен. Возьмём ϵ -конечную сеть для $\text{Convex}(T(M))$, состоящую из y_j , где $j = 1 \dots p$.

ϵ -проектор Шаудера: $P_\epsilon(y) = \sum_{j=1}^p \gamma_j(y) y_j$, где

$\gamma_j(y) = \epsilon - \|y - y_j\|$, if $\|y - y_j\| < \epsilon$, 0 otherwise

$\gamma_j = \alpha_j / (\sum \alpha_k)$

XX. Теорема Шаудера о неподвижной точке

Пусть D - огр. замк., выпуклое множество, T - непрер. комп. оператор заданный на D и непереводящий его в себя. Тогда у T на D сущ. хотя бы одна неподвижная точка.

