

ЭКСФОЛИАНТЫ

YM PROSKIN · Эксфолианты

Терапевтический профиль гидроксикислот в клинической
практике

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Применение кислот в дерматокосметологии

ЭКСФОЛИАНТЫ

Клиническое применение кислот

Механизмы эксфолиации, терапия акне и коррекция фотостарения

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Действие Салициловой Кислоты

Десмолитический и комедолитический эффекты салициловой кислоты

- Действует как десмолитик, ослабляя сцепление корнеоцитов в роговом слое.
- Растворяет себум и очищает устья фолликулов благодаря липофильности.
- Эффективно предупреждает образование закрытых и открытых комедонов.

Липофильная ВНА-эксфолиация и комедолиз

Терапия Акне и Постакне

Применение моно- и комбинированных пилингов в лечении акне

Комбинация АНА + ВНА

Совместное использование гликолевой и салициловой кислот улучшает состояние кожи при легком и среднем акне.

Салицилово-миндальный пилинг

Комбинация кислот (включая 20% салициловой и 10% миндальной) эффективна против воспалений и постакне.

Миндальный пилинг 45%

45% миндальная кислота эквивалентна по результату 30% салициловой, но имеет более высокий профиль безопасности.

Коррекция Фотостарения

Влияние гидроксикислот на структуру и плотность зрелой кожи

- 30% салициловая кислота разглаживает мелкие морщины и устраняет шероховатость фотоповрежденной кожи.
- Пилинги с гликолевой кислотой клинически эффективны при легком фотостарении лица.
- Топические АНА увеличивают толщину кожи, восстанавливая эластические волокна и плотность коллагена.

Динамика изменения толщины дермы после АНА-терапии

Меры Предосторожности

Правила безопасности при проведении химических пилингов



Меры предосторожности: Беременность, Лактация и Фотозащита

Клинические пилинги (салициловый 30%, гликолевый) требуют строгого SPF-сопровождения из-за риска фотосенсибилизации. Проведение высококонцентрированных процедур противопоказано при беременности и лактации.

Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению гидроксикислот

- Салициловая кислота — золотой стандарт комедолиза и эксфолиации за счет десмолитического действия.
- АНА и ВНА пилинги высокой концентрации эффективно корректируют фотостарение и акне легкой/средней степени.
- Применение 45% миндальной кислоты дает терапевтический эффект, равный 30% салициловой кислоте, но с меньшим раздражением.