

НИАЦИНАМИД

YM PROSKIN · Ниацинамид

Многофункциональное терапевтическое действие в
дерматокосметологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

[Placeholder] Применение Ниацинамида в дерматологии

НИАЦИНАМИД

Терапевтический профиль

От восстановления барьера до коррекции акне и пигментации


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Восстановление барьерной функции

Стимуляция синтеза липидов рогового слоя и гидратация кожи

- Активирует синтез керамидов, укрепляя защитный липидный барьер кожи.
- Значительно снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL).
- Повышает влагоудерживающие свойства рогового слоя эпидермиса.


Ниацинамид: Синтез керамидов и барьер кожи



Терапия акне и себорегуляция

Клиническое применение при воспалительных поражениях кожи

- Сокращает количество воспалительных поражений при акне средней тяжести.
- Нормализует выработку кожного сала и снижает выраженность пор.
- Обеспечивает высокий терапевтический ответ без развития резистентности.




Коррекция гиперпигментации

Механизмы осветления кожи и клиническая эффективность при мелазме

- Подавляет перенос меланосом из меланоцитов в кератиноциты на клеточном уровне.
- Концентрации от 2% до 5% достоверно снижают выраженность гиперпигментации.
- Ниацинамид 4% сопоставим по действию с 4% гидрохиноном при лучшей переносимости.

Подавление переноса меланосом в кератиноциты




Коррекция возрастных изменений

Многофакторное омолаживающее действие топического 5% ниацинамида

- Сокращает количество мелких морщин и глубину выраженных складок лица.
- Снижает эритему, желтизну и выраженность пигментных пятен возрастной кожи.
- Существенно улучшает общую текстуру и эластичность кожного покрова.

СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА & ТУРНОВЕР

Дифференцировка кератиноцитов и обновление слоев кожи



▲ **Слушивание / Desquamation**
Обновление эпидермиса

Цикл ~26-28 дней

Миграция & Кератинизация
Накопление кератина

Деление базальных клеток
Постоянный митоз

Клиническая Переносимость

Мягкий терапевтический профиль и применение при чувствительности кожи



Применение при повышенной чувствительности кожи

Ниацинамид демонстрирует высокую клиническую переносимость. Улучшает барьерную функцию рогового слоя и обеспечивает терапевтический эффект у пациентов с розацеа.

Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению ниацинамида

- Ниацинамид восстанавливает кожный барьер через индукцию синтеза церамидов и снижение TEWL.
- Эффективен в лечении акне средней тяжести, мелазмы и признаков хроностарения лица.
- Демонстрирует высокую клиническую переносимость и терапевтическую мягкость при розацеа.