

ВИТАМИН С

УМ PROSKIN · Витамин С

Клиническая эффективность L-аскорбиновой кислоты и её
стабильных дериватов

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

[Placeholder] Применение Витамина С в дерматологии

ВИТАМИН С

Терапевтические механизмы


Стимуляция коллагена и фотозащита на клеточном уровне

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Синтез коллагена и фотозащита

Влияние топической L-аскорбиновой кислоты на дермальный матрикс

- Активирует синтез коллагена I и III типов путем увеличения уровней мРНК in vivo.
- Защищает клетки кожи от индуцированного ультрафиолетом фотоповреждения.
- Стимулирует неоколлагенез и улучшает структурное состояние дермы.




Параметры абсорбции

Влияние уровня pH и концентрации на чрескожное проникновение

- Для проникновения через роговой слой уровень pH формулы должен быть строго ниже 3.5.
- Максимальная эффективная концентрация для чрескожного всасывания составляет 20%.
- Дальнейшее увеличение концентрации не повышает абсорбцию, но увеличивает риск раздражения.

Чрескожное всасывание L-аскорбиновой кислоты




Источник: Pinnell et al., 2001 (PMID 11207686) — макс. абсорбция при 20%, снижается выше

Терапия акне: Аскорбилфосфат Натрия

Стабильный дериват витамина С (SAP) в лечении акне средней тяжести

- Топический 5% лосьон SAP демонстрирует высокую клиническую эффективность при акне.
- SAP стабилен при нейтральном значении pH и минимизирует раздражение кожи.
- Обладает сильным антиоксидантным и себорегулирующим потенциалом.



Местная Переносимость

Особенности влияния уровня pH формулы на чувствительность кожи



Местное раздражение и водородный показатель (pH)

Формулы L-аскорбиновой кислоты с низким pH (менее 3.5) могут вызывать локальное покалывание. Дериват аскорбилфосфат натрия (5% SAP) наносится при нейтральном pH и имеет комфортный профиль.

Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению витамина С

- L-аскорбиновая кислота — золотой стандарт для фотозащиты и активации синтеза коллагена I и III типов.
- Трансдермальный перенос L-аскорбиновой кислоты требует $\text{pH} < 3.5$ и ограничен концентрацией в 20%.
- Аскорбилфосфат Натрия (5% SAP) является стабильным и эффективным средством в терапии акне.