

РЕТИНОИДЫ

YM PROSKIN · Ретиноиды v2

Терапевтический профиль, механизмы действия и клинические протоколы

[Placeholder] Ретиноиды в дерматологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЧАСТЬ 1

Механизмы и Кинетика


Клеточные рецепторы и пути метаболической конверсии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ядерные Рецепторы

Основной путь транскрипции генов

- Ретиноиды регулируют генную транскрипцию путем связывания с ядерными рецепторами RAR и RXR.



Путь Метаболической Конверсии

Каскад окисления ретиноидов в кератиноцитах

1

Ретилпальмитат

Слабый эфир, требует 3 шага конверсии до ретиноевой кислоты.

2

Ретинол

Стимулирует коллаген, требует 2 шага метаболического превращения.

3

Ретинальдегид

Высокоактивный ретиналь, требует всего 1 шаг конверсии.

4


Ретиноевая кислота

Активный третиноин, связывается напрямую с рецепторами.

Терапия Третиноином

Клинические эффекты золотого стандарта коррекции

- Третиноин связывается напрямую с рецепторами *rars* без метаболической конверсии.
- Является золотым стандартом для клинического улучшения фотоповрежденной кожи.
- Нормализует дифференцировку кератиноцитов для предотвращения окклюзии фолликулов.



Сравнение Селективных Форм

Адапален против Тазаротена

Адапален

Селективно связывается с rar-beta и rar-gamma рецепторами, снижает риск раздражений.

Тазаротен

Связывается с rar-beta и rar-gamma, крем 0.1% клинически эффективен при фотоповреждении.

Безрецептурные Формы

Биологическая активность ретинола, ретиналя и эфиров

Ретинальдегид

Улучшает гидратацию и эластичность кожи, требует одного метаболического шага.

Ретинол

Стимулирует синтез коллагена и ингибирует матриксные металлопротеиназы.

Ретилпальмитат

Мягкая нано-форма, снижает воспалительные и невоспалительные акне-поражения.

Клинические Метрики

Параметры эффективности ретиноидов третьего поколения

0.1%

Тазаротен

Концентрация крема, доказавшая эффективность при глубоких морщинах.

1 шаг

Ретинальдегид

Конверсия до активной кислоты, минимизирует раздражения.

12 фкт

Проверенная база

Клинически подтвержденных фактов в нашем графе ретиноидов.

Противопоказания и Ограничения

Меры предосторожности в клинической практике



Абсолютное противопоказание: Беременность и лактация

Топические ретиноиды противопоказаны к применению в период беременности и лактации из-за потенциальных рисков системной тератогенности.

Терапевтические Выводы

Сводное резюме клинических рекомендаций по ретиноидам

- Назначение конкретного ретиноида определяется целями терапии и чувствительностью кожи.
- Селективные агонисты (адапален, тазаротен) предпочтительны при целевой монотерапии.
- Необходимо строго контролировать применение и исключать пациентов в группе риска.