



SKIN EDUCATION
& CARE

Ретиноиды

Класс, механизм и выбор · для специалистов

ОБЛОЖКА

Карта класса: какие бывают ретиноиды

Какие бывают ретиноиды



Третиноин

Активная кислота — прямое действие на рецептор



Ретинол / ретинальдегид

Пердретиноиды — нужна конверсия в кислоту



Адапален

Синтетический, рецептор-селективный



Тазаротен

Синтетический, высокая активность

Четыре оси оценки ретиноида



Эффективность

Сила клинического эффекта по задаче



Раздражение

Переносимость, риск ретиноидного дерматита



Стабильность

Чувствительность к свету/окислению



Доказательность

Уровень данных (A/B/C)

Часть 1. Механизм



Часть 1

Механизм

Рецепторы, конверсия, эффект в дерме

Рецепторный механизм: RAR / RXR

СХЕМА: РЕТИНОИД → RAR/RXR → ТРАНСКРИПЦИЯ



Ретиноиды регулируют транскрипцию генов через ядерные рецепторы RAR и RXR С обзор / огранич. данные



Через рецептор меняется дифференцировка кератиноцитов



Эффект зависит от того, доходит ли молекула до кислоты

Метаболическая конверсия пердretiноидов

ШКАЛА: РЕТИНОЛ → РЕТИНАЛЬДЕГИД → КИСЛОТА



Пердretiноид (ретинол)

Ретинальдегид: всего один шаг
конверсии до активной кислоты в
кератиноцитах с обзор / огранич. данные



Ретиновая кислота (активна)

Ретиноиды повышают синтез
проколлагена → формирование
коллагена в дерме с обзор / огранич.
данные



Часть 2

Сравнение активов

Рецепторный профиль и сила эффекта

Матрица: активы × свойства

Активы × свойства

Актив → рецептор / эффект (с уровнем доказательности)

Тазаротен селективно связывает рецепторы RAR-β и RAR-γ **C** обзор / огранич. данные

Адапален селективно связывает рецепторы RAR-β и RAR-γ **C** обзор / огранич. данные

Тазаротен 0.1% эффективен при фотоповреждении: морщины, гиперпигментация **A** РКИ / мета-анализ



Третиноин · адапален · тазаротен

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ РЕТИНОИДОВ

Профиль каждого актива:

Третиноин — золотой стандарт улучшения фотостарения кожи **C**
обзор / огранич. данные

Адапален — рецептор-селективный (RAR-β/γ) **C** *обзор / огранич. данные*

Тазаротен 0.1% — эффект при фотоповреждении **A** *РКИ / мета-анализ*

Маркер уровня — у каждого пункта

Эффективность: данные

Эффективность: что показывают данные



Клинические результаты:

Тазаротен 0.1% эффективен при фотоповреждении (морщины, пигментация) **A** РКИ / мета-анализ

Адапален 0.3%+БПО снижает число атрофических рубцов при раннем лечении **A** РКИ / мета-анализ

Маркер уровня доказательности — у каждого пункта



Часть 3

Решения и применение

Выбор по задаче, переносимость, безопасность

Выбор ретиноида по задаче

Задача определяет молекулу и силу

🌞 Фотостарение →

Третиноин — золотой стандарт при фотостарении **C** обзор
/ огранич. данные

Тазаротен 0.1% — при морщинах и пигментации **A** РКИ /
мета-анализ

🩺 Акне / рубцы →

Адапален — рецептор-селективный, базовый при акне **C**
обзор / огранич. данные

Адапален+БПО — раннее лечение снижает рубцы **A** РКИ /
мета-анализ

👤 Переносимость →

Старт с пердретиноидов/низких концентраций, титрование
частоты

Раздражение и адаптация

ФОТО: РЕАКЦИЯ КОЖИ / ТИТРОВАНИЕ

Тактика переносимости (организующая рамка, без претензии на клиническое доказательство):

Старт 2–3×/неделю, наращивание по переносимости

Буфер увлажняющим, избегать одновременных раздражающих кислот

Обязательный SPF — ретиноид повышает фоточувствительность

Противопоказания: категории



Беременность / лактация

Топические ретиноиды
противопоказаны при беременности
(тератогенный риск) **В**

контролируемое исслед.



Барьерные нарушения

Активный дерматит, поврежденный
барьер — отложить



Инсоляция / процедуры

Период активного солнца, сразу
после агрессивных процедур



Совместимость

Осторожно с другими
раздражающими активными

Сводка доказательной базы ретиноидов

Распределение уровней по графу ретиноидов:

-  А (РКИ/др. сильные): тазаротен при фотоповреждении; адапален+БПО против рубцов
-  В (контролируемое): противопоказание при беременности
-  С (обзоры/механизм): RAR/RXR, конверсия, «золотой стандарт» — как механизм/обзор, не как РКИ-превосходство

Честная подача: механизм и «золотой стандарт» — С-уровень, не доказательство превосходства

Итоговая карта решений

Итоговая карта решений

 Механизм → эффект через RAR/RXR; пердретинаоидам нужна конверсия

 Выбор → фотостарение: третиноин/тазаротен; акне/рубцы: адапален(+БПО)

 Безопасность → титрование, SPF, противопоказание при беременности

