

РЕТИНОИДЫ

УМ PROSKIN · Ретиноиды

Терапевтический профиль, механизмы действия и клинические протоколы

[Placeholder] Ретиноиды в дерматологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Механизм действия на клеточном уровне

Связывание с ядерными рецепторами и влияние на синтез коллагена

- Связывание с RAR и RXR: Регулируют экспрессию ключевых генов кожи (Fact 0001)
- Стимуляция синтеза проколлагена I и III типов (Fact 0004)
- Подавление металлопротеиназ для защиты дермального матрикса от разрушения (Fact 0004)

[Placeholder] Связывание с RAR/RXR рецепторами

Ключевые топические активы

Сравнение трех ключевых поколений топических ретиноидов

Ретинол

Требуется двухступенчатого окисления до ретиноевой кислоты. Обладает мягким действием.

Третиноин

Является чистой ретиноевой кислотой. Золотой стандарт с высокой активностью (Fact 0005).

Адапален

Синтетический ретиноид третьего поколения. Избирателен к RAR-beta/gamma рецепторам (Fact 0007).

Клиническая эффективность при акне и фотостарении

Доказанные результаты клинических исследований

- Золотой стандарт лечения фотоповреждения кожи (tretinoin - Fact 0005)
- Нормализация кератинизации фолликулов для терапии акне (tretinoin - Fact 0006)
- Высокая эффективность тазаротена 0.1% при выраженном фотоповреждении кожи (tazarotene - Fact 0010)

[Placeholder] Результаты гистологического
улучшения

Абсолютное противопоказание

Безопасность пациента в период беременности и лактации



Внимание

Тератогенный риск: Использование топических ретиноидов требует немедленной отмены при планировании беременности.

Резюме по применению ретиноидов

Основные выводы терапевтического профиля

- Ретиноиды регулируют транскрипцию через RAR/RXR ядерные рецепторы
- Третиноин — золотой стандарт терапии фотостарения и акне
- Адапален и Тазаротен демонстрируют селективное связывание и лучшую стабильность
- Беременность и лактация являются жесткими противопоказаниями к терапии