

НИАЦИНАМИД

YM PROSKIN · Ниацинамид

Многофункциональное терапевтическое действие в
дерматокосметологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

[Placeholder] Применение Ниацинамида в дерматологии

НИАЦИНАМИД

Терапевтический профиль


От восстановления барьера до коррекции акне и пигментации

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Восстановление барьерной функции

Стимуляция синтеза липидов рогового слоя и гидратация кожи

- Активирует синтез церамидов, укрепляя защитный липидный барьер кожи.
- Значительно снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL).
- Повышает влагоудерживающие свойства рогового слоя эпидермиса.



Терапия акне и себорегуляция

Клиническое применение при воспалительных поражениях кожи

- Сокращает количество воспалительных поражений при акне средней тяжести.
- Нормализует выработку кожного сала и снижает выраженность пор.
- Обеспечивает высокий терапевтический ответ без развития резистентности.

[Placeholder] Динамика снижения воспалительных элементов

Коррекция гиперпигментации

Механизмы осветления кожи и клиническая эффективность при мелазме

Блокада транспорта

Подавляет перенос меланосом из меланоцитов в кератиноциты на клеточном уровне.

Осветление кожи

Концентрации от 2% до 5% достоверно снижают выраженность гиперпигментации.

Терапия мелазмы

Ниацинамид 4% сопоставим по действию с 4% гидрохиноном при лучшей переносимости.

Коррекция возрастных изменений

Многофакторное омолаживающее действие топического 5% ниацинамида

- Сокращает количество мелких морщин и глубину выраженных складок лица.
- Снижает эритему, желтизну и выраженность пигментных пятен возрастной кожи.
- Существенно улучшает общую текстуру и эластичность кожного покрова.

[Placeholder] Гистологическая картина омоложения
кожи

Клиническая Переносимость

Мягкий терапевтический профиль и применение при чувствительности кожи



Применение при повышенной чувствительности кожи

Ниацинамид демонстрирует высокую клиническую переносимость. Улучшает барьерную функцию рогового слоя и обеспечивает терапевтический эффект у пациентов с розацеа.

Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению ниацинамида

- Ниацинамид восстанавливает кожный барьер через индукцию синтеза церамидов и снижение TEWL.
- Эффективен в лечении акне средней тяжести, мелазмы и признаков хроностарения лица.
- Демонстрирует высокую клиническую переносимость и терапевтическую мягкость при розацеа.