

РЕТИНОИДЫ

# YM PROSKIN · Ретиноиды v2

Терапевтический профиль, механизмы действия и клинические протоколы

[Placeholder] Ретиноиды в дерматологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЧАСТЬ 1

# Механизмы и Кинетика

Клеточные рецепторы и пути метаболической конверсии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ


# Ядерные Рецепторы

## Основной путь транскрипции генов

- Ретиноиды регулируют генную транскрипцию путем связывания с ядерными рецепторами RAR и RXR.

### МЕХАНИЗМ RAR / RXR RECEPTORS

Связывание ретиноевой кислоты (RA) с рецепторами ядер



# Путь Метаболической Конверсии

Каскад окисления ретиноидов в кератиноцитах

1

## Ретилпальмитат

Слабый эфир, требует 3 шага конверсии до ретиноевой кислоты.

2

## Ретинол

Стимулирует коллаген, требует 2 шага метаболического превращения.

3

## Ретинальдегид

Высокоактивный ретиналь, требует всего 1 шаг конверсии.

4

## Ретиноевая кислота

Активный третиноин, связывается напрямую с рецепторами.


# Терапия Третиноином

## Клинические эффекты золотого стандарта коррекции

- Третиноин связывается напрямую с рецепторами *rars* без метаболической конверсии.
- Является золотым стандартом для клинического улучшения фотоповрежденной кожи.
- Нормализует дифференцировку кератиноцитов для предотвращения окклюзии фолликулов.

### СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА & ТУРНОВЕР

Дифференцировка кератиноцитов и обновление слоев кожи



# Сравнение Селективных Форм

Адапален против Тазаротена

## Адапален

Селективно связывается с rar-beta и rar-gamma рецепторами, снижает риск раздражений.

## Тазаротен

Связывается с rar-beta и rar-gamma, крем 0.1% клинически эффективен при фотоповреждении.

# Безрецептурные Формы

Биологическая активность ретинола, ретиналя и эфиров

## Ретинальдегид

Улучшает гидратацию и эластичность кожи, требует одного метаболического шага.

## Ретинол

Стимулирует синтез коллагена и ингибирует матриксные металлопротеиназы.

## Ретилпальмитат

Мягкая нано-форма, снижает воспалительные и невоспалительные акне-поражения.

# Клинические Метрики

Параметры эффективности ретиноидов третьего поколения

## 0.1%

### Тазаротен

Концентрация крема, доказавшая эффективность при глубоких морщинах.

## 1 шаг

### Ретинальдегид

Конверсия до активной кислоты, минимизирует раздражения.

## 12 фкт

### Проверенная база

Клинически подтвержденных фактов в нашем графе ретиноидов.



# Противопоказания и Ограничения

Меры предосторожности в клинической практике



## **Абсолютное противопоказание: Беременность и лактация**

Топические ретиноиды противопоказаны к применению в период беременности и лактации из-за потенциальных рисков системной тератогенности.

# Терапевтические Выводы

Сводное резюме клинических рекомендаций по ретиноидам

- Назначение конкретного ретиноида определяется целями терапии и чувствительностью кожи.
- Селективные агонисты (адапален, тазаротен) предпочтительны при целевой монотерапии.
- Необходимо строго контролировать применение и исключать пациентов в группе риска.