

ВИТАМИН С

# УМ PROSKIN · Витамин С

Клиническая эффективность L-аскорбиновой кислоты и её  
стабильных дериватов

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

[Placeholder] Применение Витамина С в дерматологии

ВИТАМИН С

# Терапевтические механизмы

Стимуляция коллагена и фотозащита на клеточном уровне


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

# Синтез коллагена и фотозащита

## Влияние топической L-аскорбиновой кислоты на дермальный матрикс

- Активирует синтез коллагена I и III типов путем увеличения уровней мРНК in vivo.
- Защищает клетки кожи от индуцированного ультрафиолетом фотоповреждения.
- Стимулирует неокollaгeнез и улучшает структурное состояние дермы.

### Стимуляция синтеза коллагена I/III (Кофактор гидроксилаз)




# Параметры абсорбции

## Влияние уровня pH и концентрации на чрескожное проникновение

- Для проникновения через роговой слой уровень pH формулы должен быть строго ниже 3.5.
- Максимальная эффективная концентрация для чрескожного всасывания составляет 20%.
- Дальнейшее увеличение концентрации не повышает абсорбцию, но увеличивает риск раздражения.


### Чрескожное всасывание L-аскорбиновой кислоты



# Терапия акне: Аскорбилфосфат Натрия

Стабильный дериват витамина С (SAP) в лечении акне средней тяжести

- Топический 5% лосьон SAP демонстрирует высокую клиническую эффективность при акне.
- SAP стабилен при нейтральном значении pH и минимизирует раздражение кожи.
- Обладает сильным антиоксидантным и себорегулирующим потенциалом.



# Местная Переносимость

Особенности влияния уровня pH формулы на чувствительность кожи



## Местное раздражение и водородный показатель (pH)

Формулы L-аскорбиновой кислоты с низким pH (менее 3.5) могут вызывать локальное покалывание. Дериват аскорбилфосфат натрия (5% SAP) наносится при нейтральном pH и имеет комфортный профиль.

# Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению витамина С

- L-аскорбиновая кислота — золотой стандарт для фотозащиты и активации синтеза коллагена I и III типов.
- Трансдермальный перенос L-аскорбиновой кислоты требует  $\text{pH} < 3.5$  и ограничен концентрацией в 20%.
- Аскорбилфосфат Натрия (5% SAP) является стабильным и эффективным средством в терапии акне.