

Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Stage de recherche L3

Elliott Houget

Encadrant

Samuel Mimram

Équipe Cosynus

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

24 août 2026

Sommaire

- 1 Cadre et intuition des objets manipulés
- 2 Motivations et objectifs
- 3 Schémas composables : cas des catégories simples
- 4 Schémas composables : cas catégories cartésiennes

Domaines de l'informatique concernés

Théorie des langages de programmation

Outils et objets similaires au λ -calcul simplement typé.

Théories des types

Théorie des catégories

Vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques.

Théorie des catégories

Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets $\mathcal{C}_0$ et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

X Y Z

Théorie des catégories

Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets $\mathcal{C}_0$ et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

Théorie des catégories

Definition (Catégories)


Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets $\mathcal{C}_0$ et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

Théorie des catégories

Definition (Catégories)


Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets $\mathcal{C}_0$ et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.



Théorie des catégories

Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets $\mathcal{C}_0$ et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.



Termes catégoriques typés

Comme en λ -calcul simplement typé, les termes typés sont définis par un système de règles d'inférence :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)}$$


$$\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

Termes catégoriques typés

Propositionnel : type habité par au moins un terme.

Contractile : type habité par exactement un terme (à équivalence près).



Motivations et objectifs

- 1 $CCCATT_1 \longrightarrow$ Cartesian Closed CAtegorie Types Theorie
(en dimension 1)


- 2
$$\frac{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} A}{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} \text{coh}_{\Theta \mid \Gamma \vdash A} : A} \text{ (ps)}$$

- 3 Formalisation des schémas composables



Schémas composables

Schémas composables $\subset$ Types Contractiles $\subset$ Types Propositionnels



Schémas composables

Chaine de morphismes

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

On souhaite éviter :

$$x \xrightarrow{f} y \xleftarrow{g} z$$

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow f & \\ x & & \\ & \searrow g & \\ & & z \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \\ & \xleftarrow{g} & \end{array}$$

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin b(\Gamma) \cup \{x\}]$$

Contractibilité des schémas composables

- 1 Montrer que les schémas composables sont propositionnels :

Theorem

Si $\Gamma \vdash A$ est un schéma composable alors il existe un terme f typé $\Gamma \vdash f : A$.

$$\text{PSTm} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} \rightarrow \text{PS } \Gamma \ A \rightarrow \text{Tm } \Gamma \ A$$


- 2 Montrer que les schémas composables sont contractiles :

Theorem

Si $\Gamma \vdash A$ est un schéma composable alors il existe au plus un terme f , à équivalence près, typé $\Gamma \vdash f : A$.

$$\text{PSeq} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} (\text{ps} : \text{PS } \Gamma \ A) (t \ u : \text{Tm } \Gamma \ A) \rightarrow t \sim u$$

Termes normaux




$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

Catégories cartésiennes

Catégories cartésiennes sont enrichies d'objets produits, de paires de morphismes, de projecteurs et d'objets terminaux.



Un objet terminal est tel qu'il existe un unique morphisme de chacun des autres objets vers lui.

```
data Ty (n : N) : Set where
  X : Fin n → Ty n
```

```
data Ty (n : N) : Set where
  X      : Fin n → Ty n
  1      : Ty n
  _x_    : (A B : Ty n) → Ty n
```

Schémas composables cartésiens

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (ps-term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-proj) } [A \text{ linéaire}]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B}{\Gamma, B \rightarrow x \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-ext) } [x \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright x)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.

Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**.
(Formalisation Agda incomplète.)

References

-  Samuel Mimram, “An unbiased simply typed combinatory logic,” LIX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France, 2026
-  Dominique Boucher, “La Théorie des catégories en informatique : notions de base et application,” Département d’informatique et recherche opérationnelle Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Août 1993
-  Alexander Grothendieck, Section 4 of: Techniques de construction et théorèmes d’existence en géométrie algébrique III: préschémas quotients, Séminaire Bourbaki: années 1960/61, exposés 205-222, Séminaire Bourbaki, no. 6 (1961), Exposé no. 212

Annexes

Green slime problem

Difficulté lié au système d'inférence et d'identification d'Agda.

Exemple de définition causant un "green slime problem" :

```
data _∈_ {n : ℕ} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ (Γ ▶ A)
  ∈-drop  : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

Une solution possible :

```
data _∈_ {n : ℕ} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ≡ B → A ∈ (Γ ▶ B)
  ∈-drop  : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

Termes (cas cartésien)

On enrichit la définition inductive des termes pour obtenir les termes typés catégoriques cartésiens :

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{term}_x : x \rightarrow \mathbb{I}} \text{ (term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \text{ (pair)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_0 : x \times y \rightarrow x} \text{ (fst)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_1 : x \times y \rightarrow y} \text{ (snd)}$$

Relation $\sim$

$$\frac{}{f \cdot id \sim f} \text{ (unitl)} \quad \frac{}{id \cdot f \sim f} \text{ (unitr)}$$

$$\frac{}{f \cdot (g \cdot h) \sim (f \cdot g) \cdot h} \text{ (assoc)}$$

$$\frac{f_l \sim f_r \quad g_l \sim g_r}{f_l \cdot g_l \sim f_r \cdot g_r} \text{ (comp)}$$

$$\frac{}{f \sim f} \text{ (\sim-refl)} \quad \frac{f \sim g}{g \sim f} \text{ (\sim-sym)}$$

$$\frac{f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \text{ (\sim-trans)}$$

Séquents nécessaires (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de $CaTT_1$.

$$1 \quad \emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$$

$$2 \quad x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$$

$$3 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$$

$$4 \quad f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$$

$$5 \quad f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$$

$$6 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

Relation $\sim$ (cas cartésien)

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_0 \sim f} \text{ (pfst)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_1 \sim g} \text{ (psnd)}$$

$$\frac{}{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle \sim id} \text{ (pext)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : y \rightarrow z}{f \cdot \langle g, h \rangle \sim \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle} \text{ (pnat)}$$

Séquents essentiels (cas catégories simples)

Identité :
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche :
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité :
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

Séquents essentiels (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f \cdot id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

Séquents essentiels : associativité I

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} (ps^=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{\frac{\overline{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

Séquents essentiels : associativité II

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\frac{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : z \rightarrow w}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w}}$$

$$\Pi_{f \cdot (g \cdot h)} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash g \cdot h : y \rightarrow w}}{\Gamma \vdash f \cdot (g \cdot h) : x \rightarrow w}$$