附表十八之五 重型血友病患「醫療評估追蹤紀錄表」

病人本人至少需於 3 個月回診時由醫師填寫一次醫療評估追蹤紀錄表

基本資料:

姓名: _____病歷號碼:_____年齡:_____ 歲 體重: _____ 公斤 身高: _____ 公分

血友病: □A 型 □B 型 □其他_____

回診分類:

□ **預防性注射** 4 歲及以下之病人，每 2 至 4 週應至少回診一次。

□ **預防性注射** 4 歲以上至 12 歲之病人，每 4 至 6 週應至少回診一次。

□ **預防性注射** 12 歲以上之病人，每 6 至 8 週應至少回診一次。

□ 有抗體之病人**治療時**(抗體最高歷史數值:___BU/mL)，應該每 4-8 週至少回診一次

□ **需要時治療之無抗體重型血友病患，每 3 個月應至少回診一次**

□ **接受「皮下非補充製劑」的治療時，視同 Prophylaxis 追蹤**

治療期間：__年_月_日 至 __年_月__日

一、預防注射：使用劑量: 每公斤___(單位:IU/μg/mg)

使用頻次：每___週使用___次 共 __次數 共 ___單位/月

□fitusiran 每____月____mg

□第八因子(藥名：_____)

□第九因子(藥名：_____)

□其他(藥名：_____)

___次數 共 ___單位 (activated) PCC(藥名：_____)

___次數 共 ___單位 recombinant factor VII(藥名：_____)

___次數 共 ___單位 _____(藥名：_____)

二、出血時注射(突破性出血)：

出血部位：□腦部 □腸胃道 □呼吸道 □肌肉 □關節 □其他:

___次數 共 ___單位 □第八因子 □第九因子 □其他

___次數 共 ___單位 (activated) PCC(藥名：　　)

___次數 共 ___單位 recombinant factor VII(藥名：　　)

___次數 共 ___單位 _____(藥名：　　)

三、手術或侵入性處置: □ 無 □ 有 請說明:

四、抗體數值：___BU /mL 檢驗日期:_____

(有抗體之病人請註明三個月內抗體檢測數值；無抗體之病人請註明一年內抗體檢測數值)

五、每年至少一次檢測最低凝血因子濃度(trough level)_____ 檢驗日:_____

(初次使用或更換預防性治療藥物時，需於第三個月檢測最低凝血因子濃度)；

fitusiran 每兩個月至少一次檢測抗凝血酵素(anti-thrombin)濃度_____ 檢驗日:_____

六、治療計畫：

□維持治療

□調整治療

請說明:

□進一步檢查(例如:藥物動力學檢測)

請說明:

□療效評估(每年評估一次)

1.Pettersson score、HJHS、肌肉骨骼超音波：

請說明:_____

評估醫師:_____

2.HAL、QoL：

請說明: _____

3.不良事件反應：

請說明: _____

4.併發症：

請說明: _____

_____評估醫師:

日期: