

附表十八之五 重型血友病患「醫療評估追蹤紀錄表」

病人本人至少需於 3 個月回診時由醫師填寫一次醫療評估追蹤紀錄表

基本資料:

姓名: _____ 病歷號碼: _____ 年齡: _____ 歲 體重: _____ 公斤 身高: _____ 公分

血友病: ☐ A 型 ☐ B 型 ☐ 其他 _____

回診分類:

- ☐ **預防性注射** 4 歲及以下之病人，每 2 至 4 週應至少回診一次。
- ☐ **預防性注射** 4 歲以上至 12 歲之病人，每 4 至 6 週應至少回診一次。
- ☐ **預防性注射** 12 歲以上之病人，每 6 至 8 週應至少回診一次。
- ☐ 有抗體之病人**治療時**(抗體最高歷史數值: _____ BU/mL)，應該每 4-8 週至少回診一次
- ☐ **需要時治療之無抗體重型血友病患，每 3 個月應至少回診一次**
- ☐ **接受「皮下非補充製劑」的治療時，視同 Prophylaxis 追蹤**

治療期間: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、預防注射：使用劑量: 每公斤 _____ (單位: IU/μg/mg)

使用頻次: 每 _____ 週使用 _____ 次 共 _____ 次數 共 _____ 單位/月

☐ fitusiran 每 _____ 月 _____ mg

☐ 第八因子(藥名: _____)

☐ 第九因子(藥名: _____)

☐ 其他(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 (activated) PCC(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 recombinant factor VII(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 _____ (藥名: _____)

二、出血時注射(突破性出血):

出血部位: ☐ 腦部 ☐ 腸胃道 ☐ 呼吸道 ☐ 肌肉 ☐ 關節 ☐ 其他:

_____ 次數 共 _____ 單位 ☐ 第八因子 ☐ 第九因子 ☐ 其他

_____ 次數 共 _____ 單位 (activated) PCC(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 recombinant factor VII(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 _____ (藥名: _____)

三、手術或侵入性處置: ☐ 無 ☐ 有 請說明:

四、抗體數值: _____ BU /mL 檢驗日期: _____

(有抗體之病人請註明三個月內抗體檢測數值；無抗體之病人請註明一年內抗體檢測數值)

五、每三個月至少一次檢測最低凝血因子濃度(trough level) _____ 檢驗日: _____；

fitusiran 每兩個月至少一次檢測抗凝血酵素(anti-thrombin)濃度 _____ 檢驗日: _____

六、治療計畫:

☐ 維持治療

☐ 調整治療

請說明:

☐ 進一步檢查(例如:藥物動力學檢測)

請說明:

☐ 療效評估(每年評估一次)

1.Pettersson score、HJHS、肌肉骨骼超音波：

請說明: _____

評估醫師: _____

2.HAL、QoL：

請說明: _____

3.不良事件反應：

請說明: _____

4.併發症：

請說明: _____

評估醫師:

日期: