

# A N A L Y S I S    III

Wintersemester 16/17

**Ernst Kuwert**

Mathematisches Institut  
Universität Freiburg



## **Vorbemerkung**

Dieses Skript ist aus meiner Vorlesung im WS 07 entstanden, es stellt die Grundlage der jetzigen Vorlesung im WS 16/17 in Freiburg dar. Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass sich im Lauf der Veranstaltung Verbesserungen ergeben, die natürlich dann im Skript umgesetzt werden. Klarerweise ist der Stoff auch von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig, insbesondere steht das angekündigte Thema der Differentialformen unter Vorbehalt. Es gibt einige Bücher über das Thema mit unterschiedlicher Auswahl des Stoffs. Folgende Texte entsprechen am meisten unserer Planung:

Elstrodt, J.,                      Maß- und Integrationstheorie, Springer 2011.  
Ammann, H. & Escher, J.,    Analysis III, Birkhäuser 2001.

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsfunktionen . . . . .	1
2	Äußere Maße und Maße . . . . .	11
3	Der Fortsetzungssatz von Caratheodory . . . . .	19
4	Das $n$ -dimensionale Lebesguemaß . . . . .	27
5	Das Lebesgueintegral . . . . .	35
6	Konvergenzsätze und $L^p$ -Räume . . . . .	47
7	Der Satz von Fubini . . . . .	63
8	Der Transformationssatz . . . . .	73
9	Das Flächenmaß auf Untermannigfaltigkeiten . . . . .	81
10	Der Integralsatz von Gauß . . . . .	91
11	Faltung und Fouriertransformation . . . . .	99
12	Anhang . . . . .	111

# 1 Inhaltsfunktionen

In diesem Kapitel wird der Jordansche Inhaltsbegriff für Mengen  $E \subset \mathbb{R}^n$  erklärt. Dabei wird das Volumen zunächst für endliche Vereinigungen von achsenparallelen Quadern, sogenannte Figuren, elementargeometrisch definiert. Dann werden beliebige, beschränkte Mengen  $E \subset \mathbb{R}^n$  von außen und von innen durch solche Figuren approximiert. Es stellt sich heraus, dass auf diese Weise zwar für hinreichend reguläre Mengen ein vernünftiger Inhaltsbegriff gegeben ist, dass aber andererseits mit diesem Zugang nicht einmal allen beschränkten, offenen Mengen sinnvoll ein Volumen zugeordnet werden kann. Parallel zu der konkreten Diskussion im  $\mathbb{R}^n$  werden die Begriffe Halbring, Ring, Inhalt allgemein definiert.

Wir beginnen mit der elementaren Definition des Inhalts für Quader im  $\mathbb{R}^n$ . Eine Menge  $I \subset \mathbb{R}$  ist ein (endliches) Intervall, falls es  $a, b \in \mathbb{R}$  gibt mit  $a \leq b$ , so dass

$$(1.1) \quad (a, b) \subset I \subset [a, b].$$

$I = \emptyset$  ist hier zulässig, die Bedingung ist erfüllt mit  $b = a$  beliebig. Die Grenzen eines nichtleeren Intervalls sind  $a = \inf I$  und  $b = \sup I$ .

**Definition 1.1 (Quader)** *Ein (achsenparalleler)  $n$ -dimensionaler Quader ist ein kartesisches Produkt  $Q = I_1 \times \dots \times I_n \subset \mathbb{R}^n$  von endlichen Intervallen. Ist  $Q \neq \emptyset$  und sind  $a_j \leq b_j$  die Intervallgrenzen von  $I_j$ , so ist das Volumen von  $Q$  definiert als*

$$(1.2) \quad \lambda^n(Q) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j) \geq 0.$$

Im Fall  $Q = \emptyset$  setzen wir  $\lambda^n(Q) = 0$ .

Wir bezeichnen die Potenzmenge einer Menge  $X$ , also die Menge aller Teilmengen von  $X$ , mit  $2^X$ . Eine Teilmenge von  $2^X$  wird in der Maßtheorie als *System von Mengen* bezeichnet, um den Ausdruck „Menge von Mengen“ zu vermeiden.

**Definition 1.2 (Halbring)** *Ein Mengensystem  $\mathcal{P} \subset 2^X$  heißt Halbring über  $X$ , wenn gilt:*

- (i)  $\emptyset \in \mathcal{P}$
- (ii)  $P, Q \in \mathcal{P} \Rightarrow P \cap Q \in \mathcal{P}$
- (iii)  $P, Q \in \mathcal{P} \Rightarrow P \setminus Q = \bigcup_{i=1}^k P_i$  mit  $P_1, \dots, P_k \in \mathcal{P}$  paarweise disjunkt.

**Satz 1.1 (Halbring  $\mathcal{P}^n$ )** *Das System  $\mathcal{P}^n$  der Quader im  $\mathbb{R}^n$  ist ein Halbring.*

BEWEIS: Wir zeigen die Aussage zunächst für  $n = 1$ , also für das System aller Intervalle. Wie festgestellt ist die leere Menge ein Intervall. Seien  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle mit Grenzen  $a \leq b$  bzw.  $c \leq d$ . Für  $I \cap J \neq \emptyset$  sieht man  $\max(a, c) \leq \min(b, d)$  und

$$(\max(a, c), \min(b, d)) \subset I \cap J \subset [\max(a, c), \min(b, d)].$$

Also ist  $I \cap J$  ein Intervall. Die Menge  $I \setminus J$  läßt sich als Vereinigung von höchstens zwei disjunkten Intervallen darstellen. Es reicht das für  $J \subset I$  zu zeigen, andernfalls schreiben wir  $I \setminus J = I \setminus (I \cap J)$ . Seien wieder  $c \leq d$  die Grenzen von  $J$ . Setze

$$I' = \{x \in I \setminus J : x \leq c\} \quad I'' = \{x \in I \setminus J : x \geq d\}.$$

Offenbar gilt  $I \setminus J = I' \cup I''$ , und  $I', I''$  sind Intervalle:


$$(a, c) \subset I' \subset [a, c] \quad \text{und} \quad (d, b) \subset I'' \subset [d, b].$$

Sind  $I', I''$  disjunkt, so folgt die Behauptung. Andernfalls ist  $c = d \in I' \cap I'' = I \setminus J$ . Das bedeutet  $J = \emptyset$  und damit  $I \setminus J = I$ . Damit ist der Satz im Fall  $n = 1$  bewiesen.

Seien nun  $P = I_1 \times \dots \times I_n$  und  $Q = J_1 \times \dots \times J_n$  Quader im  $\mathbb{R}^n$ . Dann gilt  $P \cap Q = (I_1 \cap J_1) \times \dots \times (I_n \cap J_n)$ , also ist  $P \cap Q$  wieder ein Quader. Für jedes  $k$  hat man die disjunkte Zerlegung

$$I_k = (I_k \cap J_k) \cup (I_k \setminus J_k),$$

wobei  $I_k \setminus J_k$  als disjunkte Vereinigung von Intervallen geschrieben werden kann. Das Produkt liefert eine disjunkte Zerlegung von  $P$  in Quader. Einer dieser Quader ist  $P \cap Q$ , durch Weglassen ergibt sich die gewünschte Darstellung für  $P \setminus Q$ .  $\square$



Der zweite Teil des Beweises von Satz 1.1 zeigt ganz allgemein Folgendes:

**Folgerung 1.1 (Produktmengen)** Für  $i = 1, \dots, n$  sei  $\mathcal{P}_i$  ein Halbring über  $X_i$ . Dann ist das System

$$\mathcal{P} = \{P_1 \times \dots \times P_n : P_i \in \mathcal{P}_i\}$$

der Produktmengen ein Halbring über  $X_1 \times \dots \times X_n$ .

**Definition 1.3 (Inhalt)** Sei  $\mathcal{P}$  ein Halbring über  $X$ . Eine Funktion  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\lambda(\emptyset) = 0$  heißt Inhalt, wenn für jedes  $P \in \mathcal{P}$  gilt:

$$(1.3) \quad \text{Ist } P = \bigcup_{i=1}^k P_i \text{ mit } P_1, \dots, P_k \in \mathcal{P} \text{ paarweise disjunkt, so folgt } \lambda(P) = \sum_{i=1}^k \lambda(P_i).$$

**Satz 1.2 (Elementarinhalt von Quadern)** Das elementargeometrische Volumen

$$\lambda^n(Q) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

ist ein Inhalt auf dem Halbring  $\mathcal{P}^n$  der Quader im  $\mathbb{R}^n$ .

BEWEIS: Nach Definition ist  $\lambda(\emptyset) = 0$ . Um (1.3) zu zeigen, verwenden wir Induktion über die Dimension  $n$ . Für  $n = 1$  wähle ein background Intervall  $I \supset P$ . Die charakteristischen Funktionen von  $P, P_1, \dots, P_k$  sind dann auf  $I$  Riemann-integrierbar. Wir erhalten

$$\chi_P = \sum_{i=1}^k \chi_{P_i} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1(P) = \int_I \chi_P = \sum_{i=1}^k \int_I \chi_{P_i} = \sum_{i=1}^k \lambda_1(P_i).$$

Sei nun die Aussage für den Inhalt  $\lambda_{n-1}$  im  $\mathbb{R}^{n-1}$  schon bewiesen. Für  $y \in \mathbb{R}$  ist der  $y$ -Schnitt von  $P = I_1 \times \dots \times I_n \in \mathcal{P}^n$  der  $(n-1)$ -dimensionale Quader

$$P_y = \{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (x, y) \in P\} = \begin{cases} I_1 \times \dots \times I_{n-1} & \text{falls } y \in I_n \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit gilt  $P_y = \bigcup_{i=1}^k (P_i)_y$  disjunkt. Wähle wieder ein Intervall  $I \supset I_n$ , es folgt induktiv

$$\lambda^n(P) = \int_I \lambda^{n-1}(P_y) dy = \int_I \sum_{i=1}^k \lambda^{n-1}((P_i)_y) dy = \sum_{i=1}^k \int_I \lambda^{n-1}((P_i)_y) dy = \sum_{i=1}^k \lambda^n(P_i).$$

□

Unser Ziel ist nun, die Definition der Inhaltsfunktion auf allgemeinere Mengen zu erweitern. Als erstes betrachten wir endliche Vereinigungen von Quadern, sogenannte Figuren. Wie in Satz 1.3 gezeigt wird, ist das System der Figuren unter endlichen Mengenoperationen abgeschlossen, und es ist auch das kleinste Mengensystem mit dieser Eigenschaft, das die Quader enthält. Dafür führen wir die folgenden Begriffe ein.

**Definition 1.4 (Ring)** Ein Mengensystem  $\mathcal{R} \subset 2^X$  heißt Ring über  $X$ , falls gilt:

- (i)  $\emptyset \in \mathcal{R}$
- (ii)  $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{R}$
- (iii)  $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{R}$ .

Für zwei Mengen  $A, B$  in einem Ring  $\mathcal{R}$  liegt auch der Durchschnitt wieder in  $\mathcal{R}$ , denn es gilt  $A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}$ .

**Definition 1.5 (erzeugter Ring)** Der von  $\mathcal{E} \subset 2^X$  erzeugte Ring ist

$$(1.4) \quad \varrho(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{R} : \mathcal{R} \text{ ist Ring in } X \text{ mit } \mathcal{E} \subset \mathcal{R} \}.$$

Klar ist:  $\varrho(\mathcal{E})$  ist ein Ring mit  $\mathcal{E} \subset \varrho(\mathcal{E})$ , und es gilt die Implikation

$$(1.5) \quad \mathcal{R} \text{ Ring mit } \mathcal{E} \subset \mathcal{R} \quad \Rightarrow \quad \varrho(\mathcal{E}) \subset \mathcal{R}.$$

Salopp besagt die Definition, dass  $\varrho(\mathcal{E})$  der kleinste Ring ist, der  $\mathcal{E}$  enthält. Für den von einem Halbring  $\mathcal{P}$  erzeugten Ring haben wir eine explizite Darstellung.

**Satz 1.3 (Konstruktion des erzeugten Rings)** Sei  $\mathcal{P}$  ein Halbring über  $X$  und  $\mathcal{F}$  das System aller endlichen, disjunkten Vereinigungen  $F = \bigcup_{i=1}^k P_i$  von Mengen  $P_i \in \mathcal{P}$ . Dann ist  $\mathcal{F}$  der von  $\mathcal{P}$  erzeugte Ring.

BEWEIS: Jeder Ring  $\mathcal{R}$  mit  $\mathcal{P} \subset \mathcal{R}$  enthält nach Definition  $\mathcal{F}$ . Es ist also nur zu zeigen, dass  $\mathcal{F}$  ein Ring ist. Offenbar ist  $\emptyset \in \mathcal{F}$ . Wir zeigen nun durch Induktion über  $k$

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^k Q_i \in \mathcal{F} \quad \text{für } P, Q_1, \dots, Q_k \in \mathcal{P}.$$

Für  $k = 1$  gilt das nach Definition 1.2. Ist die disjunkte Zerlegung  $P \setminus \bigcup_{i=1}^k Q_i = \bigcup_{j=1}^l P_j$  für ein  $k \in \mathbb{N}$  schon gefunden, so folgt

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^{k+1} Q_i = \left( \bigcup_{j=1}^l P_j \right) \setminus Q_{k+1} = \bigcup_{j=1}^l (P_j \setminus Q_{k+1}).$$

Die  $P_j \setminus Q_{k+1}$ ,  $j = 1, \dots, l$ , sind paarweise disjunkt und ihrerseits Vereinigung von endlich vielen disjunkten Mengen aus  $\mathcal{P}$  nach Definition 1.2, womit die Induktionsbehauptung gezeigt ist. Sind nun  $E = \bigcup_{i=1}^k P_i$ ,  $F = \bigcup_{j=1}^l Q_j$  mit  $P_i \in \mathcal{P}$  disjunkt sowie  $Q_j \in \mathcal{P}$  disjunkt, so folgt die disjunkte Zerlegung

$$E \setminus F = \bigcup_{i=1}^k \left( P_i \setminus \bigcup_{j=1}^l Q_j \right),$$

und damit leicht  $E \setminus F \in \mathcal{F}$ . Schließlich ergibt sich  $E \cup F = (E \setminus F) \cup F \in \mathcal{F}$ .  $\square$

**Satz 1.4 (Fortsetzung auf den erzeugten Ring)** *Sei  $\lambda$  ein Inhalt auf dem Halbring  $\mathcal{P}$  und  $\mathcal{F}$  der von  $\mathcal{P}$  erzeugte Ring. Dann gibt es genau einen Inhalt  $\bar{\lambda} : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\bar{\lambda}|_{\mathcal{P}} = \lambda$ .*

BEWEIS: Ist  $F = \bigcup_{i=1}^k P_i$  mit  $P_i \in \mathcal{P}$  paarweise disjunkt wie in Satz 1.3, so muss für die Fortsetzung notwendig gelten

$$(1.6) \quad \bar{\lambda}(F) = \sum_{i=1}^k \lambda(P_i).$$

Deshalb ist die Fortsetzung eindeutig bestimmt. Wir wollen  $\bar{\lambda}$  durch (1.6) definieren. Dazu ist zu zeigen, dass die rechte Seite nicht von der Wahl der Zerlegung abhängt. Sei  $F = \bigcup_{j=1}^l Q_j$  eine andere disjunkte Darstellung mit  $Q_j \in \mathcal{P}$ . Dann folgt

$$\sum_{j=1}^l \lambda(Q_j) = \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^k \lambda(P_i \cap Q_j) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \lambda(P_i \cap Q_j) = \sum_{i=1}^k \lambda(P_i).$$

Somit ist  $\bar{\lambda}$  wohldefiniert. Für eine disjunkte Vereinigung  $F = \bigcup_{i=1}^k F_i$  mit  $F, F_i \in \mathcal{F}$  schreiben wir  $F_i = \bigcup_{j=1}^{m_i} P_{i,j}$  mit  $P_{i,1}, \dots, P_{i,m_i} \in \mathcal{P}$  paarweise disjunkt und erhalten

$$\bar{\lambda}(F) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \lambda(P_{i,j}) = \sum_{i=1}^k \bar{\lambda}(F_i).$$

Also ist  $\bar{\lambda}$  der gesuchte Inhalt.  $\square$



**Folgerung 1.2 (Monotonie und Subadditivität)** Sei  $\lambda$  ein Inhalt auf dem Halbring  $\mathcal{P}$  über  $X$ . Dann gilt die Implikation

$$P \subset \bigcup_{i=1}^k P_i \text{ mit } P, P_1, \dots, P_k \in \mathcal{P} \quad \Rightarrow \quad \lambda(P) \leq \sum_{i=1}^k \lambda(P_i).$$

BEWEIS: Nach Satz 1.4 können wir annehmen, dass  $\mathcal{P}$  ein Ring ist. Es gilt zunächst

$$P, Q \in \mathcal{P}, Q \supset P \quad \Rightarrow \quad \lambda(Q) = \lambda(P) + \underbrace{\lambda(Q \setminus P)}_{\geq 0} \geq \lambda(P),$$

Das zeigt die Monotonie. Für  $P_1, \dots, P_k \in \cap P$  erhalten wir weiter

$$\lambda\left(\bigcup_{i=1}^k P_i\right) = \lambda\left(\bigcup_{i=1}^k P_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} P_j\right)\right) = \sum_{i=1}^k \lambda\left(P_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} P_j\right)\right) \leq \sum_{i=1}^k \lambda(P_i).$$

Das ist die Subadditivität. Kombination liefert die Behauptung.  $\square$

Den vom System  $\mathcal{P}^n$  aller Quader  $P \subset \mathbb{R}^n$  erzeugten Ring bezeichnen wir mit  $\mathcal{F}^n$ . Seine Elemente sind die Figuren, das heißt endliche Vereinigungen von Quadern. Für den nach Satz 1.4 fortgesetzten Inhalt schreiben wir  $\lambda^n : \mathcal{F}^n \rightarrow [0, \infty]$ .

**Definition 1.6 (Jordanscher Inhalt)** Für eine beschränkte Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$  definieren wir den äußeren bzw. inneren Jordanschen Inhalt durch

$$\begin{aligned} \overline{\text{vol}}^n(E) &= \inf\{\lambda^n(F) : F \text{ Figur mit } F \supset E\} \\ \underline{\text{vol}}^n(E) &= \sup\{\lambda^n(F) : F \text{ Figur mit } F \subset E\}. \end{aligned}$$

Bei Gleichheit  $\overline{\text{vol}}^n(E) = \underline{\text{vol}}^n(E) =: \text{vol}^n(E)$  heißt  $E$  quadrierbar, und  $\text{vol}^n(E)$  heißt Jordanscher Inhalt von  $E$ .

**Lemma 1.1** Die beschränkte Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$  ist genau dann quadrierbar, wenn es zu jedem  $\varepsilon > 0$  Figuren  $F_1 \subset E \subset F_2$  gibt mit  $\lambda^n(F_2 \setminus F_1) < \varepsilon$ .

BEWEIS: Wir zeigen erst, dass das Kriterium notwendig ist. Zu  $\varepsilon > 0$  wähle Figuren  $F_1 \subset E \subset F_2$  mit  $\lambda^n(F_2) < \overline{\text{vol}}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2}$  und  $\lambda^n(F_1) > \underline{\text{vol}}^n(E) - \frac{\varepsilon}{2}$ . Ist  $E$  quadrierbar, so folgt

$$\lambda^n(F_2 \setminus F_1) = \lambda^n(F_2) - \lambda^n(F_1) < \overline{\text{vol}}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2} - \underline{\text{vol}}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Umgekehrt: ist  $F_1 \subset E \subset F_2$ , so gilt wegen Monotonie  $\lambda^n(F_1) \leq \lambda^n(F_2)$ . Durch Bilden des Infimums folgt  $\underline{\text{vol}}^n(E) \leq \overline{\text{vol}}^n(E)$ . Für  $F_{1,2}$  wie in der Annahme folgt

$$0 \leq \overline{\text{vol}}^n(E) - \underline{\text{vol}}^n(E) \leq \lambda^n(F_2) - \lambda^n(F_1) = \lambda^n(F_2 \setminus F_1) < \varepsilon.$$

Somit ist das Kriterium auch hinreichend.  $\square$

**Satz 1.5 (Jordaninhalt)** Für das System  $\mathcal{Q}^n$  der quadrierbaren Mengen im  $\mathbb{R}^n$  und den Jordanschen Inhalt  $\text{vol}^n$  gilt:

- (i)  $\mathcal{Q}^n$  ist ein Ring, der den Ring  $\mathcal{F}^n$  der Figuren enthält.

(ii)  $\text{vol}^n : \mathcal{Q}^n \rightarrow [0, \infty)$  ist ein Inhalt mit  $\text{vol}^n|_{\mathcal{F}^n} = \lambda^n$ .

BEWEIS: Es ist klar, dass  $\emptyset \in \mathcal{Q}^n$  und  $\text{vol}^n(\emptyset) = 0$ , vgl. den Beweis von Satz 1.1. Für (i) ist zu zeigen, dass mit  $E, E' \in \mathcal{Q}^n$  auch  $E \setminus E'$  und  $E \cup E'$  in  $\mathcal{Q}^n$  liegen. Wähle nach Lemma 1.1 Figuren  $F_1 \subset E \subset F_2$  bzw.  $F'_1 \subset E' \subset F'_2$  mit

$$\lambda^n(F_2 \setminus F_1) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{und} \quad \lambda^n(F'_2 \setminus F'_1) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Offenbar gilt

$$F_1 \setminus F'_2 \subset E \setminus E' \subset F_2 \setminus F'_1 \quad \text{und} \quad F_1 \cup F'_1 \subset E \cup E' \subset F_2 \cup F'_2.$$

Man prüft durch Fallunterscheidung nach:

$$\begin{aligned} (F_2 \setminus F'_1) \setminus (F_1 \setminus F'_2) &\subset (F_2 \setminus F_1) \cup (F'_2 \setminus F'_1), \\ (F_2 \cup F'_2) \setminus (F_1 \cup F'_1) &\subset (F_2 \setminus F_1) \cup (F'_2 \setminus F'_1). \end{aligned}$$

Damit erhalten wir nach Folgerung 1.2

$$\lambda^n((F_2 \setminus F'_1) \setminus (F_1 \setminus F'_2)) \leq \lambda^n(F_2 \setminus F_1) + \lambda^n(F'_2 \setminus F'_1) < \varepsilon.$$

Analog ergibt sich  $\lambda^n((F_2 \cup F'_2) \setminus (F_1 \cup F'_1)) < \varepsilon$ , und es folgt  $E \setminus E', E \cup E' \in \mathcal{Q}^n$  nach Lemma 1.1. Seien nun  $E, E' \in \mathcal{Q}^n$  disjunkt. Für Figuren  $F_1 \subset E \subset F_2$  bzw.  $F'_1 \subset E' \subset F'_2$  folgt dann

$$\begin{aligned} \lambda^n(F_1) + \lambda^n(F'_1) &= \lambda^n(F_1 \cup F'_1) \quad (\text{nach Satz 1.4}) \\ &\leq \underline{\text{vol}}^n(E \cup E') \\ &= \overline{\text{vol}}^n(E \cup E') \quad (\text{da } E \cup E' \in \mathcal{Q}^n) \\ &\leq \lambda^n(F_2 \cup F'_2) \\ &\leq \lambda^n(F_2) + \lambda^n(F'_2). \end{aligned}$$

Bilde das Supremum über alle  $F_1, F'_1$  und das Infimum über alle  $F_2, F'_2$ . Dies ergibt

$$\text{vol}^n(E \cup E') = \text{vol}^n(E) + \text{vol}^n(E'),$$

und damit die endliche Additivität der Funktion  $\text{vol}^n$ . Für  $F \in \mathcal{F}^n$  wählen wir schließlich  $F_1 = F_2 = F$  und erhalten  $\lambda^n(F) = \underline{\text{vol}}^n(F) = \overline{\text{vol}}^n(F)$ . Damit ist der Satz bewiesen.  $\square$

Der Jordansche Inhalt setzt somit den Elementarinhalt  $\lambda^n : \mathcal{F}^n \rightarrow [0, \infty]$  auf den Ring  $\mathcal{Q}^n$  der quadrierbaren Mengen fort. Es stellt sich die Frage, wie groß  $\mathcal{Q}^n$  eigentlich ist. Hierzu betrachten wir zunächst zwei negative Beispiele.

**Beispiel 1.1** Die Menge  $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1] \subset \mathbb{R}$  ist nicht quadrierbar. Es gilt nämlich:

$$\begin{aligned} E \subset F \quad \text{mit } F \in \mathcal{F}^1 &\Rightarrow [0, 1] = \overline{E} \subset \overline{F} &\Rightarrow \overline{\text{vol}}^1(E) = 1, \\ F \subset E \quad \text{mit } F \in \mathcal{F}^1 &\Rightarrow \emptyset = \text{int}(E) \supset \text{int}(F) &\Rightarrow \underline{\text{vol}}^1(E) = 0. \end{aligned}$$

Ein einzelner Punkt  $\{x\} \subset \mathbb{R}$  ist offensichtlich quadrierbar mit  $\text{vol}^1(\{x\}) = 0$ . Also ist das System der quadrierbaren Mengen zwar unter endlichen Vereinigungen abgeschlossen, nicht jedoch unter abzählbar unendlichen Vereinigungen.

**Beispiel 1.2** Es gibt sogar eine offene Menge  $U \subset (0, 1)$ , die nicht quadrierbar ist. Wähle dazu eine Abzählung  $\mathbb{Q} \cap (0, 1) = \{q_1, q_2, \dots\}$  und setze für  $\varepsilon \in (0, 1/2)$

$$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k \quad \text{mit } U_k = (q_k - 2^{-k}\varepsilon, q_k + 2^{-k}\varepsilon) \cap (0, 1).$$

Wir behaupten  $\underline{\text{vol}}^1(U) \leq 2\varepsilon < 1 = \overline{\text{vol}}^1(U)$ . Für die linke Ungleichung betrachten wir eine beliebige Figur  $F \subset U$ . Ist  $F$  kompakt, so gilt nach dem Überdeckungssatz von Heine-Borel schon  $F \subset \bigcup_{k=1}^m U_k$  für ein  $m < \infty$ , und es folgt

$$\lambda^1(F) \leq \sum_{k=1}^m \lambda^1(U_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{1-k}\varepsilon = 2\varepsilon.$$

Ist  $F$  nicht kompakt, so wählen wir eine Folge kompakter Figuren  $F_j \subset F$  mit  $\lambda^1(F_j) \nearrow \lambda^1(F)$ , womit die Ungleichung  $\underline{\text{vol}}^1(U) \leq 2\varepsilon$  gezeigt ist. Jede Figur  $F \supset U$  erfüllt andererseits  $\overline{F} \supset \overline{U} = [0, 1]$ , und dies bedeutet  $\overline{\text{vol}}^1(U) = 1$ . Somit ist  $U$  nicht quadrierbar.

Um die quadrierbaren Mengen allgemein zu charakterisieren, benötigen wir das folgende Verfahren, das beliebige Mengen durch Figuren in einem Gitter approximiert. Dieses Lemma wird an mehreren Stellen der Vorlesung eingesetzt.

**Lemma 1.2 (Approximation durch Gitterfiguren)** Betrachte die Würfelfamilie  $\mathcal{W}_k = \{Q_{k,m} = 2^{-k}(m + [0, 1]^n) : m \in \mathbb{Z}^n\}$  für  $k \in \mathbb{N}_0$  und definiere für  $E \subset \mathbb{R}^n$  die Mengen

$$F_k(E) = \bigcup \{Q \in \mathcal{W}_k : Q \subset E\}, \quad F^k(E) = \bigcup \{Q \in \mathcal{W}_k : Q \cap E \neq \emptyset\}.$$



Dann ist  $F_k(E)$  bzw.  $F^k(E)$  abgeschlossene Vereinigung von abzählbar vielen Würfeln mit paarweise disjunktem Inneren, und es gelten folgende Aussagen:

$$(i) \quad F_1(E) \subset F_2(E) \subset \dots \subset E \quad \text{und} \quad F^1(E) \supset F^2(E) \supset \dots \supset E.$$

$$(ii) \quad F_k(E) \supset \{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus E) > 2^{-k}\sqrt{n}\}$$

$$F^k(E) \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, E) \leq 2^{-k}\sqrt{n}\}.$$

$$(iii) \quad \text{int}(E) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k(E) \subset E \quad \text{sowie} \quad \overline{E} \supset \bigcap_{k=1}^{\infty} F^k(E) \supset E.$$



BEWEIS: Die Würfel in  $\mathcal{W}_k$  sind kompakt, haben paarweise disjunktes Inneres und jede beschränkte Menge wird nur von endlich vielen Würfeln in  $\mathcal{W}_k$  getroffen. Insbesondere sind  $F_k(E), F^k(E)$  abgeschlossen. Nun ist  $Q_{k,m}$  die Vereinigung der  $2^n$  Teilwürfel  $Q_{k+1,2m+l}$  mit  $l \in \{0, 1\}^n$ , und es gilt

$$\begin{aligned} Q_{k,m} \subset E &\Rightarrow Q_{k+1,2m+l} \subset E \quad \text{für alle } l \in \{0, 1\}^n, \\ Q_{k+1,2m+l} \cap E \neq \emptyset &\Rightarrow Q_{k,m} \cap E \neq \emptyset \quad \text{wobei } l \in \{0, 1\}^n. \end{aligned}$$

Daraus folgt Aussage (i). Sei nun  $x \in \mathbb{R}^n$  beliebig. Dann gilt  $x \in Q$  für ein  $Q \in \mathcal{W}_k$ , und es folgt wegen  $\text{diam}(Q) = 2^{-k}\sqrt{n}$

$$\text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus E) > 2^{-k}\sqrt{n} \Rightarrow Q \subset E \Rightarrow x \in F_k(E).$$

Ist andererseits  $x \in F^k(E)$ , so gilt  $x \in Q$  für ein  $Q \in \mathcal{W}_k$  mit  $Q \cap E \neq \emptyset$ . Also gilt

$$x \in F^k(E) \Rightarrow \text{dist}(x, E) \leq \text{diam}(Q) \leq 2^{-k}\sqrt{n},$$

womit beide Behauptungen in (ii) gezeigt sind. Behauptung (iii) folgt. □

Wir können nun die quadrierbaren Mengen charakterisieren.

**Satz 1.6 (Quadrierbarkeitskriterium)** Für eine beschränkte Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$  gilt:

$$E \text{ quadrierbar} \quad \Leftrightarrow \quad \overline{\text{vol}}^n(\partial E) = 0.$$

BEWEIS: Sei  $E$  quadrierbar. Dann gibt es nach Lemma 1.1 zu  $\varepsilon > 0$  Figuren  $F_1 \subset E \subset F_2$  mit  $\lambda^n(F_2 \setminus F_1) < \varepsilon$ . Es sei oBdA  $F_1$  offen und  $F_2$  kompakt, andernfalls schreibe  $F_1, F_2$  als Vereinigung endlich vieler Quader und gehe zu den offenen bzw. abgeschlossenen Quadern über. Dabei ändert sich  $\lambda(F_2 \setminus F_1) = \lambda(F_2) - \lambda(F_1)$  nicht. Es folgt

$$\partial E = \overline{E} \setminus \text{int}(E) \subset F_2 \setminus F_1 \quad \Rightarrow \quad \overline{\text{vol}}^n(\partial E) \leq \lambda^n(F_2 \setminus F_1) < \varepsilon.$$

Sei jetzt umgekehrt  $\overline{\text{vol}}^n(\partial E) = 0$ , das heißt zu  $\varepsilon > 0$  gibt es eine Figur  $F \supset \partial E$  mit  $\lambda^n(F) < \varepsilon$ . Indem wir  $F$  als endliche Vereinigung von Quadern schreiben und deren Kanten etwas vergrößern, können wir annehmen, dass  $F$  offen und damit  $\mathbb{R}^n \setminus F$  abgeschlossen ist. Damit erhalten wir

$$\inf_{\mathbb{R}^n \setminus F} f > 0 \quad \text{für } f(x) = \max\{\text{dist}(x, E), \text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus E)\}.$$

Denn  $f$  ist stetig und  $f(x) \rightarrow \infty$  mit  $|x| \rightarrow \infty$ , da  $E$  beschränkt, also nimmt  $f$  das Infimum in einem Punkt  $x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus F$  an. Wäre  $f(x_0) = 0$  so folgt  $x_0 \in \overline{E} \cap \overline{\mathbb{R}^n \setminus E} = \partial E \subset F$ , ein Widerspruch.

Jetzt verwende Lemma 1.2 und erhalte Figuren  $F_k(E) \subset E \subset F^k(E)$ , wobei nach (ii)

$$F^k(E) \setminus F_k(E) \subset \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq 2^{-k} \sqrt{n}\}.$$

Es folgt  $F^k(E) \setminus F_k(E) \subset F$  und folglich  $\lambda^n(F^k(E) \setminus F_k(E)) \leq \lambda^n(F) < \varepsilon$  für  $k$  hinreichend groß. Nach Lemma 1.1 ist damit  $E$  quadrierbar.  $\square$



## 2 Äußere Maße und Maße

Im Unterschied zum Inhalt ist der Definitionsbereich eines Maßes eine  $\sigma$ -Algebra, also abgeschlossen unter abzählbaren Mengenoperationen, und das Maß ist darauf  $\sigma$ -additiv, das heißt es gilt für abzählbar viele, paarweise disjunkte Mengen  $A_i$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Hier steht der Buchstabe  $\sigma$  für „abzählbar unendlich“, in Abgrenzung zu „endlich“.

Wir beginnen mit einigen Vorbemerkungen zum Umgang mit den Symbolen  $\infty$  (genauer:  $+\infty$ ) und  $-\infty$ . Auf der erweiterten Zahlengeraden  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  sind die Ordnungsrelation  $-\infty < a < \infty$  für  $a \in \mathbb{R}$  und der Konvergenzbegriff auf naheliegende Weise gegeben.

**Definition 2.1 (Konvergenz in  $\overline{\mathbb{R}}$ )** Eine Folge  $s_k \in \overline{\mathbb{R}}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) konvergiert gegen  $s \in \overline{\mathbb{R}}$ , falls eine der folgenden Alternativen gilt:

- (i)  $s \in \mathbb{R}$ , und für jedes  $\varepsilon > 0$  gilt  $s_k \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subset \mathbb{R}$  für  $k$  hinreichend groß.
- (ii)  $s = \infty$ , und für jedes  $r \in \mathbb{R}$  gilt  $s_k \in (r, \infty]$  für  $k$  hinreichend groß.
- (iii)  $s = -\infty$ , und für jedes  $r \in \mathbb{R}$  gilt  $s_k \in [-\infty, r)$  für  $k$  hinreichend groß.

Eine Folge  $s_k \in \mathbb{R}$  ist genau dann in  $\overline{\mathbb{R}}$  konvergent, wenn sie entweder in  $\mathbb{R}$  konvergiert oder bestimmt divergiert gegen  $\infty$  bzw. gegen  $-\infty$ . Der Grenzwert einer monoton wachsenden Folge, bzw. einer Reihe mit nichtnegativen Gliedern, ist also immer existent. Die Addition und Multiplikation wird wie folgt auf  $\overline{\mathbb{R}}$  fortgesetzt:

$+$	$-\infty$	$\mathbb{R}$	$+\infty$	$\cdot$	$0$	$\mathbb{R}^+$	$\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$		$0$	$0$	$0$	$0$
$\mathbb{R}$	$-\infty$	$\mathbb{R}$	$+\infty$	$\mathbb{R}^+$	$0$	$\mathbb{R}^+$	$\infty$
$+\infty$		$+\infty$	$+\infty$	$\infty$	$0$	$\infty$	$\infty$

Die Regel  $0 \cdot \infty = 0$  ist nicht direkt begründet, sie wird sich aber als praktisch erweisen. Schließlich verwenden wir die Vereinbarungen

$$\sup \emptyset = -\infty \quad \text{und} \quad \inf \emptyset = +\infty.$$

Diese sind konsistent mit der Tatsache, dass für Mengen  $A, B \subset \mathbb{R}$  stets gilt:

$$A \subset B \quad \Rightarrow \quad \sup A \leq \sup B \quad \text{sowie} \quad \inf A \geq \inf B.$$

**Definition 2.2 (äußeres Maß)** Sei  $X$  eine Menge. Eine Funktion  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\mu(\emptyset) = 0$  heißt äußeres Maß auf  $X$ , falls gilt:

$$(2.1) \quad A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Oft spricht man der Kürze halber auch von einem Maß, wenn keine Misverständnisse entstehen können (vgl. Definition 2.6). Für eine endliche Überdeckung folgt aus Definition 2.2, indem wir  $A_i = \emptyset$  für  $i > k$  setzen,

$$A \subset \bigcup_{i=1}^k A_i \quad \Rightarrow \quad \mu(A) \leq \sum_{i=1}^k \mu(A_i).$$

Insbesondere ergibt sich

$$(2.2) \quad A \subset B \quad \Rightarrow \quad \mu(A) \leq \mu(B) \quad (\text{Monotonie von } \mu).$$

Weiter haben wir

$$(2.3) \quad \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad (\sigma\text{-Subadditivität}).$$

Umgekehrt folgt aus (2.2) und (2.3) offensichtlich die Eigenschaft (2.1).

**Beispiel 2.1** Der äußere Jordansche Inhalt  $\overline{\text{vol}}^1$  ist kein äußeres Maß auf  $\mathbb{R}$ . Mit der Abzählung  $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{q_k\}$  gilt nämlich, vgl. Beispiel 1.1,

$$\overline{\text{vol}}^1(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 1 > 0 = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{\text{vol}}^1(\{q_k\}).$$

Auch der innere Jordansche Inhalt  $\underline{\text{vol}}^1$  ist kein äußeres Maß. Denn mit  $E_k = [0, 1] \setminus \bigcup_{i=k}^{\infty} \{q_i\}$  gilt, da  $\{q_k, q_{k+1}, \dots\}$  dicht in  $[0, 1]$  ist,

$$[0, 1] = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \quad \text{aber} \quad \underline{\text{vol}}^1([0, 1]) = 1 > 0 = \sum_{k=1}^{\infty} \underline{\text{vol}}^1(E_k).$$

**Definition 2.3 (Messbarkeit)** Sei  $\mu$  äußeres Maß auf  $X$ . Die Menge  $A \subset X$  heißt  $\mu$ -messbar, falls gilt

$$(2.4) \quad \mu(S) \geq \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A) \quad \text{für alle } S \subset X.$$

Die umgekehrte Ungleichung in (2.4) folgt mit  $S = (S \cap A) \cup (S \setminus A)$  aus (2.3), also gilt

$$(2.5) \quad A \text{ messbar} \quad \Rightarrow \quad \mu(S) = \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A) \quad \forall S \subset X.$$

Wir wollen die Definitionen nun an ein paar einfachen Beispielen betrachten.

**Beispiel 2.2** Für einen Punkt  $x \in X$  ist das zugehörige Diracmaß gegeben durch

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in A \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es gilt  $\delta_x(A) \in \{0, 1\}$  und  $\delta_x(\emptyset) = 0$  per Definition. Ist eine Überdeckung  $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$  gegeben und ist  $x \in A$ , so folgt  $x \in A_k$  für (mindestens) ein  $k$ . Hieraus folgt die Eigenschaft (2.1), denn im Fall  $x \notin A$  gilt ohnehin  $\delta_x(A) = 0$ . Alle Mengen  $A \subset X$  sind messbar bzgl.  $\delta_x$ . Ist nämlich  $x \notin S$  so sind beide Seiten in (2.4) Null, und für  $x \in S$  liegt  $x$  in genau einer der Mengen  $S \cap A$  bzw.  $S \setminus A$ .



**Beispiel 2.3** Sei  $N_n = \{1, 2, \dots, n\}$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Auf einer Menge  $X$  definieren wir das Zählmaß  $\text{card} : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$  durch

$$\text{card}(A) = \begin{cases} \sup\{n \in \mathbb{N} : \text{es gibt eine injektive Abbildung } \varphi : N_n \rightarrow A\} & \text{falls } A \neq \emptyset \\ 0 & \text{falls } A = \emptyset. \end{cases}$$

Um die Maßeigenschaft (2.1) für  $\text{card}$  zu zeigen, erinnern wir an das Schubfachprinzip

$$\varphi : N_n \rightarrow N_m \text{ injektiv} \quad \Rightarrow \quad n \leq m.$$

Dies wird durch Induktion über  $m$ , jeweils für alle  $n \in \mathbb{N}$ , bewiesen. Der Induktionsanfang  $m = 1$  ist trivial. Ist eine injektive Abbildung  $\varphi : N_n \rightarrow N_{m+1}$  gegeben, wobei  $m \geq 1$  und oBdA  $n \geq 2$ , so erhalten wir die Injektion

$$\varphi' : N_{n-1} \rightarrow N_m, \quad \varphi'(i) = \begin{cases} \varphi(i) & \text{falls } \varphi(i) \neq m+1, \\ \varphi(n) & \text{falls } \varphi(i) = m+1. \end{cases}$$

Es folgt induktiv  $n-1 \leq m$ , also  $n \leq m+1$ . Insbesondere gilt  $\text{card}(N_n) = n$  für  $n \in \mathbb{N}$ . Ist  $\text{card}(A) = n \in \mathbb{N}$ , so gibt es eine Injektion  $\varphi : N_n \rightarrow A$  und diese ist sogar bijektiv, denn andernfalls gäbe es eine Injektion  $\varphi' : N_{n+1} \rightarrow A$ . Wir behaupten nun zunächst

$$\text{card}(A_1 \cup A_2) \leq \text{card}(A_1) + \text{card}(A_2).$$

Dazu können wir annehmen, dass  $\text{card}(A_i) = \nu_i \in \mathbb{N}$  für  $i = 1, 2$ , das heißt es gibt Bijektionen  $\varphi_i : N_{\nu_i} \rightarrow A_i$ . Ist eine injektive Abbildung  $\varphi : N_k \rightarrow A_1 \cup A_2$  gegeben, so definieren wir

$$\Phi : N_k \rightarrow N_{\nu_1 + \nu_2}, \quad \Phi(i) = \begin{cases} \varphi_1^{-1}(\varphi(i)) & \text{falls } \varphi(i) \in A_1 \\ \nu_1 + \varphi_2^{-1}(\varphi(i)) & \text{sonst.} \end{cases}$$

$\Phi$  ist wohldefiniert und injektiv, also folgt aus dem Schubfachprinzip  $k \leq \nu_1 + \nu_2$ , was zu zeigen war. Daraus ergibt sich weiter die  $\sigma$ -Subadditivität

$$\text{card}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{card}(A_i).$$

Denn ist die rechte Seite endlich, so gibt es ein  $k \in \mathbb{N}$  mit  $A_i = \emptyset$  für alle  $i > k$ , und die endliche Ungleichung  $\text{card}(\bigcup_{i=1}^k A_i) \leq \sum_{i=1}^k \text{card}(A_i)$  folgt aus dem oben behandelten Fall  $k = 2$  sofort durch Induktion. Aus der Definition folgt außerdem die Monotonie

$$A \subset B \quad \Rightarrow \quad \text{card}(A) \leq \text{card}(B).$$

Damit ist gezeigt, dass  $\text{card}$  ein äußeres Maß ist.

Wir behaupten weiter, dass alle Mengen  $A \subset X$   $\text{card}$ -messbar sind. Wähle dazu für  $S \subset X$ , oBdA  $\text{card}(S) < \infty$ , Bijektionen  $\varphi_1 : N_{\nu_1} \rightarrow S \cap A$  und  $\varphi_2 : N_{\nu_2} \rightarrow S \setminus A$  und setze

$$\varphi : N_{\nu_1 + \nu_2} \rightarrow S, \quad \varphi(i) = \begin{cases} \varphi_1(i) & \text{falls } i \in \{1, \dots, \nu_1\} \\ \varphi_2(i - \nu_1) & \text{falls } i \in \{\nu_1 + 1, \dots, \nu_1 + \nu_2\}. \end{cases}$$

Die Abbildung  $\varphi$  ist wohldefiniert und injektiv, also schließen wir

$$\text{card}(S) \geq \nu_1 + \nu_2 = \text{card}(S \cap A) + \text{card}(S \setminus A).$$

**Beispiel 2.4** Auf jeder Menge  $X$  erhalten wir ein blödes Maß  $\beta$  durch

$$\beta(A) = \begin{cases} 0 & \text{falls } A = \emptyset \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Der Nachweis von (2.1) für  $\beta$  ist trivial. Es sind nur  $\emptyset$  und  $X$   $\beta$ -messbar, denn mit der Wahl  $S = X$  in (2.4) folgt, falls  $A \subset X$   $\beta$ -messbar ist,

$$1 \geq \beta(X) = \beta(A) + \beta(X \setminus A).$$

**Beispiel 2.5** Für eine Familie  $\mu_\lambda$ ,  $\lambda \in \Lambda$  von äußeren Maßen auf  $X$  sei

$$\mu(A) = \sup_{\lambda \in \Lambda} \mu_\lambda(A).$$

Dann ist  $\mu$  ein äußeres Maß auf  $X$ , denn für  $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  und festes  $\lambda \in \Lambda$  gilt

$$\mu_\lambda(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_\lambda(A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Bilde nun auf der linken Seite das Supremum über alle  $\lambda \in \Lambda$  und erhalte (2.1). Es ist im allgemeinen nicht klar, welche Mengen bzgl.  $\mu$  messbar sind.

Die folgenden beiden Konstruktionen von Maßen werden öfters benutzt.

**Satz 2.1 (Bildmaß)** Seien  $X, Y$  Mengen und  $f : X \rightarrow Y$ . Für ein gegebenes äußeres Maß  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  erhält man ein äußeres Maß  $f(\mu)$  auf  $Y$  durch

$$f(\mu) : 2^Y \rightarrow [0, \infty], \quad f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

$f(\mu)$  heißt Bildmaß von  $\mu$  unter  $f$ , und es gilt für alle  $B \subset Y$

$$(2.6) \quad f^{-1}(B) \text{ } \mu\text{-messbar} \quad \Rightarrow \quad B \text{ } f(\mu)\text{-messbar}.$$

BEWEIS: Für  $B \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$  gilt  $f^{-1}(B) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i)$  und folglich nach Definition 2.1

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(f^{-1}(B_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} f(\mu)(B_i).$$

Außerdem ist trivialerweise  $f(\mu)(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$ . Nun ist nach Definition von  $f(\mu)$  die Menge  $B \subset Y$  genau dann  $f(\mu)$ -messbar, wenn gilt:

$$\mu(f^{-1}(T)) \geq \mu(f^{-1}(T \cap B)) + \mu(f^{-1}(T \setminus B)) \quad \text{für alle } T \subset Y.$$

Da  $f^{-1}(T \cap B) = f^{-1}(T) \cap f^{-1}(B)$  sowie  $f^{-1}(T \setminus B) = f^{-1}(T) \setminus f^{-1}(B)$ , ist dies äquivalent zu

$$\mu(f^{-1}(T)) \geq \mu(f^{-1}(T) \cap f^{-1}(B)) + \mu(f^{-1}(T) \setminus f^{-1}(B)) \quad \text{für alle } T \subset Y.$$

Dagegen ist  $f^{-1}(B)$  genau dann  $\mu$ -messbar, wenn

$$\mu(S) \geq \mu(S \cap f^{-1}(B)) + \mu(S \setminus f^{-1}(B)) \quad \text{für alle } S \subset X.$$

Also folgt die Behauptung (2.6), indem wir  $S = f^{-1}(T)$  setzen. □

**Satz 2.2 (Einschränkung)** Sei  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  ein äußeres Maß auf  $X$ . Für eine gegebene Menge  $M \subset X$  erhält man ein äußeres Maß  $\mu \llcorner M$  auf  $X$  durch

$$\mu \llcorner M : 2^X \rightarrow [0, \infty], \mu \llcorner M(A) = \mu(A \cap M).$$

$\mu \llcorner M$  heißt Einschränkung von  $\mu$  auf  $M$ , und es gilt

$$(2.7) \quad A \text{ } \mu\text{-messbar} \quad \Rightarrow \quad A \text{ } \mu \llcorner M\text{-messbar}.$$

BEWEIS: Aus der Definition folgt sofort, dass  $\mu \llcorner M$  ein äußeres Maß ist. Weiter gilt für  $A \subset X$   $\mu$ -messbar und  $S \subset X$  beliebig

$$\begin{aligned} \mu \llcorner M(S) &= \mu(S \cap M) \\ &\geq \mu((S \cap M) \cap A) + \mu((S \cap M) \setminus A) \quad (\text{da } A \text{ } \mu\text{-messbar}) \\ &= \mu((S \cap A) \cap M) + \mu((S \setminus A) \cap M) \\ &= \mu \llcorner M(S \cap A) + \mu \llcorner M(S \setminus A). \end{aligned}$$

Dies beweist Behauptung (2.7). □

**Definition 2.4 (Nullmenge)** Sei  $\mu$  äußeres Maß auf  $X$ . Die Menge  $N \subset X$  heißt  $\mu$ -Nullmenge, falls  $\mu(N) = 0$ .

**Proposition 2.1 (Messbarkeit von Nullmengen)** Sei  $\mu$  äußeres Maß auf  $X$ . Dann gilt:

$$(2.8) \quad N \text{ Nullmenge} \quad \Rightarrow \quad N \text{ } \mu\text{-messbar}$$

$$(2.9) \quad N_1, N_2, \dots \text{ Nullmengen} \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k \text{ Nullmenge}.$$

BEWEIS: Sei  $\mu(N) = 0$ . Für  $S \subset X$  gilt mit der Monotonie des äußeren Maßes  $\mu$

$$\mu(S) \geq \mu(S \setminus N) = \underbrace{\mu(S \cap N)}_{\leq \mu(N)=0} + \mu(S \setminus N).$$

Das zeigt (2.8), und (2.9) folgt direkt aus Definition 2.2. □

Wir wollen nun allgemein die Struktur des Systems  $\mathcal{M}$  der  $\mu$ -messbaren Mengen untersuchen. Auf jeden Fall enthält  $\mathcal{M}$  alle Nullmengen  $N \subset X$ , und damit auch deren Komplemente  $X \setminus N$ , wie unten in Satz 2.3 gezeigt. Es kann sein, dass keine anderen Mengen messbar sind, zum Beispiel ist  $\mathcal{M} = \{\emptyset, X\}$  in Beispiel 2.4. Aber in den relevanten Fällen erwarten wir doch, dass es viele weitere messbare Mengen gibt. Jedenfalls ist das System  $\mathcal{M}$  unter abzählbaren Vereinigungen und Durchschnitten abgeschlossen, im Gegensatz zum Beispiel zu den quadrierbaren Mengen  $\mathcal{Q}^n$  aus Satz 1.5. Dies soll nun gezeigt werden.

**Definition 2.5 ( $\sigma$ -Algebra)** Ein Mengensystem  $\mathcal{A} \subset 2^X$  heißt  $\sigma$ -Algebra, wenn gilt:

- (i)  $X \in \mathcal{A}$
- (ii)  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$
- (iii)  $A_i \in \mathcal{A} \text{ für } i = 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$

Eine  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A}$  ist auch unter abzählbaren Durchschnitten abgeschlossen, das heißt es gilt

$$(2.10) \quad A_i \in \mathcal{A} \quad \text{für } i = 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

Dies folgt sofort aus der Darstellung  $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = X \setminus (\bigcup_{i=1}^{\infty} X \setminus A_i)$ . Außerdem stellen wir fest: jede  $\sigma$ -Algebra ist ein Ring, denn nach Definition gilt  $\emptyset = X \setminus X \in \mathcal{A}$  sowie

$$A, B \in \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad A \setminus B = A \cap (X \setminus B) \in \mathcal{A}.$$

**Lemma 2.1** *Seien  $A_1, A_2, \dots, A_k \subset X$  paarweise disjunkt und  $\mu$ -messbar. Dann gilt*

$$\mu(S \cap \bigcup_{i=1}^k A_i) = \sum_{i=1}^k \mu(S \cap A_i) \quad \text{für alle } S \subset X.$$

BEWEIS: Für  $k = 1$  ist die Aussage trivial, und für  $k \geq 2$  folgt induktiv, da  $A_k$   $\mu$ -messbar,

$$\begin{aligned} \mu(S \cap \bigcup_{i=1}^k A_i) &= \mu((S \cap \bigcup_{i=1}^k A_i) \cap A_k) + \mu((S \cap \bigcup_{i=1}^k A_i) \setminus A_k) \\ &= \mu(S \cap A_k) + \mu(S \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i) \\ &= \sum_{i=1}^k \mu(S \cap A_i). \end{aligned}$$

□

**Satz 2.3 (äußeres Maß  $\Rightarrow$  Maß)** *Sei  $\mu : X \rightarrow [0, \infty]$  ein äußeres Maß. Dann ist das System  $\mathcal{M}$  der  $\mu$ -messbaren Mengen eine  $\sigma$ -Algebra, und es gilt*

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad \text{für abzählbar viele, paarweise disjunkte } A_i \in \mathcal{M}.$$

BEWEIS: Es gilt  $X \in \mathcal{M}$ , denn für jede Menge  $S \subset X$  ist

$$\mu(S \cap X) + \mu(S \setminus X) = \mu(S) + \mu(\emptyset) = \mu(S).$$

Mit  $A \in \mathcal{M}$  folgt auch  $X \setminus A \in \mathcal{M}$ , denn für  $S \subset X$  gilt

$$\mu(S \cap (X \setminus A)) + \mu(S \setminus (X \setminus A)) = \mu(S \setminus A) + \mu(S \cap A) = \mu(S).$$

Als nächstes zeigen wir, dass  $A \cup B \in \mathcal{M}$  für  $A, B \in \mathcal{M}$ , und zwar gilt für  $S \subset X$  beliebig

$$\begin{aligned} \mu(S \cap (A \cup B)) + \mu(S \setminus (A \cup B)) &\leq \mu(S \cap A) + \mu((S \setminus A) \cap B) + \mu((S \setminus A) \setminus B) \\ &= \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A) \quad (\text{da } B \in \mathcal{M}) \\ &= \mu(S) \quad (\text{da } A \in \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Hieraus folgt auch  $A \cap B = X \setminus ((X \setminus A) \cup (X \setminus B)) \in \mathcal{M}$  und  $A \setminus B = A \cap (X \setminus B) \in \mathcal{M}$ . Per Induktion erhalten wir, dass  $\mathcal{M}$  unter endlichen Vereinigungen und Durchschnitten abgeschlossen ist. Jetzt zeigen wir die noch fehlende Behauptung

$$A_i \in \mathcal{M} \quad \text{für } i = 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}.$$

Wir können dazu annehmen, dass  $A_i \cap A_j = \emptyset$  für  $i \neq j$ , andernfalls betrachten wir  $\tilde{A}_i = A_i \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{i-1})$ . Für  $S \subset X$  beliebig folgt, da  $\bigcup_{i=1}^k A_i \in \mathcal{M}$ ,

$$\mu(S) = \mu(S \cap \bigcup_{i=1}^k A_i) + \mu(S \setminus \bigcup_{i=1}^k A_i) \geq \sum_{i=1}^k \mu(S \cap A_i) + \mu(S \setminus A).$$

Im zweiten Schritt wurden dabei Lemma 2.1 und die Monotonie von  $\mu$  benutzt. Mit  $k \rightarrow \infty$  erhalten wir schließlich wegen der  $\sigma$ -Subadditivität von  $\mu$

$$\mu(S) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S \cap A_i) + \mu(S \setminus A) \geq \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (S \cap A_i)\right) + \mu(S \setminus A) = \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A).$$

Also ist  $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$   $\mu$ -messbar. Schließlich folgt, indem wir in Lemma 2.1  $S = X$  wählen,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \geq \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right),$$

wobei wieder die  $\sigma$ -Subadditivität und die Monotonie benutzt wurden. benutzt wurden. Damit ist der Satz bewiesen.  $\square$

An dieser Stelle führen wir den Begriff des Maßes ein, wie er in der Wahrscheinlichkeitstheorie üblicherweise definiert wird; dabei ist eine  $\sigma$ -Algebra ad hoc gegeben.

**Definition 2.6 (Maß)** Sei  $\mathcal{A} \subset 2^X$  eine  $\sigma$ -Algebra. Eine Funktion  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\mu(\emptyset) = 0$  heißt Maß auf  $\mathcal{A}$ , falls für jede paarweise disjunkte Folge  $A_i \in \mathcal{A}$  gilt:

$$(2.11) \quad \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad (\sigma\text{-Additivität}).$$

Das Tripel  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  wird dann auch als Maßraum bezeichnet.

Für jedes äußere Maß  $\mu$  auf  $X$  erhält man nach Satz 2.3 kanonisch ein Maß, indem man  $\mu$  auf die  $\sigma$ -Algebra der  $\mu$ -messbaren Mengen einschränkt.

**Satz 2.4 (Stetigkeitseigenschaften von Maßen)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $\mathcal{A}$ . Dann gelten für Mengen  $A_1, A_2, \dots$  in  $\mathcal{A}$  folgende Aussagen:

- (i)  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k)$  (Stetigkeit von unten)
- (ii)  $A_1 \supset A_2 \supset \dots, \mu(A_1) < \infty \Rightarrow \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k)$  (Stetigkeit von oben).

BEWEIS: Für (i) setze  $\tilde{A}_k = A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$  und berechne unter Verwendung von (2.11)

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \tilde{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(\tilde{A}_i) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^k \tilde{A}_i\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k).$$

Für (ii) betrachte die aufsteigende Folge  $A'_k = A_1 \setminus A_k$ . Es gilt

$$\mu(A_1) = \mu(A_1 \cap A_k) + \mu(A_1 \setminus A_k) = \mu(A_k) + \mu(A'_k).$$

Daraus folgt wegen (i)

$$\mu(A_1) - \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A'_k) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i\right) = \mu\left(A_1 \setminus \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

□

**Beispiel 2.6** Die Bedingung  $\mu(A_1) < \infty$  in (iii) kann natürlich durch  $\mu(A_k) < \infty$  für ein  $k$  ersetzt werden. Sie kann aber nicht ganz weggelassen werden. Mit  $A_k = \{k, k+1, \dots\} \subset \mathbb{N}$  gilt zum Beispiel  $\text{card}(A_k) = \infty$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ , aber  $\text{card}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \text{card}(\emptyset) = 0$ .

### 3 Der Fortsetzungssatz von Caratheodory

Der elementargeometrische Inhalt liefert eine vernünftige Definition des  $n$ -dimensionalen Volumens auf der Klasse der Quader  $\mathcal{P}^n$  oder der Klasse der Figuren  $\mathcal{F}^n$ . Wir stehen nun vor der Aufgabe, diesen Inhalt zu einem äußeren Maß auf das System aller Teilmengen des  $\mathbb{R}^n$  fortzusetzen, wobei die Mengen in  $\mathcal{P}^n$  natürlich messbar sein sollen. In diesem Kapitel beschreiben wir in abstraktem Rahmen die Konstruktion der Maßfortsetzung nach Caratheodory und beantworten auch die Frage, in welchem Umfang die Fortsetzung eindeutig bestimmt ist. Die Spezialisierung auf das Volumenmaß im  $\mathbb{R}^n$ , genauer das Lebesguemaß, folgt im nächsten Kapitel.

**Definition 3.1 (Fortsetzung)** Sei  $\lambda$  ein Inhalt auf dem Halbring  $\mathcal{P} \subset 2^X$ . Ein äußeres Maß  $\mu$  auf  $X$  heißt Fortsetzung von  $\lambda$ , falls folgende zwei Bedingungen gelten:

(i)  $\mu|_{\mathcal{P}} = \lambda$ , das heißt  $\mu(P) = \lambda(P)$  für alle  $P \in \mathcal{P}$

(ii)  $\mathcal{P} \subset \mathcal{M}$ , also alle Mengen in  $\mathcal{P}$  sind  $\mu$ -messbar.

Nach Satz 2.3 muss ein Inhalt  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$ , der zu einem äußeren Mass fortsetzbar ist,  $\sigma$ -additiv sein. Hierfür wird die folgende Bezeichnung eingeführt.

**Definition 3.2 (Prämaß)** Sei  $\mathcal{P} \subset 2^X$  ein Halbring. Eine Funktion  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\lambda(\emptyset) = 0$  heißt Prämaß, wenn gilt: ist  $P \in \mathcal{P}$  und  $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  mit  $P_i \in \mathcal{P}$  paarweise disjunkt, so folgt

$$\lambda(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i) \quad (\sigma\text{-Additivität auf } \mathcal{P}).$$

**Lemma 3.1** Ist  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  ein Prämaß,  $\mathcal{R}$  der von  $\mathcal{P}$  erzeugte Ring und  $\bar{\lambda} : \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$  der eindeutig bestimmte Inhalt mit  $\bar{\lambda}|_{\mathcal{P}} = \lambda$  (siehe Satz 1.4), so ist  $\bar{\lambda}$  ebenfalls ein Prämaß.

BEWEIS: Sei  $F = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$  mit  $F, F_i \in \mathcal{R}$  und  $F_i$  paarweise disjunkt. Nach Satz 1.3 gibt es dann paarweise disjunkte Zerlegungen  $F = \bigcup_{j=1}^k P_j$  und  $F_i = \bigcup_{\nu=1}^{\nu_i} P_{i,\nu}$  mit  $P_j, P_{i,\nu} \in \mathcal{P}$ . Es folgt die disjunkte Zerlegung

$$P_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_j \cap F_i) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{\nu=1}^{\nu_i} (P_j \cap P_{i,\nu}).$$

Da  $\lambda$  Prämaß, folgt hieraus  $\lambda(P_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{\nu=1}^{\nu_i} \lambda(P_j \cap P_{i,\nu}) = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{\lambda}(P_j \cap F_i)$ , und somit

$$\bar{\lambda}(F) = \sum_{j=1}^k \lambda(P_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^k \bar{\lambda}(P_j \cap F_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{\lambda}(F_i).$$

□

**Satz 3.1 (Caratheodory-Fortsetzung)** Sei  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  ein Prämaß auf dem Halbring  $\mathcal{P} \subset 2^X$ . Definiere  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  durch

$$(3.1) \quad \mu(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i) : P_i \in \mathcal{P}, E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \right\}.$$

Dann ist  $\mu$  eine Fortsetzung von  $\lambda$ . Man bezeichnet  $\mu$  als das durch  $\lambda$  induzierte, äußere Maß oder als Caratheodory-Fortsetzung von  $\lambda$ .

BEWEIS: Wir nehmen zunächst an, dass  $\mathcal{P}$  sogar ein Ring ist und zeigen in diesem Fall die Aussage in drei Schritten.

**Schritt 1:**  $\mu$  ist äußeres Maß

Mit  $P_i = \emptyset$  für alle  $i \in \mathbb{N}$  folgt  $\mu(\emptyset) = 0$  nach (3.1). Sei  $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$  mit  $E, E_i \subset X$  und oBdA  $\mu(E_i) < \infty$ . Wähle Überdeckungen  $E_i \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{i,j}$  mit  $P_{i,j} \in \mathcal{P}$ , so dass zu gegebenem  $\varepsilon > 0$  gilt:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda(P_{i,j}) < \mu(E_i) + 2^{-i}\varepsilon \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N}.$$

Dann folgt  $E \subset \bigcup_{i,j=1}^{\infty} P_{i,j}$  und somit

$$\mu(E) \leq \sum_{i,j=1}^{\infty} \lambda(P_{i,j}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} (\mu(E_i) + 2^{-i}\varepsilon) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) + \varepsilon.$$

Mit  $\varepsilon \searrow 0$  folgt  $\mu(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$ .

**Schritt 2:**  $\mu(P) = \lambda(P)$  für  $P \in \mathcal{P}$ .

Die Ungleichung  $\mu(P) \leq \lambda(P)$  folgt direkt aus (3.1), indem wir  $P_1 = P$  und  $P_i = \emptyset$  für  $i \geq 2$  wählen. Für die umgekehrte Ungleichung  $\lambda(P) \leq \mu(P)$  ist zu zeigen:

$$P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \text{ mit } P_i \in \mathcal{P} \quad \Rightarrow \quad \lambda(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i).$$

Wir betrachten die paarweise disjunkten Mengen  $Q_i = (P_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} P_j) \cap P \in \mathcal{P}$  und schließen

$$\lambda(P) = \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(Q_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i).$$

**Schritt 3:** Jedes  $P \in \mathcal{P}$  ist  $\mu$ -messbar

Sei  $P \in \mathcal{P}$  und  $S \subset X$  beliebig. Zu  $\varepsilon > 0$  wähle  $P_i \in \mathcal{P}$  für  $i = 1, 2, \dots$ , so dass  $S \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  und  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i) \leq \mu(S) + \varepsilon$ . Es folgt  $S \cap P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \cap P)$  sowie  $S \setminus P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \setminus P)$ . Aus (3.1) erhalten wir

$$\mu(S \cap P) + \mu(S \setminus P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i \cap P) + \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i \setminus P) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i) \leq \mu(S) + \varepsilon.$$

Mit  $\varepsilon \searrow 0$  folgt Schritt 3 und der Satz ist bewiesen, wenn  $\mathcal{P}$  ein Ring ist.

Sei nun  $\mathcal{P}$  lediglich ein Halbring, und  $\mathcal{R}$  der von  $\mathcal{P}$  erzeugte Ring. Nach Satz 1.4 gibt es einen eindeutig bestimmten Inhalt  $\bar{\lambda}: \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\bar{\lambda}|_{\mathcal{P}} = \lambda$ , und  $\bar{\lambda}$  ist ein Prämaß nach Lemma 3.1. Wir zeigen:

$$(3.2) \quad \text{Mit } \bar{\mu}(E) = \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \bar{\lambda}(F_i) : F_i \in \mathcal{R}, E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right\} \quad \text{gilt} \quad \bar{\mu} = \mu.$$



Für beliebiges  $E \subset X$  ergibt sich die Ungleichung  $\bar{\mu}(E) \leq \mu(E)$  direkt aus den Definitionen wegen  $\bar{\lambda}|_{\mathcal{P}} = \lambda$ . Ist andererseits  $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$  mit  $F_i \in \mathcal{R}$ , so gibt es nach Satz 1.3 eine Darstellung  $F_i = \bigcup_{\nu=1}^{\nu_i} P_{i,\nu}$  mit paarweise disjunkten  $P_{i,\nu} \in \mathcal{P}$ , und es folgt

$$\mu(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{\nu=1}^{\nu_i} \lambda(P_{i,\nu}) = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{\lambda}(F_i).$$

Durch Bilden des Infimums über alle Überdeckungen  $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$  mit  $F_i \in \mathcal{R}$  folgt die umgekehrte Ungleichung  $\mu(E) \leq \bar{\mu}(E)$ . Nun ist, wie oben gezeigt,  $\bar{\mu}$  Fortsetzung von  $\bar{\lambda}$  und damit folgt aus (3.2) die Behauptung des Satzes.  $\square$

Es stellt sich nun die Frage, welche Mengen  $E \subset X$  bezüglich der Caratheodory-Fortsetzung messbar sind. Zunächst sind da alle Mengen in  $\mathcal{P}$  nach Satz 3.1. Nach Satz 2.3 kommen dann alle abzählbaren Vereinigungen und Durchschnitte dieser Mengen hinzu, und dann wiederum deren abzählbare Vereinigungen und Durchschnitte, und so fort. Um dies umfassend zu beschreiben, ist der folgende Begriff zweckmäßig.

**Definition 3.3 (erzeugte  $\sigma$ -Algebra)** Für ein Mengensystem  $\mathcal{E} \subset 2^X$  sei

$$(3.3) \quad \sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra in } X \text{ mit } \mathcal{E} \subset \mathcal{A} \}.$$

Dann ist  $\sigma(\mathcal{E})$  eine  $\sigma$ -Algebra, die  $\mathcal{E}$  enthält, und heißt die von  $\mathcal{E}$  erzeugte  $\sigma$ -Algebra. Es gilt

$$(3.4) \quad \mathcal{A} \text{ } \sigma\text{-Algebra mit } \mathcal{E} \subset \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad \sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}.$$

**Beispiel 3.1** Ist  $E \subset X$  und  $\mathcal{E} = \{E\}$ , so gilt  $\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, E, X \setminus E, X\}$ .

Während wir für den erzeugten Ring eine einfache konstruktive Beschreibung in Satz 1.3 angeben konnten, ist das für die erzeugte  $\sigma$ -Algebra im Allgemeinen nicht möglich. Die Anwendung der Definition stützt sich deshalb stets auf die Eigenschaft (3.4), dass nämlich  $\sigma(\mathcal{E})$  – salopp gesprochen – die kleinste  $\sigma$ -Algebra ist, die  $\mathcal{E}$  enthält.

**Lemma 3.2** Sei  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  ein Prämaß. Ist das äußere Maß  $\tilde{\mu}$  eine Fortsetzung von  $\lambda$ , so ist jede Menge  $A \in \sigma(\mathcal{P})$   $\tilde{\mu}$ -messbar.

BEWEIS: Nach Satz 2.3 ist das System  $\tilde{\mathcal{M}}$  der  $\tilde{\mu}$ -messbaren Mengen eine  $\sigma$ -Algebra, die nach Definition  $\mathcal{P}$  enthält. Also folgt  $\sigma(\mathcal{P}) \subset \tilde{\mathcal{M}}$  aus (3.4).  $\square$

**Definition 3.4 (Regularität)** Eine äußeres Maß  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  heißt regulär, wenn es zu jeder Menge  $D \subset X$  eine  $\mu$ -messbare Menge  $E \subset X$  gibt mit  $D \subset E$  und  $\mu(E) = \mu(D)$ .

Vorsicht: Gilt hier  $\mu(E \setminus D) = 0$ , so ist  $D = E \setminus (E \setminus D)$  nach (2.8) bereits messbar.

**Proposition 3.1 (Regularität der Caratheodory-Fortsetzung)** Sei  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  die Caratheodory-Fortsetzung des Prämaßes  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$ . Dann gibt es zu jedem  $D \subset X$  eine Menge  $E \in \sigma(\mathcal{P})$  mit  $E \supset D$  und  $\mu(E) = \mu(D)$ . Insbesondere ist  $\mu$  ein reguläres Maß.

BEWEIS: Im Fall  $\mu(D) = \infty$  können wir  $E = X$  wählen. Ist  $\mu(D) < \infty$ , so gibt es nach Definition von  $\mu$  in (3.1) zu jedem  $\nu \in \mathbb{N}$  eine Überdeckung

$$D \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^{\nu} =: E^{\nu} \text{ mit } P_i^{\nu} \in \mathcal{P} \text{ und } \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i^{\nu}) < \mu(D) + \frac{1}{\nu}.$$

Wähle  $E = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} E^{\nu}$ . Dann ist  $E \in \sigma(\mathcal{P})$  mit  $E \supset D$ , und für jedes  $\nu \in \mathbb{N}$  gilt

$$\mu(D) \leq \mu(E) \leq \mu(E^{\nu}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(P_i^{\nu}) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i^{\nu}) \leq \mu(D) + \frac{1}{\nu} < \infty,$$

das heißt  $\mu(E) = \mu(D)$ . □

Für gewisse Eigenschaften der Caratheodory-Fortsetzung wird folgende Bedingung benötigt.

**Definition 3.5 ( $\sigma$ -endliches Prämaß)** Ein Prämaß  $\lambda$  auf einem Halbring  $\mathcal{P} \subset 2^X$  heißt  $\sigma$ -endlich, wenn es eine Folge  $P_n \in \mathcal{P}$  gibt mit  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$  und  $\lambda(P_n) < \infty$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Das Zählmaß auf  $X$  ist genau dann  $\sigma$ -endlich, wenn  $X$  abzählbar ist, und das Prämaß  $\lambda$  aus Beispiel 3.2 unten ist nicht  $\sigma$ -endlich.

**Lemma 3.3** Sei  $\lambda$  ein  $\sigma$ -endliches Prämaß auf  $X$  mit Caratheodory-Fortsetzung  $\mu$ . Dann hat jede  $\mu$ -messbare Menge  $D \subset X$  eine Darstellung  $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$  für  $\mu$ -messbare  $D_n$  mit  $\mu(D_n) < \infty$  und  $D_1 \subset D_2 \subset \dots$ .

BEWEIS: Sei  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$  wie in Definition 3.5. Setze dann  $D_n = \bigcup_{k=1}^n D \cap P_k$ . □

Wir können nun im  $\sigma$ -endlichen Fall die bezüglich der Caratheodory-Fortsetzung messbaren Mengen genau charakterisieren. Die im Zusatz gegebene Präzisierung werden wir beim Beweis des Cavalierischen Prinzips in Satz 7.1 verwenden.

**Satz 3.2 (Messbarkeit bzgl. Caratheodory-Fortsetzung)** Sei  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$  ein  $\sigma$ -endliches Prämaß auf  $X$  mit Caratheodory-Fortsetzung  $\mu$ . Eine Menge  $D \subset X$  ist genau dann  $\mu$ -messbar, wenn eine der folgenden, äquivalenten Bedingungen gilt:

(i) Es gibt ein  $E \in \sigma(\mathcal{P})$  mit  $E \supset D$  und  $\mu(E \setminus D) = 0$ .

(ii) Es gibt ein  $C \in \sigma(\mathcal{P})$  mit  $C \subset D$  und  $\mu(D \setminus C) = 0$ .

**Zusatz:** Im Fall  $\mu(D) < \infty$  kann  $E = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} E^{\nu}$  gewählt werden, wobei  $E^{\nu} = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^{\nu}$  paarweise disjunkte Vereinigung von Mengen  $P_i^{\nu} \in \mathcal{P}$  mit  $E^1 \supset E^2 \supset \dots$  und  $\mu(E^1) < \infty$ .

BEWEIS: Sei (i) bzw. (ii) gegeben. Nach (2.8) sind Nullmengen messbar, ebenso Mengen aus  $\sigma(\mathcal{P})$ . Die Messbarkeit von  $D$  folgt somit aus den Darstellungen

$$D = E \setminus (E \setminus D) \quad \text{bzw.} \quad D = C \cup (D \setminus C).$$

Sei  $D$  nun umgekehrt  $\mu$ -messbar, und zunächst  $\mu(D) < \infty$ . Wähle  $E \supset D$  wie im Beweis von Proposition 3.1. Es folgt aus der Messbarkeitsdefinition

$$\mu(D) = \mu(E) = \mu(E \cap D) + \mu(E \setminus D) = \mu(D) + \mu(E \setminus D) \quad \Rightarrow \quad \mu(E \setminus D) = 0.$$

Für beliebiges messbares  $D$  sei  $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$  wie in Lemma 3.3. Wie bewiesen gibt es  $E_n \supset D_n$  mit  $E_n \in \sigma(\mathcal{P})$  und  $\mu(E_n \setminus D_n) = 0$ . Für  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \supset D$  folgt  $E \in \sigma(\mathcal{P})$  und

$$\mu(E \setminus D) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \setminus D_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \setminus D_n) = 0.$$

Damit ist Aussage (i) gezeigt. Für (ii) wähle mit Proposition 3.1 eine  $\mu$ -Nullmenge  $N \in \sigma(\mathcal{P})$  mit  $N \supset E \setminus D$  für  $E$  wie in (i), und setze  $C = E \setminus N \in \sigma(\mathcal{P})$ . Es folgt

$$C = E \setminus N \subset E \setminus (E \setminus D) = D \quad \text{und} \quad \mu(D \setminus C) = \mu(D \cap N) = 0.$$

BEWEIS ZUSATZ. Die Konstruktion in Proposition 3.1 liefert schon die Darstellung

$$E = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} E^{\nu} \quad \text{für} \quad E^{\nu} = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^{\nu} \text{ mit } P_i^{\nu} \in \mathcal{P},$$

und es gilt  $\mu(E^1) \leq \mu(D) + 1 < \infty$ . Wir können nun  $E^1 \supset E^2 \supset \dots$  annehmen, andernfalls gehen wir über zu  $\tilde{E}^{\nu} = E^1 \cap \dots \cap E^{\nu}$ . Mit der Formel  $(\bigcup_{i=1}^{\infty} P_i) \cap (\bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i) = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \cap Q_i$  sieht man, dass die  $\tilde{E}^{\nu}$  wieder abzählbare Vereinigungen von Mengen in  $\mathcal{P}$  sind. Schließlich definieren wir induktiv für  $i = 1, 2, \dots$

$$F_i^{\nu} = P_i^{\nu} \setminus F_{i-1}^{\nu}, \quad F_1^{\nu} = P_1^{\nu}.$$

Dann sind die  $F_i^{\nu}$  paarweise disjunkt, und sie können ihrerseits als disjunkte Vereinigung von endlich vielen Elementen von  $\mathcal{P}$  geschrieben werden, vgl. Definition 1.2 und Satz 1.3. Damit sind alle gewünschten Eigenschaften umgesetzt.  $\square$

Nachdem die Maßfortsetzung konstruiert ist und auch die messbaren Mengen identifiziert sind, wollen wir schließlich wissen, inwieweit das gefundene Maß eindeutig bestimmt ist bzw. durch welche Eigenschaften die gegebene Konstruktion ausgezeichnet ist. Direkt aus der Definition ergibt sich die folgende Charakterisierung:

**Lemma 3.4 (Maximalität der Caratheodory-Fortsetzung)** *Sei  $\lambda$  Prämaß auf  $\mathcal{P} \subset 2^X$ . Ist  $\mu$  die Caratheodory-Fortsetzung und  $\tilde{\mu}$  eine weitere Fortsetzung von  $\lambda$ , so gilt*

$$\tilde{\mu}(E) \leq \mu(E) \quad \text{für alle } E \subset X.$$

BEWEIS: Es gilt die Implikation

$$E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \text{ mit } P_i \in \mathcal{P} \quad \Rightarrow \quad \tilde{\mu}(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \tilde{\mu}(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i).$$

Bilden des Infimums über solche Überdeckungen liefert wegen (3.1) die Behauptung.  $\square$

Im nicht  $\sigma$ -endlichen Fall kann es Fortsetzungen geben, die auf der erzeugten  $\sigma$ -Algebra verschieden sind. Hier ist ein Standardbeispiel.

**Beispiel 3.2** Betrachte auf  $X \neq \emptyset$  das Prämaß  $\lambda : \mathcal{P} = \{\emptyset\} \rightarrow [0, \infty]$ ,  $\lambda(\emptyset) = 0$ . Offenbar ist  $\lambda$  nicht  $\sigma$ -endlich. Definiere nun für  $t \in [0, \infty]$ , vgl. Beispiel 2.4,

$$\mu_t : 2^X \rightarrow [0, \infty], \quad \mu_t(E) = \begin{cases} 0 & \text{falls } E = \emptyset \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann sind alle  $\mu_t$  Fortsetzungen, sie sind aber auf der von  $\mathcal{P}$  erzeugten  $\sigma$ -Algebra  $\sigma(\mathcal{P}) = \{\emptyset, X\}$  nicht gleich. Die Caratheodory-Fortsetzung ist  $\mu_{\infty}$ .

**Satz 3.3 (Eindeutigkeit der Maßfortsetzung)** *Sei  $\lambda$  ein  $\sigma$ -endliches Prämaß auf einem Halbring  $\mathcal{P}$  über  $X$ . Ist  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  die Caratheodory-Fortsetzung von  $\lambda$  und  $\tilde{\mu}$  eine beliebige Fortsetzung, so gilt*

$$E \text{ } \mu\text{-messbar} \quad \Rightarrow \quad E \text{ } \tilde{\mu}\text{-messbar und } \tilde{\mu}(E) = \mu(E).$$

BEWEIS: Seien  $\mathcal{M}$  bzw.  $\tilde{\mathcal{M}}$  die jeweiligen Systeme messbarer Mengen für  $\mu$  bzw.  $\tilde{\mu}$ . Nach Satz 3.2 (ii) gibt es zu  $E \in \mathcal{M}$  ein  $C \in \sigma(\mathcal{P})$  und eine  $\mu$ -Nullmenge  $N$  mit  $E = C \cup N$ . Da  $\tilde{\mu}(N) \leq \mu(N) = 0$  nach Lemma 3.4, ist  $N$   $\tilde{\mu}$ -messbar nach Proposition 2.1. Aber  $C$  ist ebenfalls  $\tilde{\mu}$ -messbar nach Lemma 3.2, also ist  $E$   $\tilde{\mu}$ -messbar.

Wir zeigen  $\tilde{\mu}(E) = \mu(E)$  erst wenn  $\mu(E) < \infty$ . Dann gibt es  $P_i \in \mathcal{P}$  mit  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda(P_i) < \infty$  und  $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i =: P$ . Wir können  $P_i$  disjunkt annehmen. Wegen  $\mu = \tilde{\mu} = \lambda$  auf  $\mathcal{P}$  gilt

$$\mu(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \tilde{\mu}(P_i) = \tilde{\mu}(P).$$

Jetzt berechnen wir mit Lemma 3.4

$$\begin{aligned} \tilde{\mu}(E) + \tilde{\mu}(P \setminus E) &\leq \mu(E) + \mu(P \setminus E) \\ &= \mu(P) \quad (\text{da } E \text{ } \mu\text{-messbar}) \\ &= \tilde{\mu}(P) \\ &\leq \tilde{\mu}(E) + \tilde{\mu}(P \setminus E). \end{aligned}$$

Also muss  $\tilde{\mu}(E) = \mu(E)$  gelten. Sei nun  $E \in \mathcal{M}$  beliebig. Nach Lemma 3.3 gilt  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  für  $\mu$ -messbare  $E_n$  mit  $\mu(E_n) < \infty$  und  $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ . Es folgt wegen Satz 2.4 (i)

$$\tilde{\mu}(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\mu}(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(E).$$

□

Zum Schluss des Kapitels wollen wir die Beziehung zwischen äußeren Maßen und Maßen aufklären. Aus einem äußeren Maß  $\mu$  erhalten wir das Maß  $\lambda = \mu|_{\mathcal{M}(\mu)}$  durch Einschränkung auf die  $\mu$ -messbaren Mengen, und  $\lambda$  ist nach Proposition 2.1 *vollständig*, das heißt es gilt

$$(3.5) \quad N \subset A \text{ für ein } A \in \mathcal{A} \text{ mit } \lambda(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad N \in \mathcal{A}.$$

Umgekehrt können wir ein gegebenes Maß  $\lambda$  auf einer  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A} \subset 2^X$  mit Satz 3.1 zu einem äußeren Maß  $\lambda^C$  auf  $X$  fortsetzen, und nach Proposition 3.1 ist  $\lambda^C$  regulär. Wir wollen jetzt sehen, dass diese Zuordnungen invers sind, jedenfalls im  $\sigma$ -endlichen Fall.

**Definition 3.6** *Ein äußeres Maß  $\mu : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  heißt  $\sigma$ -endlich, wenn  $X$  abzählbare Vereinigung  $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$  von  $\mu$ -messbaren Mengen  $X_i$  mit  $\mu(X_i) < \infty$  ist.*

Nach Definition 3.5 ist  $\mu$  genau dann  $\sigma$ -endlich, wenn das Maß  $\mu|_{\mathcal{M}(\mu)}$   $\sigma$ -endlich ist.

**Satz 3.4 (äußere Maße vs. Maße)** *Die durch Einschränkung bzw. Fortsetzung gegebenen Abbildungen zwischen den  $\sigma$ -endlichen, regulären äußeren Maßen und den  $\sigma$ -endlichen, vollständigen Maßen auf  $X$  sind zueinander invers und insbesondere bijektiv.*

BEWEIS: Wir zeigen als erstes  $\lambda = \mu|_{\mathcal{M}(\mu)}$  für  $\mu = \lambda^C$ . Nach Satz 3.2 ist  $D \subset X$  genau dann  $\lambda^C$ -messbar, wenn es  $C, E \in \mathcal{A}$  gibt mit  $C \subset D \subset E$  und  $\lambda^C(E \setminus D) = \lambda^C(D \setminus C) = 0$ . Es folgt  $E \setminus C \in \mathcal{A}$  und nach Satz 3.1

$$\lambda(E \setminus C) = \lambda^C(E \setminus C) \leq \lambda^C(E \setminus D) + \lambda^C(D \setminus C) = 0.$$

Da  $\mathcal{A}$  vollständig nach Voraussetzung, ist  $D \setminus C \in \mathcal{A}$  und damit  $D = C \cup (D \setminus C) \in \mathcal{A}$ , das heißt es gilt  $\mathcal{M}(\lambda^C) = \mathcal{A}$  und  $\lambda^C = \lambda$  auf  $\mathcal{A}$  nach Satz 3.1.

Jetzt zeigen wir  $\mu = \lambda^C$  für  $\lambda = \mu|_{\mathcal{M}(\mu)}$ . Es gilt  $\mathcal{M}(\mu) = \mathcal{M}(\lambda^C)$  nach Satz 3.1 und Satz 3.3. Aber  $\mu$  ist regulär nach Voraussetzung, sowie  $\lambda^C$  regulär nach Proposition 3.1, und beide äußere Maße stimmen überein auf  $\mathcal{M}(\mu) = \mathcal{M}(\lambda^C)$ , also sind die Maße gleich.  $\square$



## 4 Das $n$ -dimensionale Lebesguemaß

Wir spezialisieren nun die allgemeinen Ausführungen des vorigen Kapitels und betrachten das Lebesguemaß auf dem  $n$ -dimensionalen Euklidischen Raum. Als erstes wird untersucht, in welcher Beziehung das System der Lebesgue-messbaren Mengen zu der gegebenen Topologie auf  $\mathbb{R}^n$ , also zu dem System der offenen Mengen, steht. Insbesondere ergibt sich daraus eine Charakterisierung der Lebesgue-messbaren Mengen. Zweitens wird die Invarianz des Lebesguemaßes unter Isometrien, das heißt Translationen und orthogonalen Transformationen, bewiesen, sowie allgemeiner eine Transformationsformel unter linearen Abbildungen. Zum Schluss geben wir ein Beispiel einer nicht Lebesgue-messbaren Menge in  $\mathbb{R}$ .

**Lemma 4.1** *Auf dem Halbring  $\mathcal{P}^n$  der (achsenparallelen) Quader im  $\mathbb{R}^n$  ist der elementargeometrische Inhalt  $\lambda^n : \mathcal{P}^n \rightarrow [0, \infty)$  ein Prämaß.*

BEWEIS: Sei  $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  mit  $P, P_i \in \mathcal{P}^n$  und  $P_i \cap P_j = \emptyset$  für  $i \neq j$ . Da  $\lambda^n$  Inhalt auf dem Ring der Figuren, siehe Satz 1.4, gilt aufgrund der Monotonie, Folgerung 1.2,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k \lambda^n(P_i) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda^n\left(\bigcup_{i=1}^k P_i\right) \leq \lambda^n(P).$$

Für die umgekehrte Ungleichung wähle zu  $\varepsilon > 0$  offene Quader  $Q_i \supset P_i$  und einen kompakten Quader  $Q \subset P$ , so dass gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(Q_i) < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \lambda^n(P) < \lambda^n(Q) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Nach Heine-Borel wird  $Q$  durch endliche viele Quader  $Q_1, \dots, Q_k$  überdeckt, und mit Folgerung 1.2 schließen wir

$$\lambda^n(P) < \lambda^n(Q) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \sum_{i=1}^k \lambda^n(Q_i) + \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) + \varepsilon.$$

Daraus folgt die Behauptung. □

**Definition 4.1 (Lebesguemaß)** *Das Lebesguemaß einer Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$  ist definiert durch*

$$(4.1) \quad \mathcal{L}^n(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) : P_i \text{ Quader, } E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \right\}.$$

Damit ist  $\mathcal{L}^n$  die Caratheodory-Fortsetzung des auf  $\mathcal{P}^n$  definierten Elementarinhalts  $\lambda^n$ .

**Definition 4.2 (Borelmenge)** *Die vom System  $\mathcal{O}^n$  der offenen Teilmengen des  $\mathbb{R}^n$  erzeugte  $\sigma$ -Algebra heißt Borel algebra  $\mathcal{B}^n$ , ihre Elemente heißen Borelmengen.*

**Lemma 4.2**  *$\mathcal{B}^n$  ist die vom Halbring  $\mathcal{P}^n$  der Quader erzeugte  $\sigma$ -Algebra.*

BEWEIS: Wir zeigen als erstes, dass jeder Quader eine Borelmenge ist. Ein Intervall  $I \subset \mathbb{R}$  ist entweder offen oder lässt sich als abzählbarer Schnitt  $I = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$  von offenen Intervallen  $U_k$  schreiben und liegt damit in  $\mathcal{B}^1$ , zum Beispiel gilt  $[a, b) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (a - \frac{1}{k}, b)$ . Für einen Quader  $Q = I_1 \times \dots \times I_n \subset \mathbb{R}^n$  schreiben wir  $I_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_{j,k}$  und erhalten  $Q = \bigcap_{k=1}^{\infty} (U_{1,k} \times \dots \times U_{n,k}) \in \mathcal{B}^n$ . Daraus folgt  $\mathcal{F}^n \subset \mathcal{B}^n$  und folglich  $\sigma(\mathcal{F}^n) \subset \mathcal{B}^n$ .

Nun ist andererseits nach Lemma 1.2 jede offene Menge  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  als Vereinigung von abzählbar vielen kompakten Würfeln darstellbar. Also gilt  $\mathcal{O}^n \subset \sigma(\mathcal{F}^n)$  und somit  $\mathcal{B}^n \subset \sigma(\mathcal{F}^n)$ .  $\square$

**Satz 4.1 ( $\mathcal{L}^n$ -Messbarkeit der Borelmengen)** *Für das Lebesguemaß auf  $\mathbb{R}^n$  gilt:*

- (i) *Alle Borelmengen sind Lebesgue-messbar.*
- (ii) *Zu  $E \subset \mathbb{R}^n$  gibt es eine Borelmenge  $B \supset E$  mit  $\mathcal{L}^n(B) = \mathcal{L}^n(E)$ .*
- (iii)  *$\mathcal{L}^n(K) < \infty$  für alle  $K \subset \mathbb{R}^n$  kompakt.*

BEWEIS: Sei  $\mathcal{M}^n$  das System der  $\mathcal{L}^n$ -messbaren Mengen. Dann gilt  $\mathcal{P}^n \subset \mathcal{M}^n$  nach Satz 3.1, also  $\mathcal{B}^n = \sigma(\mathcal{P}^n) \subset \mathcal{M}^n$  nach Lemma 4.2 und Satz 2.3.

Aussage (ii) gilt nach Proposition 3.1. Da  $\mathcal{L}^n = \lambda^n$  auf Quadern, gilt für beliebiges  $a > 0$   $\mathcal{L}^n([-a, a]^n) = \lambda^n([-a, a]^n) = (2a)^n < \infty$ , und (iii) folgt.  $\square$

**Lemma 4.3 (Approximationslemma)** *Für eine beliebige Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$  gilt:*

- (i)  $\mathcal{L}^n(E) = \inf\{\mathcal{L}^n(U) : U \text{ offen, } U \supset E\}$ ,
- (ii)  $\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \text{ kompakt, } K \subset E\}$ , falls  $E$   $\mathcal{L}^n$ -messbar.

BEWEIS: Offensichtlich gilt  $\mathcal{L}^n(E) \leq \inf\{\mathcal{L}^n(U) : U \text{ offen, } U \supset E\}$ . Für die umgekehrte Ungleichung können wir  $\mathcal{L}^n(E) < \infty$  annehmen. Nach Definition des Lebesguemaßes in (4.1) gibt es zu  $\varepsilon > 0$  eine Überdeckung  $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  mit Quadern  $P_i$ , so dass gilt:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) < \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon.$$

Wir können annehmen, dass die  $P_i$  offen sind. Also ist  $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  offen, es gilt  $U \supset E$  und

$$\mathcal{L}^n(U) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^n(P_i) < \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon.$$

In (ii) ist klar, dass  $\mathcal{L}^n(E) \geq \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \text{ kompakt, } K \subset E\}$ . Wir zeigen die umgekehrte Ungleichung zunächst für  $E$  beschränkt. Wähle  $K_0 \subset \mathbb{R}^n$  kompakt mit  $E \subset K_0$ . Nach (i) gibt es zu  $\varepsilon > 0$  eine offene Menge  $U \supset K_0 \setminus E$  mit

$$\mathcal{L}^n(U) < \mathcal{L}^n(K_0 \setminus E) + \varepsilon = \mathcal{L}^n(K_0) - \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon.$$

Dabei wurde benutzt, dass  $E$   $\mathcal{L}^n$ -messbar ist. Nun ist  $K := K_0 \setminus U \subset K_0 \setminus (K_0 \setminus E) = E$  kompakt, und wegen der Subadditivität folgt

$$\mathcal{L}^n(K) \geq \mathcal{L}^n(K_0) - \mathcal{L}^n(U) > \mathcal{L}^n(E) - \varepsilon.$$



Für  $E$  beliebig betrachte  $E_j = E \cap \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq j\}$ .  $E_j$  ist beschränkt und Lebesgue-messbar, also folgt aus obigem

$$\mathcal{L}^n(E_j) \leq \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \text{ kompakt, } K \subset E_j\} \leq \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \text{ kompakt, } K \subset E\}.$$

Aber  $\mathcal{L}^n(E_j) \rightarrow \mathcal{L}^n(E)$  mit  $j \rightarrow \infty$  nach Satz 2.4. Damit ist (ii) bewiesen.  $\square$

Die  $\mathcal{L}^n$ -messbaren Mengen können nun wie folgt charakterisiert werden.

**Satz 4.2 (Messbarkeit bzgl.  $\mathcal{L}^n$ )** Eine Menge  $D \subset \mathbb{R}^n$  ist genau dann  $\mathcal{L}^n$ -messbar, wenn eine der beiden (äquivalenten) Bedingungen gilt:

(i) Es gibt eine Borelmenge  $E \supset D$  mit  $\mathcal{L}^n(E \setminus D) = 0$ .

(ii) Es gibt eine Borelmenge  $C \subset D$  mit  $\mathcal{L}^n(D \setminus C) = 0$ .

Es kann  $E = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$  mit  $U_i$  offen,  $C = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  mit  $A_i$  abgeschlossen gewählt werden.

BEWEIS: Die Äquivalenz von (i) bzw. (ii) mit der Messbarkeit von  $D$  wurde bereits in Satz 3.2 bewiesen. Wir führen die Konstruktion von  $E$  bzw.  $C$  aber explizit durch, um die Zusatzaussage zu zeigen. Schreibe  $D = \bigcup_{j=1}^{\infty} D_j$  mit  $D_j = \{x \in D : j-1 \leq |x| < j\}$  für  $j \in \mathbb{N}$ . Nach Lemma 4.3 gibt es offene Mengen  $U_{i,j}$  und kompakte Mengen  $K_{i,j}$  mit  $U_{i,j} \supset D_j \supset K_{i,j}$  und

$$\mathcal{L}^n(U_{i,j}) < \mathcal{L}^n(D_j) + 2^{-j}/i, \quad \mathcal{L}^n(K_{i,j}) > \mathcal{L}^n(D_j) - 2^{-j}/i.$$

Dann ist  $U_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_{i,j}$  offen,  $A_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{i,j}$  abgeschlossen(!) und es gilt  $U_i \supset D \supset A_i$ . Mit  $E = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$  bzw.  $C = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  gelten für beliebiges  $i \in \mathbb{N}$  die Abschätzungen

$$\mathcal{L}^n(E \setminus D) \leq \mathcal{L}^n(U_i \setminus D) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(U_{i,j} \setminus D_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(U_{i,j}) - \mathcal{L}^n(D_j)) \leq \frac{1}{i},$$

$$\mathcal{L}^n(D \setminus C) \leq \mathcal{L}^n(D \setminus A_i) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(D_j \setminus K_{i,j}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(D_j) - \mathcal{L}^n(K_{i,j})) \leq \frac{1}{i}.$$

Dabei wurde die Messbarkeit von  $D_j$  benutzt. Mit  $i \rightarrow \infty$  folgen die Behauptungen.  $\square$

**Satz 4.3 (Lebesguemaß vs. Jordaninhalt)**

(i) Für  $E \subset \mathbb{R}^n$  gilt  $\underline{\text{vol}}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(E) \leq \overline{\text{vol}}^n(E)$ .

(ii) Ist  $E$  quadrierbar, so ist  $E$  auch  $\mathcal{L}^n$ -messbar und es gilt  $\mathcal{L}^n(E) = \text{vol}^n(E)$ .

BEWEIS: Nach dem Maßfortsetzungssatz stimmen der Elementarinhalt  $\lambda^n$  und das Lebesguemaß auf Quadern überein, also wegen Satz 1.3 auch auf allen Figuren. Für  $F_1, F_2 \in \mathcal{F}^n$  mit  $F_1 \subset E \subset F_2$  folgt

$$\lambda^n(F_1) = \mathcal{L}^n(F_1) \leq \mathcal{L}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(F_2) = \lambda^n(F_2).$$

Aussage (i) folgt, indem wir das Supremum über alle  $F_1 \subset E$  bzw. das Infimum über alle  $F_2 \supset E$  bilden. Ist nun  $E$  quadrierbar, so gilt nach Satz 1.6  $\overline{\text{vol}}^n(\partial E) = 0$ , also  $\mathcal{L}^n(\partial E) = 0$ .  $E$  ist also Vereinigung der offenen Menge  $\text{int}(E)$  und der  $\mathcal{L}^n$ -Nullmenge  $E \cap \partial E$ , und damit  $\mathcal{L}^n$ -messbar.  $\square$

Wir wollen jetzt untersuchen, wie sich das Lebesguemaß unter afflinearen Abbildungen transformiert. Dafür ist der folgende Begriff nützlich.

**Definition 4.3 (Borelmaß)** Ein äußeres Maß  $\mu$  auf  $\mathbb{R}^n$  heißt Borelmaß, falls gilt:

- (i) Alle Borelmengen sind  $\mu$ -messbar.
- (ii)  $\mu(K) < \infty$  für jede kompakte Menge  $K \subset \mathbb{R}^n$ .

**Beispiel 4.1** Das Lebesguemaß  $\mathcal{L}^n$  ist ein Borelmaß nach Satz 4.1. Mit Satz 2.2 ist dann auch  $\mathcal{L}^n \llcorner E$  ein Borelmaß, für jede Menge  $E \subset \mathbb{R}^n$ .

Ein Maß  $\mu$  auf  $\mathbb{R}^n$  heißt translationsinvariant, wenn mit  $E + a = \{x + a : x \in E\}$  gilt:

$$\mu(E + a) = \mu(E) \quad \text{für alle } a \in \mathbb{R}^n, E \subset \mathbb{R}^n.$$

Aus der Translationsinvarianz des Elementarinhalts  $\lambda^n : \mathcal{P}^n \rightarrow [0, \infty)$  und der Definition des Lebesguemaßes folgt sofort, das  $\mathcal{L}^n$  ein translationsinvariantes Maß ist. In Satz 4.4 unten wird gezeigt, dass das Borelmaß  $\mathcal{L}^n$  durch die Eigenschaft der Translationsinvarianz bis auf Normierung eindeutig charakterisiert ist.

**Lemma 4.4** Ist  $\mu$  translationsinvariantes Borelmaß auf  $\mathbb{R}^n$ , so ist jede Koordinatenhyper-ebene  $H = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i = c\}$  eine  $\mu$ -Nullmenge.

BEWEIS: Sei  $Q = [0, 1]^n$  und  $F = \{x \in Q : x_i = 0\}$ . Für  $a \in \mathbb{R}^n$  ist  $F + a$  abgeschlossen, also  $\mu$ -messbar. Es folgt für jede endliche Menge  $\{s_1, \dots, s_k\} \subset [0, 1]$

$$k \mu(F) = \sum_{j=1}^k \mu(s_j e_i + F) = \mu \left( \bigcup_{j=1}^k s_j e_i + F \right) \leq \mu(Q) < \infty.$$

Da  $k$  beliebig groß gewählt werden kann, ist  $\mu(F) = 0$ . Aber  $H$  ist Vereinigung von abzählbar vielen Translationen von  $F$ , und somit  $\mu(H) = 0$ .  $\square$

**Satz 4.4 (Charakterisierung durch Translationsinvarianz)** Sei  $\mu$  ein translationsinvariantes Borelmaß auf  $\mathbb{R}^n$ . Dann gilt

$$\mu(E) = \theta \mathcal{L}^n(E) \quad \text{für alle } \mathcal{L}^n\text{-messbaren } E \subset \mathbb{R}^n, \text{ wobei } \theta = \mu([0, 1]^n).$$

BEWEIS: Setze  $Q_{k,j} = 2^{-k}(j + [0, 1]^n)$  für  $k \in \mathbb{N}_0$  und  $j \in \mathbb{Z}^n$ . Dann ist  $[0, 1]^n$  Vereinigung der  $2^{nk}$  abgeschlossenen Teilwürfel  $\{Q_{k,j} : j \in J_k\}$ , wobei  $J_k = \{j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n : 0 \leq j_i \leq 2^k - 1\}$ , mit paarweise disjunktem Inneren. Aus Lemma 4.4 folgt

$$\mu([0, 1]^n) = \sum_{j \in J_k} \mu(Q_{k,j}), \quad \mathcal{L}^n([0, 1]^n) = \sum_{j \in J_k} \mathcal{L}^n(Q_{k,j}).$$

Die Translationsinvarianz impliziert  $\mu(Q_{k,j}) = \mu(Q_{k,0})$  und  $\mathcal{L}^n(Q_{k,j}) = \mathcal{L}^n(Q_{k,0})$  für alle  $j \in \mathbb{Z}^n$ , also

$$\theta = \frac{\mu([0, 1]^n)}{\mathcal{L}^n([0, 1]^n)} = \frac{\mu(Q_{k,0})}{\mathcal{L}^n(Q_{k,0})} = \frac{\mu(Q_{k,j})}{\mathcal{L}^n(Q_{k,j})} \quad \text{für alle } j \in \mathbb{Z}^n.$$

Daraus folgt mit Lemma 1.2 wobei wieder Lemma 4.4 benutzt wird,

$$\mu(U) = \theta \mathcal{L}^n(U) \quad \text{für alle offenen } U \subset \mathbb{R}^n.$$

Insbesondere gilt die Behauptung des Satzes für alle Quader, und damit für alle  $\mathcal{L}^n$ -messbaren Mengen aufgrund der Eindeutigkeit der Maßfortsetzung, siehe Satz 3.3.  $\square$

Wir zeigen als nächstes die Messbarkeit von Bildmengen, wobei wir uns im Hinblick auf die spätere Anwendung im Transformationssatz für Diffeomorphismen nicht auf lineare Abbildungen beschränken.

**Lemma 4.5** *Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  Lipschitzstetig, mit Konstante  $\Lambda$  bzgl. der Maximumsnorm  $\|\cdot\|$ . Dann gilt*

$$\mathcal{L}^n(f(E)) \leq \Lambda^n \mathcal{L}^n(E) \quad \text{für alle } E \subset U.$$

BEWEIS: Wir können  $\mathcal{L}^n(E) < \infty$  annehmen. Setze

$$Q(x_0, \varrho) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < \varrho\} \quad \text{für } x_0 \in \mathbb{R}^n, \varrho > 0.$$

Nach Voraussetzung gilt  $\|f(x) - f(x_0)\| \leq \Lambda \|x - x_0\|$  für  $x, x_0 \in U$ , also

$$Q = Q(x_0, \varrho) \subset U \quad \Rightarrow \quad f(Q) \subset Q(f(x_0), \Lambda\varrho).$$

Nach Lemma 4.3 gibt es nun eine offene Menge  $V \supset E$  mit  $\mathcal{L}^n(V) < \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon$ , wobei oBdA  $V \subset U$ , und weiter eine Ausschöpfung  $V = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$  durch Würfel  $Q_j$  mit paarweise disjunktem Inneren, siehe Lemma 1.2. Damit folgt

$$\mathcal{L}^n(f(E)) \leq \mathcal{L}^n(f(V)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(f(Q_j)) \leq \Lambda^n \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(Q_j) \leq \Lambda^n (\mathcal{L}^n(E) + \varepsilon).$$

Mit  $\varepsilon \rightarrow 0$  folgt die Behauptung.  $\square$

**Satz 4.5 ( $\mathcal{L}^n$ -Messbarkeit von Bildmengen)** *Ist  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  lokal Lipschitzstetig, zum Beispiel  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ , so gilt:*

- (i)  $N \subset U$  Nullmenge  $\Rightarrow f(N)$  Nullmenge.
- (ii)  $E \subset U$   $\mathcal{L}^n$ -messbar  $\Rightarrow f(E)$   $\mathcal{L}^n$ -messbar.

BEWEIS:  $f$  ist auf kompakten Teilmengen von  $U$  Lipschitzstetig, deshalb folgt Aussage (i) direkt aus Lemma 4.5. Für (ii) können wir annehmen, dass  $E$  beschränkt ist, andernfalls betrachten wir  $E_j = \{x \in E : |x| \leq j\}$ . Nach Satz 4.2 gibt es dann kompakte Mengen  $K_j$  und eine  $\mathcal{L}^n$ -Nullmenge  $N$  mit  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \cup N$ . Da  $f(K_j)$  kompakt und  $\mathcal{L}^n(f(N)) = 0$  nach Lemma 4.5, ist  $f(E)$   $\mathcal{L}^n$ -messbar.  $\square$

**Satz 4.6 (Bewegungsinvarianz von  $\mathcal{L}^n$ )** *Für  $S \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$  und  $a \in \mathbb{R}^n$  gilt*

$$\mathcal{L}^n(S(E) + a) = \mathcal{L}^n(E) \quad \text{für alle } E \subset \mathbb{R}^n.$$

BEWEIS: Wir können  $a = 0$  annehmen. Betrachte das äußere Maß  $\mu(E) = \mathcal{L}^n(S(E))$ , zunächst mit  $S \in GL_n(\mathbb{R})$  beliebig. Dann ist  $\mu$  translationsinvariant, denn es gilt

$$\mu(E + b) = \mathcal{L}^n(S(E + b)) = \mathcal{L}^n(S(E) + S(b)) = \mathcal{L}^n(S(E)) = \mu(E).$$

Ferner ist  $\mu(K) = \mathcal{L}^n(S(K)) < \infty$  für  $K \subset \mathbb{R}^n$  kompakt. Ist  $B \subset \mathbb{R}^n$   $\mathcal{L}^n$ -messbar, so ist  $S(B)$  ebenfalls  $\mathcal{L}^n$ -messbar nach Satz 4.5. Für  $E \subset \mathbb{R}^n$  beliebig gilt dann

$$\mu(E \cap B) + \mu(E \setminus B) = \mathcal{L}^n(S(E) \cap S(B)) + \mathcal{L}^n(S(E) \setminus S(B)) = \mathcal{L}^n(S(E)) = \mu(E).$$

Insbesondere sind Borelmengen  $\mu$ -messbar. Aus Satz 4.4 folgt nun  $\mu(E) = \theta(S) \mathcal{L}^n(E)$  für alle  $\mathcal{L}^n$ -messbaren  $E \subset \mathbb{R}^n$ , wobei

$$\theta(S) = \mu([0, 1]^n) = \mathcal{L}^n(S([0, 1]^n)) \in [0, \infty).$$

Das gilt sogar für beliebige  $E \subset \mathbb{R}^n$ , und zwar ergibt Approximation nach Lemma 4.3

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \mathcal{L}^n(S(E)) \\ &= \inf\{\mathcal{L}^n(V) : V \supset S(E) \text{ offen}\} \\ &= \inf\{\mathcal{L}^n(S(U)) : U \supset E \text{ offen}\} \\ &= \theta(S) \inf\{\mathcal{L}^n(U) : U \supset E \text{ offen}\} = \theta(S) \mathcal{L}^n(E). \end{aligned}$$

Wir haben somit

$$(4.2) \quad \mathcal{L}^n(S(E)) = \theta(S) \mathcal{L}^n(E) \quad \text{für alle } E \subset \mathbb{R}^n.$$

Im Fall  $S \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$  setzen wir  $E = B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$  in (4.2) ein und erhalten

$$\theta(S) \mathcal{L}^n(B_1(0)) = \mathcal{L}^n(S(B_1(0))) = \mathcal{L}^n(B_1(0)).$$

Wegen  $\mathcal{L}^n(B_1(0)) \in (0, \infty)$  folgt  $\theta(S) = 1$  für  $S \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$ , und der Satz ist bewiesen.  $\square$

Der Elementarinhalt  $\lambda^n$  ist nur für achsenparallele Quader bzw. Figuren definiert worden. Deshalb ist aus der Definition 4.1 von  $\mathcal{L}^n$  nicht unmittelbar ersichtlich, dass das Lebesguemaß unabhängig von der Wahl des Euklidischen Koordinatensystems ist, sondern dies folgt erst aus dem vorangegangenen Satz 4.6. Für die Transformationsformel unter beliebigen linearen Abbildungen  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  benötigen wir die folgende Hilfsaussage aus der Linearen Algebra.

**Lemma 4.6 (Polarzerlegung)** *Zu jedem  $S \in GL_n(\mathbb{R})$  gibt es eine Diagonalmatrix  $\Lambda$  mit Einträgen  $\lambda_i > 0$  und  $T_1, T_2 \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$ , so dass  $S = T_1 \Lambda T_2$ .*

BEWEIS: Die Matrix  $S^T S$  ist symmetrisch und hat positive Eigenwerte, denn für  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  gilt  $\langle S^T S v, v \rangle = |Sv|^2 > 0$ . Also gibt es ein  $T \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$  und eine Diagonalmatrix  $\Lambda$  mit Einträgen  $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ , so dass gilt:

$$S^T S = T \Lambda^2 T^{-1}.$$

$R = T \Lambda T^{-1}$  ist dann symmetrisch mit  $R^2 = S^T S$ , und  $Q = S R^{-1}$  ist orthogonal wegen

$$Q^T Q = (R^{-1})^T S^T S R^{-1} = R^{-1} R^2 R^{-1} = E_n.$$

Es folgt  $S = Q R = Q T \Lambda T^{-1} = T_1 \Lambda T_2$  für  $T_1 = Q T, T_2 = T^{-1} \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$  wie verlangt.  $\square$

**Satz 4.7 (Lineare Transformationsformel)** *Für eine lineare Abbildung  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$  gilt*

$$\mathcal{L}^n(S(E)) = |\det(S)| \mathcal{L}^n(E) \quad \text{für alle } E \subset \mathbb{R}^n.$$

BEWEIS: Ist  $\det(S) = 0$ , so liegt  $S(E)$  in einer Hyperebene und die Behauptung ist richtig. Für  $\det(S) \neq 0$  haben wir aus dem Beweis von Satz 4.6 bereits die Aussage (4.2) zur Verfügung und müssen dort nur noch zeigen:

$$\theta(S) = |\det(S)|.$$

Dies stimmt für eine Diagonalmatrix  $\Lambda$  mit positiven Einträgen  $\lambda_i > 0$ ,  $i = 1, \dots, n$ , denn

$$\theta(\Lambda) = \mathcal{L}^n(\Lambda([0, 1]^n)) = \mathcal{L}^n([0, \lambda_1] \times \dots \times [0, \lambda_n]) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = |\det(\Lambda)|.$$

Für  $S$  beliebig sei  $S = T_1 \Lambda T_2$  mit einer Diagonalmatrix  $\Lambda$  und  $T_1, T_2 \in \mathcal{O}(\mathbb{R}^n)$  wie in Lemma 4.6. Aus den schon bekannten Aussagen für orthogonale sowie Diagonalmatrizen folgt

$$\theta(S) = \mathcal{L}^n(T_1 \Lambda T_2([0, 1]^n)) = |\det(\Lambda)| = |\det(S)|,$$


und der Satz ist bewiesen.  $\square$

**Beispiel 4.2 (Volumen eines Ellipsoids)** Für  $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$  ist die Menge

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left( \frac{x_1}{\lambda_1} \right)^2 + \dots + \left( \frac{x_n}{\lambda_n} \right)^2 < 1 \right\}$$

ein Ellipsoid mit den Halbachsen  $\lambda_i > 0$ . Mit  $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$  gilt  $E = \Lambda(B_1(0))$ , wobei  $\Lambda \in \text{Gl}_n(\mathbb{R})$  die Diagonalmatrix mit den Einträgen  $\lambda_i$  ist. Aus Satz 4.7 folgt

$$\mathcal{L}^n(E) = \mathcal{L}^n(\Lambda(E)) = (\lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n) \mathcal{L}^n(B_1(0)).$$



Zum Ende des Kapitels geben wir ein Standardbeispiel für eine nicht messbare Menge an.

**Beispiel 4.3 (Vitali 1905)** Es gibt eine Menge  $S \subset [0, 1]$ , die nicht  $\mathcal{L}^1$ -messbar ist. Betrachte dazu auf  $[0, 1]$  die Äquivalenzrelation

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Mit dem Auswahlaxiom der Mengenlehre erhalten wir ein Repräsentantensystem  $S \subset [0, 1]$  für die Relation  $\sim$ , d. h. zu jedem  $y \in [0, 1]$  gibt es genau ein  $x \in S$  mit  $x \sim y$ , also  $y = q + x$  mit einem  $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ . Sei  $q_1, q_2, \dots$  eine Abzählung von  $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ . Es gilt

$$(q_j + S) \cap (q_k + S) = \emptyset \quad \text{für } j \neq k.$$

Andernfalls gibt es  $x_1, x_2 \in S$  mit  $q_j + x_1 = q_k + x_2$ , also  $x_2 - x_1 = q_j - q_k \in \mathbb{Q}$ . Nach Definition von  $S$  folgt  $x_1 = x_2$ , also  $q_j = q_k$ , Widerspruch. Wir haben nun

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (q_k + S) \subset [-1, 2].$$

Wäre  $\mathcal{L}^1(S) = 0$ , so folgt  $1 = \mathcal{L}^1([0, 1]) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^1(q_k + S) = 0$ , ein Widerspruch. Angenommen  $S$  ist messbar, dann folgt aus der endlichen Additivität, siehe Lemma 2.1,

$$N\mathcal{L}^1(S) = \sum_{k=1}^N \mathcal{L}^1(q_k + S) = \mathcal{L}^1\left(\bigcup_{k=1}^N (q_k + S)\right) \leq \mathcal{L}^1([-1, 2]) = 3.$$

Das ist ein Widerspruch für  $N$  hinreichend groß.

## 5 Das Lebesgueintegral

Ziel dieses Kapitels ist die Definition des Lebesgueintegrals bezüglich eines Maßes  $\mu$  auf einer  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A}$  über  $X$ . Es stellt sich heraus, dass das Integral für eine große Klasse von Funktionen erklärt werden kann. Zum Beispiel ist das Integral einer nichtnegativen Funktion  $f$  schon dann in  $[0, \infty]$  definiert, wenn  $f$  messbar bezüglich  $\mathcal{A}$  ist. Dies ist eine überaus milde Regularitätsbedingung.

Die erweiterte Zahlengerade  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  wurde zu Beginn von Kapitel 2 eingeführt. Dort wurden die Ordnungsrelation, der Konvergenzbegriff und die Addition in  $\overline{\mathbb{R}}$  erklärt. Für die Multiplikation und Division wird zusätzlich zu den Regeln in  $\mathbb{R}$  folgendes vereinbart:

$$s \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot s = \begin{cases} \pm\infty & \text{falls } s \in (0, \infty] \\ 0 & \text{falls } s = 0 \\ \mp\infty & \text{falls } s \in [-\infty, 0), \end{cases}$$

$$\frac{1}{t} = 0 \quad \text{für } t = \pm\infty.$$

Die Multiplikation  $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  ist damit unstetig in den vier Punkten  $\{(0, \pm\infty), (\pm\infty, 0)\}$ , aber die Vereinbarung  $0 \cdot (\pm\infty) = 0$  erweist sich bei der Definition des Integrals als praktisch. Nicht definiert ist nach wie vor die Division durch Null.

**Definition 5.1 (messbare Funktion)** Eine Funktion  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  heißt messbar bezüglich einer  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A} \subset 2^X$  oder kurz  $\mathcal{A}$ -messbar, falls gilt:

- (i)  $f^{-1}(U) \in \mathcal{A}$  für jede offene Menge  $U \subset \mathbb{R}$ .
- (ii)  $f^{-1}\{\infty\} \in \mathcal{A}$  und  $f^{-1}\{-\infty\} \in \mathcal{A}$ .

Es ist etwas irritierend, dass man hier von messbar redet, bevor ein Maß gegeben ist. Ist  $\mu$  ein äußeres Maß auf  $X$ , so nennen wir eine Funktion  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mu$ -messbar, wenn sie messbar ist bezüglich der  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{M}$  der  $\mu$ -messbaren Mengen; dies ist ein wichtiger Spezialfall. Allgemein sprechen wir kurz von messbar statt  $\mathcal{A}$ -messbar, wenn die  $\sigma$ -Algebra aus dem Kontext eindeutig hervorgeht.

Eine reellwertige Funktion kann natürlich als Funktion nach  $\overline{\mathbb{R}}$  aufgefasst werden. Die Frage ihrer Messbarkeit reduziert sich dann auf Bedingung (i) in Definition 5.1. Funktionen mit Werten in  $\overline{\mathbb{R}}$  werden auch als numerische Funktionen bezeichnet.

Das nächste Lemma ist nützlich, um die Messbarkeit von Funktionen nachzuweisen.

**Lemma 5.1 (Messbarkeitskriterium für Funktionen)** Sei  $\mathcal{A} \subset 2^X$  eine  $\sigma$ -Algebra und  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $f$  ist  $\mathcal{A}$ -messbar.
- (ii)  $\{f < s\} = \{x \in X : f(x) \in [-\infty, s)\} \in \mathcal{A}$  für alle  $s \in \mathbb{R}$ .
- (iii)  $\{f \leq s\} = \{x \in X : f(x) \in [-\infty, s]\} \in \mathcal{A}$  für alle  $s \in \mathbb{R}$ .

(iv)  $\{f > s\} = \{x \in X : f(x) \in (s, \infty]\} \in \mathcal{A}$  für alle  $s \in \mathbb{R}$ .

(v)  $\{f \geq s\} = \{x \in X : f(x) \in [s, \infty)\} \in \mathcal{A}$  für alle  $s \in \mathbb{R}$ .

BEWEIS: Aus (i) folgt (ii) wegen  $\{f < s\} = f^{-1}(-\infty, s) \cup f^{-1}\{-\infty\}$ . Aus den folgenden Gleichungen ergibt sich, dass (ii) bis (v) untereinander äquivalent sind:

$$\begin{aligned}\{f \leq s\} &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f < s + \frac{1}{k}\}, & \{f > s\} &= X \setminus \{f \leq s\}, \\ \{f \geq s\} &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f > s - \frac{1}{k}\}, & \{f < s\} &= X \setminus \{f \geq s\}.\end{aligned}$$

Es gelte nun eine und damit jede der Aussagen (ii) bis (v). Für ein kompaktes Intervall  $[a, b]$  ist dann  $f^{-1}([a, b]) = \{f \geq a\} \cap \{f \leq b\} \in \mathcal{A}$ . Da sich nach Lemma 1.2 jede offene Menge  $U \subset \mathbb{R}$  als abzählbare Vereinigung  $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$  von kompakten Intervallen darstellen lässt, ist  $f^{-1}(U) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}(I_k) \in \mathcal{A}$ . Ferner haben wir

$$f^{-1}\{\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f > k\} \quad \text{und} \quad f^{-1}\{-\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f < -k\}.$$

Also ist  $f$   $\mathcal{A}$ -messbar nach Definition 5.1. □

Wie man leicht sieht, ist das Mengensystem  $\{E \subset \mathbb{R} : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$  eine  $\sigma$ -Algebra. Ist daher  $f$   $\mathcal{A}$ -messbar, so ist  $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$  für jede Borelmenge  $B \subset \mathbb{R}$ .

In folgendem Satz sind die Grenzfunktionen punktweise definiert, zum Beispiel ist

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \quad (\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k)(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

Punktweise Konvergenz ist eine sehr schwache Form der Konvergenz, unter der sich Eigenschaften wie Stetigkeit oder Riemann-Integrierbarkeit nicht notwendig auf den Grenzwert übertragen.

**Satz 5.1 (Grenzwerte messbarer Funktionen)** Sei  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  eine Folge von  $\mathcal{A}$ -messbaren Funktionen. Dann sind auch folgende Funktionen  $\mathcal{A}$ -messbar:

$$\inf_{k \in \mathbb{N}} f_k, \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k, \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k, \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k.$$

BEWEIS: Für  $s \in \mathbb{R}$  gilt

$$\{\inf_k f_k \geq s\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f_k \geq s\}, \quad \{\sup_k f_k \leq s\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f_k \leq s\}.$$

Nach Lemma 5.1 sind  $\inf_k f_k$  und  $\sup_k f_k$  also  $\mathcal{A}$ -messbar, und damit auch die Funktionen

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k = \sup_{k \in \mathbb{N}} (\inf_{l \geq k} f_l), \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k = \inf_{k \in \mathbb{N}} (\sup_{l \geq k} f_l).$$

□

Für  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  ist der Positiv- bzw. Negativanteil  $f^{\pm} : X \rightarrow [0, \infty]$  definiert durch

$$(5.1) \quad f^+ = \max(f, 0) \geq 0 \quad \text{und} \quad f^- = \max(-f, 0) = -\min(f, 0) \geq 0.$$

Es gilt also  $f = f^+ - f^-$  und  $|f| = f^+ + f^-$ .



**Satz 5.2 (Messbarkeit und Rechenoperationen)** Seien  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mathcal{A}$ -messbar. Dann sind auch folgende Funktionen  $\mathcal{A}$ -messbar, falls sie definiert sind:

$$f + g, \alpha f \text{ für } \alpha \in \mathbb{R}, f^\pm, \max(f, g), \min(f, g), |f|, fg, f/g.$$

BEWEIS: Wir nehmen zunächst an, dass  $f, g$  nur Werte in  $\mathbb{R}$  annehmen. Es gilt

$$\{f + g < t\} = \bigcup_{r, s \in \mathbb{Q}, r+s < t} \{f < r\} \cap \{g < s\}, \quad \{-f < t\} = \{f > -t\}.$$

Nach Lemma 5.1 sind also  $f + g$  und  $-f$  messbar, ebenso  $\alpha f$  für  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Für jedes  $\varphi \in C^0(\mathbb{R})$  ist die Verkettung  $\varphi \circ f$  messbar, denn für  $U \subset \mathbb{R}$  offen ist  $\varphi^{-1}(U)$  offen (Analysis II, Satz 1.4), und folglich  $(\varphi \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(\varphi^{-1}(U))$  messbar. Damit ergibt sich die Messbarkeit der Funktionen  $f^\pm$ , indem wir  $\varphi(s) = \max(\pm s, 0)$  wählen. Weiter sind dann die Funktionen

$$|f| = f^+ + f^-, \max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \text{ und } \min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$$

messbar. Nun ist  $f^2 = \varphi \circ f$  mit  $\varphi(s) = s^2$ , also folgt die Messbarkeit von  $f^2$  und von

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2).$$

Schließlich ist auch  $1/g$  messbar, denn

$$\{1/g < s\} = \begin{cases} \{1/s < g < 0\} & s < 0 \\ \{g < 0\} & s = 0 \\ \{g < 0\} \cup \{g > 1/s\} & s > 0. \end{cases}$$

Nimmt nun  $f$  (bzw.  $g$ ) den Wert  $\infty$  oder  $-\infty$  an, so betrachte die abgeschnittene Funktion

$$f_k(x) = \begin{cases} k & f(x) \geq k \\ -k & f(x) \leq -k \\ f(x) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Funktionen  $f_k, g_k$  sind messbar. Man prüft nach, dass die Funktionen

$$f_k + g_k, \alpha f_k, f_k^\pm, \max(f_k, g_k), \min(f_k, g_k), |f_k|, f_k g_k, f_k / g_k$$

punktweise gegen die entsprechenden Funktionen für  $f$  und  $g$  konvergieren, auch im Fall des (unstetigen) Produkts. Also folgt die allgemeine Behauptung aus Satz 5.1.  $\square$

**Folgerung 5.1** Für zwei  $\mathcal{A}$ -messbare Funktionen  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  sind die Mengen  $\{f < g\}$ ,  $\{f \leq g\}$ ,  $\{f = g\}$  und  $\{f \neq g\}$  Elemente von  $\mathcal{A}$ .

BEWEIS: Es gilt  $\{f < g\} = \bigcup_{s \in \mathbb{Q}} (\{f < s\} \cap \{g > s\}) \in \mathcal{A}$ . Die weiteren Aussagen folgen wie in Lemma 5.1.  $\square$

**Definition 5.2 (Treppenfunktion)** Eine Funktion  $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$  heißt  $\mathcal{A}$ -Treppenfunktion, wenn sie  $\mathcal{A}$ -messbar ist und nur endlich viele Funktionswerte annimmt. Nach Satz 5.2 ist die Menge  $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$  der  $\mathcal{A}$ -Treppenfunktionen ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Wir setzen

$$\mathcal{T}_{\mathcal{A}}^+ = \{\varphi \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}} : \varphi \geq 0\}.$$

**Beispiel 5.1** Für  $E \subset X$  heißt die Funktion

$$\chi_E : X \rightarrow \mathbb{R}, \chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

charakteristische Funktion von  $E$  (alternativ: Indikatorfunktion  $\mathbf{1}_E$ ). Diese Funktion ist genau dann eine  $\mathcal{A}$ -Treppenfunktion, wenn  $E \in \mathcal{A}$ .

Der folgende Approximationssatz wird es erlauben, Aussagen für Treppenfunktionen auf beliebige messbare Funktionen zu übertragen.

**Satz 5.3 (Approximation durch Treppenfunktionen)** Zu jeder  $\mathcal{A}$ -messbaren Funktion  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  gibt es eine Folge  $f_k \in \mathcal{T}_{\mathcal{A}}^+$  mit

$$f_0 \leq f_1 \leq \dots \quad \text{und} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \text{ für alle } x \in X.$$

BEWEIS: Wir setzen  $f_0 = 0$  und definieren für  $k \geq 1$  induktiv  $E_k = \{f_{k-1} + \frac{1}{k} \leq f\}$  sowie

$$f_k = f_{k-1} + \frac{1}{k} \chi_{E_k} \quad \Rightarrow \quad f_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \chi_{E_j}.$$

Die  $f_k$  sind Treppenfunktionen mit  $f_0 \leq f_1 \leq \dots$  und  $f_k \leq f$  für alle  $k \in \mathbb{N}_0$ : ist  $x \in E_k$ , so gilt  $f_k(x) = f_{k-1}(x) + \frac{1}{k} \leq f(x)$  nach Definition, für  $x \notin E_k$  folgt  $f_k(x) = f_{k-1}(x) \leq f(x)$  per Induktion. Insbesondere gilt  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \leq f(x)$ . Da die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  divergiert, gibt es im Fall  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) < \infty$  unendlich viele  $k \in \mathbb{N}$  mit  $x \notin E_k$  bzw.  $f_{k-1}(x) > f(x) - \frac{1}{k}$ , und es folgt  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \geq f(x)$ .  $\square$

Ab jetzt betrachten wir folgende Situation: gegeben sei ein äußeres Maß  $\mu$  auf  $X$ ,  $\mathcal{M}$  sei die  $\sigma$ -Algebra der  $\mu$ -messbaren Mengen in  $X$ . Statt  $\mathcal{M}$ -messbar oder  $\mathcal{M}$ -Treppenfunktion sprechen wir von  $\mu$ -messbar und  $\mu$ -Treppenfunktion, sowie  $\mathcal{T}^+(\mu)$ . Als Vorstufe zum Lebesgueintegral wird für Treppenfunktionen  $\varphi \in \mathcal{T}^+(\mu)$  ein Integral  $I(\varphi)$  auf elementare Weise definiert: seien  $\{s_1, \dots, s_l\} \subset [0, \infty)$  die endlich vielen Werte von  $\varphi$ , dann ist

$$(5.2) \quad I(\varphi) = \sum_{i=1}^l s_i \mu(\{\varphi = s_i\}).$$

Die Summe ist wohldefiniert, eventuell gleich  $+\infty$ . Um das Integral für beliebige  $\mu$ -messbare Funktionen zu erhalten, werden diese durch Treppenfunktionen approximiert, siehe unten.

**Lemma 5.2 (Eigenschaften des Integrals auf  $\mathcal{T}^+(\mu)$ )** Für  $\varphi, \psi \in \mathcal{T}^+(\mu)$  und  $\alpha, \beta \in [0, \infty)$  gelten folgende Aussagen:

$$(i) \quad I(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha I(\varphi) + \beta I(\psi).$$

$$(ii) \quad \varphi \leq \psi \quad \Rightarrow \quad I(\varphi) \leq I(\psi).$$

BEWEIS: Ist  $\{s_1, \dots, s_l\}$  die Wertemenge von  $\varphi$  und  $\alpha > 0$ , so ist  $\{\alpha s_1, \dots, \alpha s_l\}$  die Wertemenge von  $\alpha\varphi$  und es folgt

$$I(\alpha\varphi) = \sum_{i=1}^l \alpha s_i \mu(\{\alpha\varphi = \alpha s_i\}) = \alpha \sum_{i=1}^l s_i \mu(\{\varphi = s_i\}) = \alpha I(\varphi).$$

Für  $\alpha = 0$  gilt  $I(\alpha\varphi) = \alpha I(\varphi)$  nach Definition. Seien weiter  $\{t_1, \dots, t_m\}$  und  $\{r_1, \dots, r_n\}$  die Wertemengen von  $\psi$  sowie  $\varphi + \psi$ . Dann berechnen wir

$$\begin{aligned} I(\varphi + \psi) &= \sum_{k=1}^n r_k \mu(\{\varphi + \psi = r_k\}) \\ &= \sum_{k=1}^n r_k \mu\left(\bigcup_{s_i+t_j=r_k} \{\varphi = s_i\} \cap \{\psi = t_j\}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{s_i+t_j=r_k} (s_i + t_j) \underbrace{\mu(\{\varphi = s_i\} \cap \{\psi = t_j\})}_{=0 \text{ wenn } s_i+t_j \notin \{r_1, \dots, r_n\}} \\ &= \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m (s_i + t_j) \mu(\{\varphi = s_i\} \cap \{\psi = t_j\}) \\ &= \sum_{i=1}^l s_i \sum_{j=1}^m \mu(\{\varphi = s_i\} \cap \{\psi = t_j\}) + \sum_{j=1}^m t_j \sum_{i=1}^l \mu(\{\varphi = s_i\} \cap \{\psi = t_j\}) \\ &= \sum_{i=1}^l s_i \mu(\{\varphi = s_i\}) + \sum_{j=1}^m t_j \mu(\{\psi = t_j\}) \\ &= I(\varphi) + I(\psi). \end{aligned}$$

Damit ist Behauptung (i) gezeigt. In (ii) gilt  $\psi - \varphi \in \mathcal{T}^+(\mu)$ , und aus (i) folgt

$$I(\psi) = I(\varphi + (\psi - \varphi)) = I(\varphi) + I(\psi - \varphi) \geq I(\varphi).$$

□

Die Definition des Lebesgueintegrals geschieht nun in zwei Schritten.

**Definition 5.3 (Lebesgueintegral)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $X$  und  $f$  eine  $\mu$ -messbare Funktion. Ist  $f : X \rightarrow [0, \infty]$ , so setzen wir

$$\int f d\mu = \sup\{I(\varphi) : \varphi \in \mathcal{T}^+(\mu), \varphi \leq f\}.$$

In diesem Zusammenhang heißt  $\varphi$  Unterfunktion von  $f$ . Ist  $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  und sind die Integrale von  $f^\pm$  nicht beide unendlich, so setzen wir weiter

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu \in [-\infty, \infty].$$

Die beiden Schritte der Definition sind kompatibel, denn für  $f \geq 0$  gilt  $f^+ = f$ ,  $f^- = 0$ , und für die Nullfunktion ist das in (i) definierte Integral gleich Null.

**Folgerung 5.2 (Integral für nichtnegative Treppenfunktionen)** Für  $f \in \mathcal{T}^+(\mu)$  gilt

$$\int f d\mu = I(f) = \sum_{s \in f(X)} s \mu(\{f = s\}).$$

BEWEIS:  $f$  ist selbst Unterfunktion von  $f$ , also ist  $\int f d\mu \geq I(f)$ . Nach Lemma 5.2(ii) haben wir andererseits  $I(\varphi) \leq I(f)$  für jede Unterfunktion.  $\square$

**Beispiel 5.2** Für das Lebesguemaß  $\mathcal{L}^1$  auf  $\mathbb{R}$  gilt:  $\chi_{\mathbb{Q}} \in \mathcal{T}^+(\mathcal{L}^1)$  und

$$\int \chi_{\mathbb{Q}} d\mathcal{L}^1 = 0 \cdot \mathcal{L}^1(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) + 1 \cdot \mathcal{L}^1(\mathbb{Q}) = 0.$$

**Definition 5.4 (Integrierbarkeit)** Eine Funktion  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  heißt integrierbar bzgl.  $\mu$ , wenn sie  $\mu$ -messbar ist und wenn gilt:

$$\int f d\mu \in \mathbb{R} \quad \text{oder äquivalent} \quad \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu < \infty.$$

**Beispiel 5.3** Wir betrachten hier das Zählmaß, siehe Beispiel 2.3, auf dem Raum  $X = \mathbb{N}_0$ . Wir zeigen: eine Funktion  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  ist genau dann bzgl. card auf  $\mathbb{N}_0$  integrierbar, wenn die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} f(k)$  absolut konvergiert, und dann gilt

$$(5.3) \quad \int f d\text{card} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k).$$

Eine nur bedingt konvergente Reihe wie  $\log 2 = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k / k$  ist also kein Lebesgueintegral bezüglich card. Wir zeigen (5.3) erst für Funktionen  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, \infty]$ . Dazu betrachten wir

$$f_n : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}, f_n(k) = \begin{cases} f(k) & \text{falls } k \leq n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die  $f_n$  sind Unterfunktionen von  $f$  mit  $I(f_n) = \sum_{k=0}^n f(k)$ . Also folgt

$$\int f d\text{card} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} I(f_n) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k).$$

Für die umgekehrte Ungleichung sei ohne Einschränkung  $\sum_{k=0}^{\infty} f(k) < \infty$ , somit  $f(k) \rightarrow 0$  mit  $k \rightarrow \infty$ . Ist dann  $\varphi$  Unterfunktion von  $f$ , so ist  $\varphi(k) \neq 0$  nur für endlich viele  $k$  und folglich  $\varphi \leq f_n$  für  $n$  hinreichend groß. Es folgt

$$I(\varphi) \leq I(f_n) = \sum_{k=0}^n f(k) \leq \sum_{k=0}^{\infty} f(k), \quad \text{also} \quad \int f d\text{card} \leq \sum_{k=0}^{\infty} f(k).$$

Die Äquivalenz von Integrierbarkeit und absoluter Konvergenz folgt aus

$$\int f^+ d\text{card} + \int f^- d\text{card} = \sum_{k=0}^{\infty} f^+(k) + \sum_{k=0}^{\infty} f^-(k) = \sum_{k=0}^{\infty} |f(k)|,$$

und weiter erhält man

$$\int f \, d\text{card} = \int f^+ \, d\text{card} - \int f^- \, d\text{card} = \sum_{k=0}^{\infty} f^+(k) - \sum_{k=0}^{\infty} f^-(k) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k).$$

Es kommt in der Maßtheorie oft vor, dass eine Aussage nur für Punkte außerhalb einer  $\mu$ -Nullmenge gebraucht wird, oder nur dort gezeigt werden kann. Man sagt, die Aussage  $A[x]$  ist wahr für  $\mu$ -fast-alles  $x \in M$  oder  $\mu$ -fast-überall auf  $M$ , falls

$$\mu(\{x \in M : A[x] \text{ ist falsch}\}) = 0.$$

**Satz 5.4 (Monotonie des Integrals)** Sei  $\mu$  äußeres Maß auf  $X$  und  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  seien  $\mu$ -messbar. Ist  $f \leq g$   $\mu$ -fast-überall und  $\int f \, d\mu > -\infty$ , so existiert das Integral von  $g$  und

$$\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu.$$

Die Aussage mit  $\geq$  gilt entsprechend wenn  $\int f \, d\mu < \infty$ .

BEWEIS: Seien zunächst  $f$  und  $g$  nichtnegativ. Ist  $\varphi \in \mathcal{T}^+(\mu)$  eine Unterfunktion von  $f$ , so ist  $\psi := \chi_{\{f \leq g\}} \varphi$  eine Unterfunktion von  $g$ , und es gilt für alle  $s \geq 0$

$$\mu(\{\varphi = s\}) = \mu(\{\varphi = s\} \cap \{f \leq g\}) + \mu(\{\varphi = s\} \cap \{f > g\}) = \mu(\{\psi = s\}).$$

Es folgt  $I(\varphi) = I(\psi) \leq \int g \, d\mu$ , also  $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$ . Für  $f, g$  beliebig gilt

$$\begin{aligned} f^+ > g^+ &\Rightarrow f = f^+ > g^+ \geq g, \\ g^- > f^- &\Rightarrow g = -g^- < -f^- \leq f. \end{aligned}$$

Da  $f \leq g$  fast überall, folgt aus dem nichtnegativen Fall

$$\int f^+ \, d\mu \leq \int g^+ \, d\mu \quad \text{und} \quad \int g^- \, d\mu \leq \int f^- \, d\mu < \infty,$$

und somit

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu \leq \int g^+ \, d\mu - \int g^- \, d\mu = \int g \, d\mu.$$

□

**Bemerkung 5.1** Seien  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , und  $f$  sei  $\mu$ -messbar. Ist  $g = f$   $\mu$ -fast überall, so ist  $g$  ebenfalls  $\mu$ -messbar. Denn  $\{f = g\}$  ist als Komplement der Nullmenge  $\{f \neq g\}$  messbar, und

$$\{g < s\} \cap \{f = g\} = \{f < s\} \cap \{f = g\}.$$

Weiter folgt  $\int g \, d\mu = \int f \, d\mu$ , wenn das Integral von  $f$  existiert.

**Lemma 5.3 (Tschebyscheff-Ungleichung)** Für eine  $\mu$ -messbare Funktion  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\int f \, d\mu < \infty$  gilt

$$\mu(\{f \geq s\}) \leq \begin{cases} \frac{1}{s} \int f \, d\mu & \text{für } s \in (0, \infty), \\ 0 & \text{für } s = \infty. \end{cases}$$

BEWEIS: Für  $s \in (0, \infty)$  ist die Funktion  $s\chi_{\{f \geq s\}}$  eine Unterfunktion von  $f$ , also folgt

$$s\mu(\{f = \infty\}) \leq s\mu(\{f \geq s\}) = I(s\chi_{\{f \geq s\}}) \leq \int f d\mu.$$

□

**Folgerung 5.3** Die Funktion  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  sei  $\mu$ -messbar.

- (i) Ist  $\int f d\mu < \infty$ , so ist  $\{f = \infty\}$  eine  $\mu$ -Nullmenge.
- (ii) Ist  $f \geq 0$  und  $\int f d\mu = 0$ , so ist  $\{f > 0\}$  eine  $\mu$ -Nullmenge.

BEWEIS: Aussage (i) folgt mit  $s = \infty$  aus Lemma 5.3, angewandt auf  $f^+$ . In (ii) schließen wir  $\mu(\{f \geq s\}) = 0$  für  $s > 0$  aus Lemma 5.3, also  $\mu(\{f > 0\}) = 0$  mit Satz 2.4(i). □

Wir wollen jetzt die Linearität des Integrals beweisen. In unserm Zugang brauchen wir dazu einen fundamentalen Satz zur Vertauschung von punktweisem Grenzwert und Integral. Mit dieser Problematik werden wir uns im nächsten Kapitel noch ausführlicher beschäftigen.

**Satz 5.5 (Satz über monotone Konvergenz von B. Levi)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $X$  und  $f_k : X \rightarrow [0, \infty]$  eine Folge von  $\mu$ -messbaren Funktionen mit  $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ . Definiere  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  durch  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ . Dann gilt

$$\int f d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu.$$

BEWEIS: Die Funktion  $f$  ist  $\mu$ -messbar nach Satz 5.1. Mit Satz 5.4 gilt

$$0 \leq \int f_1 d\mu \leq \int f_2 d\mu \leq \dots \leq \int f d\mu, \quad \text{also} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu \leq \int f d\mu.$$

Sei  $\varphi$  eine Unterfunktion von  $f$  mit Wertemenge  $\{s_1, \dots, s_m\}$ . Setze  $E_i = \{\varphi = s_i\}$  für  $i = 1, \dots, m$  und betrachte für einen Parameter  $\theta \in (0, 1)$  die Mengen

$$E_{i,k} = E_i \cap \{f_k \geq \theta s_i\}.$$

Die Funktion  $\sum_{i=1}^m \theta s_i \chi_{E_{i,k}}$  ist eine Unterfunktion von  $f_k$ , und mit Lemma 5.2 folgt

$$\sum_{i=1}^m \theta s_i \mu(E_{i,k}) = I\left(\sum_{i=1}^m \theta s_i \chi_{E_{i,k}}\right) \leq \int f_k d\mu.$$

Nun gilt  $E_i = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{i,k}$ , denn für  $s_i > 0$  ist  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \geq s_i > \theta s_i$  für alle  $x \in E_i$ . Da außerdem  $E_{i,1} \subset E_{i,2} \subset \dots$ , folgt aus der Stetigkeit des Maßes von unten, siehe 2.4(i), die Gleichung  $\mu(E_i) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_{i,k})$  und somit

$$\theta I(\varphi) = \sum_{i=1}^m \theta s_i \mu(E_i) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \theta s_i \mu(E_{i,k}) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu.$$

Mit  $\theta \nearrow 1$  und Bildung des Supremums über alle Unterfunktionen  $\varphi$  folgt

$$\int f d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

□

**Satz 5.6 (Linearität des Integrals)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $X$ . Für  $\mu$ -messbare Funktionen  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  sei  $\alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu$  in  $\mathbb{R}$  definiert. Dann ist  $\alpha f + \beta g$  außerhalb einer  $\mu$ -Nullmenge  $N$  definiert, und mit  $\alpha f + \beta g := 0$  auf  $N$  gilt

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu.$$

BEWEIS: Wir betrachten erst den Fall  $\beta = 0$ . Ist  $\alpha > 0$ ,  $f \geq 0$  und  $\varphi$  Unterfunktion von  $f$ , so ist  $\alpha\varphi$  Unterfunktion von  $\alpha f$  und es folgt aus Lemma 5.2(ii)

$$\alpha I(\varphi) = I(\alpha\varphi) \leq \int (\alpha f) d\mu \quad \text{also} \quad \alpha \int f d\mu \leq \int (\alpha f) d\mu.$$

Anwendung auf  $1/\alpha$  und  $\alpha f$  (statt  $\alpha$  und  $f$ ) ergibt die gewünschte Gleichheit. Für  $\alpha > 0$  und  $f$  wie in der Behauptung gilt  $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$  und  $(\alpha f)^- = \alpha f^-$ . Es folgt

$$\int (\alpha f) d\mu = \int (\alpha f)^+ d\mu - \int (\alpha f)^- d\mu = \alpha \int f^+ d\mu - \alpha \int f^- d\mu = \alpha \int f d\mu.$$

Schließlich folgt aus  $(-f)^+ = f^-$  und  $(-f)^- = f^+$  die Gleichung

$$\int (-f) d\mu = \int f^- d\mu - \int f^+ d\mu = - \left( \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu \right) = - \int f d\mu.$$

Es reicht, als zweites den Fall  $\alpha = \beta = 1$  zu behandeln. Sind  $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ , so gibt es nach Satz 5.3 Folgen  $\varphi_k, \psi_k \in \mathcal{T}^+(\mu)$  mit  $\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$  und  $\psi_1 \leq \psi_2 \leq \dots$ , so dass  $\varphi_k \rightarrow f$  und  $\psi_k \rightarrow g$  punktweise auf  $X$ . Es folgt

$$\varphi_1 + \psi_1 \leq \varphi_2 + \psi_2 \leq \dots \quad \text{und} \quad \varphi_k + \psi_k \rightarrow f + g \text{ punktweise auf } X.$$

Mit dem Satz über monotone Konvergenz und Lemma 5.2(ii) erhalten wir

$$\int (f + g) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int (\varphi_k + \psi_k) d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \int \varphi_k d\mu + \int \psi_k d\mu \right) = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

Seien schließlich  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  wie in der Behauptung. Indem wir evtl. zu  $-f$  und  $-g$  übergehen und den ersten Fall mit  $\alpha = -1$  anwenden, gilt oBdA

$$\int f d\mu + \int g d\mu > -\infty, \quad \text{also} \quad \int f^- d\mu + \int g^- d\mu < \infty.$$

Nach Folgerung 5.3(i) ist dann  $\mu(\{f = -\infty\} \cup \{g = -\infty\}) = 0$ , und somit ist auch die Teilmenge  $\{(f, g) = \pm(\infty, -\infty)\} \in \mathcal{A}$  eine  $\mu$ -Nullmenge. Aus  $(f + g)^- \leq f^- + g^-$ , der Monotonie des Integrals und dem schon bewiesenen nichtnegativen Fall folgt

$$\int (f + g)^- d\mu \leq \int (f^- + g^-) d\mu = \int f^- d\mu + \int g^- d\mu < \infty.$$

Also ist das Integral von  $f + g$  definiert. Nun gilt  $(f + g)^+ - (f + g)^- = f + g = f^+ + g^+ - (f^- + g^-)$ , beziehungsweise

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+.$$

Da auf beiden Seiten nichtnegative Funktionen stehen, folgt durch Integration

$$(5.4) \quad \int (f+g)^+ d\mu + \int f^- d\mu + \int g^- d\mu = \int (f+g)^- d\mu + \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu.$$

Ist nun  $\int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu < \infty$ , so sind alle beteiligten Integrale endlich und wir erhalten

$$\begin{aligned} \int (f+g) d\mu &= \int (f+g)^+ d\mu - \int (f+g)^- d\mu \\ &= \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu - \int f^- d\mu - \int g^- d\mu \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu. \end{aligned}$$

Für  $\int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu = \infty$  folgt  $\int (f+g)^+ d\mu = \infty$  wieder aus (5.4), und in der Behauptung sind beide Seiten gleich  $\infty$ . Damit ist der Satz bewiesen.  $\square$

**Definition 5.5 (Integration über Teilmengen)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $X$  und  $E \subset X$  sei  $\mu$ -messbar. Dann setzen wir, wenn das rechte Integral existiert,

$$\int_E f d\mu = \int f \chi_E d\mu.$$

$f$  heißt auf  $E$  integrierbar, wenn die Funktion  $f \chi_E$  integrierbar ist.

Wegen  $(f \chi_E)^\pm = f^\pm \chi_E \leq f^\pm$  existiert das Integral von  $f$  über  $E$  auf jeden Fall dann, wenn das Integral von  $f$  über ganz  $X$  existiert. Insbesondere ist das Integral von  $f$  über  $E$  stets definiert, wenn  $f$  nichtnegativ ist.

**Beispiel 5.4** Betrachte für  $\alpha \in \mathbb{R}$  die Funktion  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|^{-\alpha}$ . Wir behaupten:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_1(0)} f d\mathcal{L}^n < \infty \Leftrightarrow \alpha > n, \quad \text{und} \quad \int_{B_1(0)} f d\mathcal{L}^n < \infty \Leftrightarrow \alpha < n.$$

Zum Beweis vergleichen wir  $f$  mit der Funktion

$$g = \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{-k\alpha} \chi_{A_k} \quad \text{mit} \quad A_k = \{2^k \leq |x| < 2^{k+1}\}.$$

Es gelten die Abschätzungen

$$2^{-\alpha} g \leq f \leq g \quad \text{für} \quad \alpha \geq 0 \quad \text{bzw.} \quad 2^{-\alpha} g \geq f \geq g \quad \text{für} \quad \alpha \leq 0.$$

Wegen der Monotonie des Integrals reicht es also aus, die Aussagen für  $g$  zu zeigen. Da  $A_k = 2^k A_0$ , folgt aus der Transformation von  $\mathcal{L}^n$  unter Streckungen, vgl. Satz 4.6,

$$\mathcal{L}^n(A_k) = (2^k)^n \mathcal{L}^n(A_0) = 2^{nk} \gamma_n \quad \text{mit} \quad \gamma_n = \mathcal{L}^n(A_0) \in (0, \infty).$$

Da die Folge der Partialsummen  $\sum_{k=0}^l 2^{-k\alpha} \chi_{A_k}$  punktweise auf  $\mathbb{R}^n$  gegen  $g \chi_{\mathbb{R}^n \setminus B_1(0)}$  konvergiert, folgt aus dem Satz über monotone Konvergenz

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_1(0)} g d\mathcal{L}^n = \sum_{k=0}^{\infty} \int 2^{-k\alpha} \chi_{A_k} d\mathcal{L}^n = \gamma_n \sum_{k=0}^{\infty} 2^{(n-\alpha)k} = \begin{cases} \gamma_n \frac{1}{1-2^{n-\alpha}} & \text{falls } \alpha > n \\ \infty & \text{sonst.} \end{cases}$$



Ganz entsprechend erhalten wir auf  $B_1(0)$

$$\int_{B_1(0)} g d\mathcal{L}^n = \sum_{k=-1}^{-\infty} \int 2^{-k\alpha} \chi_{A_k} d\mathcal{L}^n = \gamma_n \sum_{k=-1}^{-\infty} 2^{(n-\alpha)k} = \begin{cases} \gamma_n \frac{1}{2^{n-\alpha} - 1} & \text{falls } \alpha < n \\ \infty & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit ist die Behauptung von Beispiel 5.4 gezeigt.

Das folgende Integrierbarkeitskriterium (iii) wird sehr oft benutzt, meistens ohne extra erwähnt zu werden.

**Satz 5.7 (Majorantenkriterium)** Sei  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mu$ -messbar.

- (i)  $f$  integrierbar  $\Leftrightarrow |f|$  integrierbar.
- (ii) Es gilt  $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu$ , wenn das Integral von  $f$  existiert.
- (iii) Ist  $g : X \rightarrow [0, \infty]$   $\mu$ -messbar mit  $|f| \leq g$   $\mu$ -fast-überall und  $\int g d\mu < \infty$ , so ist  $f$  integrierbar.

BEWEIS: Es gilt  $|f| = f^+ + f^-$ , und aus der Linearität des Integrals, Satz 5.6, folgt

$$\int |f| d\mu = \int (f^+ + f^-) d\mu = \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu.$$

Mit Definition 5.4 folgt (i). Ist das Integral von  $f$  definiert, so gilt weiter

$$|\int f d\mu| = |\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu| \leq \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu = \int |f| d\mu.$$

Ist schließlich  $g$  wie in (iii), so folgt  $\int |f| d\mu \leq \int g d\mu < \infty$  aus Satz 5.4 und dann mit (i) die Integrierbarkeit von  $f$ .  $\square$

Mit dem Majorantenkriterium und Beispiel 5.4 folgt, dass allgemein Funktionen integrierbar sind, die durch eine geeignete Potenz  $|x|^{-\alpha}$  abgeschätzt sind, genauer:

**Beispiel 5.5** Ist  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mathcal{L}^n$ -messbar und gilt für eine Konstante  $C \in [0, \infty)$

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq C |x|^{-\alpha} \text{ fast überall in } B_\varepsilon(0) \text{ mit } \alpha < n, \quad \text{bzw.} \\ |f(x)| &\leq C |x|^{-\alpha} \text{ fast überall in } \mathbb{R}^n \setminus B_R(0) \text{ mit } \alpha > n, \end{aligned}$$

so ist  $f$  auf  $B_\varepsilon(0)$  bzw. auf  $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$  integrierbar.



## 6 Konvergenzsätze und $L^p$ -Räume

Sei  $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge von Funktionen, die gegen eine Funktion  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. Welche Voraussetzungen sind an die Qualität der Konvergenz  $f_k \rightarrow f$  zu stellen, damit der Grenzübergang mit dem Integral vertauscht werden kann, das heißt damit gilt:

$$\int f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

Die Konvergenzsätze von B. Levi und H. Lebesgue geben mit der monotonen Konvergenz bzw. der majorisierten Konvergenz hinreichende Bedingungen an, die wesentlich schwächer sind als die beim Riemannintegral benötigte gleichmäßige Konvergenz. Der Satz über majorisierte Konvergenz liefert (unter anderem) folgendes zentrale Resultat von Riesz-Fischer: der Raum der integrierbaren Funktionen – modulo Gleichheit fast überall – ist mit der Integralnorm ein Banachraum.

Die punktweise Konvergenz  $f_k \rightarrow f$  reicht im allgemeinen nicht aus, um das Integral mit dem Grenzwert zu vertauschen.

**Beispiel 6.1** Betrachte für  $\varepsilon > 0$  die Funktionen  $f_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_\varepsilon = \frac{1}{2\varepsilon} \chi_{[-\varepsilon, \varepsilon]}$ . Es gilt  $f_\varepsilon(x) = 0$  für  $\varepsilon < |x|$ , also ist der punktweise Grenzwert

$$f(x) := \lim_{\varepsilon \searrow 0} f_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \neq 0, \\ \infty & \text{für } x = 0. \end{cases}$$


Andererseits haben wir  $\int f_\varepsilon \, d\mathcal{L}^1 = \frac{1}{2\varepsilon} \mathcal{L}^1([-\varepsilon, \varepsilon]) = 1$  für alle  $\varepsilon > 0$ , das heißt

$$\int f \, d\mathcal{L}^1 = 0 < 1 = \lim_{\varepsilon \searrow 0} \int f_\varepsilon \, d\mathcal{L}^1.$$

Dass  $f_\varepsilon(0)$  gegen Unendlich geht ist unwesentlich: durch Abänderung  $f_\varepsilon(0) := 0$  hat man  $f_\varepsilon(x) \rightarrow 0$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ , die Integrale bleiben gleich. Wir stellen aber fest, dass

$$\sup_{\varepsilon > 0} f_\varepsilon(x) = \frac{1}{2|x|} \quad \text{für } x \neq 0.$$

Eine gemeinsame Majorante der  $f_\varepsilon$  kann also nicht integrierbar sein, vgl. Satz 6.3.



Eine für die Vertauschung hinreichende, zusätzliche Bedingung liefert der Satz über monotone Konvergenz, der bereits im vorigen Kapitel für den Nachweis der Linearität des Integrals benötigt wurde. Wir wiederholen den Satz hier unverändert.

**Satz 5.5 (über monotone Konvergenz von B. Levi)** Sei  $f_k : X \rightarrow [0, \infty]$  eine Folge von  $\mu$ -messbaren Funktionen mit  $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ . Definiere  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  durch  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ . Dann gilt

$$\int f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

Als Anwendung wollen wir kurz Maße besprechen, die durch Integration gegen eine Dichtefunktion gegeben sind.

**Satz 6.1 (Maß mit Dichtefunktion)** Sei  $\mu$  ein Maß auf der  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A} \subset 2^X$ . Für eine  $\mathcal{A}$ -messbare Funktion  $\theta : X \rightarrow [0, \infty]$  ist dann

$$\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty], \quad \lambda(A) = \int_A \theta \, d\mu = \int \theta \chi_A \, d\mu$$

ein Maß, das mit  $\mu \llcorner \theta$  (oder  $\mu \odot \theta$ ) bezeichnet wird. Es gelten folgende Aussagen:

- (1)  $\mu(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu \llcorner \theta(A) = 0.$
- (2)  $\int f \, d(\mu \llcorner \theta) = \int f \theta \, d\mu$  für alle  $\mathcal{A}$ -messbaren  $f : X \rightarrow [0, \infty]$ .

BEWEIS: Ist  $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  mit  $A_i \in \mathcal{A}$  paarweise disjunkt, so folgt mit monotoner Konvergenz

$$\lambda(A) = \int \theta \chi_A \, d\mu = \int \sum_{i=1}^{\infty} \theta \chi_{A_i} \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int \theta \chi_{A_i} \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i).$$

Wegen  $\chi_{\emptyset} \equiv 0$  ist  $\lambda(\emptyset) = 0$ , das heißt  $\lambda$  ist ein Maß auf  $\mathcal{A}$ . Für  $\mu(A) = 0$ , also  $\theta \chi_A$   $\mu$ -fast-überall Null, folgt aus Satz 5.4

$$\mu \llcorner \theta(A) = \int \theta \chi_A \, d\mu = 0.$$

Weiter gilt für  $A \in \mathcal{A}$

$$\int \chi_A \, d(\mu \llcorner \theta) = \mu \llcorner \theta(A) = \int \chi_A \theta \, d\mu.$$

Damit folgt (2) für alle Treppenfunktionen  $\varphi \in \mathcal{T}^+(\mathcal{A})$ . Für eine beliebige  $\mathcal{A}$ -messbare Funktion  $f \geq 0$  wähle eine Folge von Treppenfunktionen  $\varphi_k \in \mathcal{T}^+(\mathcal{A})$  mit  $\varphi_k \nearrow f$  nach Satz 5.3, und schließe wieder mit monotoner Konvergenz

$$\int f \, d(\mu \llcorner \theta) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k \, d(\mu \llcorner \theta) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k \theta \, d\mu = \int f \theta \, d\mu.$$

□

**Bemerkung 6.1** Ist zusätzlich  $\theta : X \rightarrow [0, \infty]$  integrierbar bezüglich  $\mu$ , so lässt sich Aussage (1) von Satz 6.1 wie folgt verschärfen: zu jedem  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $\delta > 0$ , so dass gilt:

$$(6.1) \quad A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \delta \quad \Rightarrow \quad (\mu \llcorner \theta)(A) < \varepsilon.$$

Denn mit  $\theta_k = \min(\theta, k)$  gilt die Abschätzung

$$(\mu \llcorner \theta)(A) = \int_A \theta \, d\mu = \int_A (\theta - \theta_k) \, d\mu + \int_A \theta_k \, d\mu \leq \int (\theta - \theta_k) \, d\mu + k \mu(A).$$

Nach Satz 5.5 können wir  $k \in \mathbb{N}$  hinreichend groß wählen, so dass

$$\int (\theta - \theta_k) \, d\mu = \int \theta \, d\mu - \int \theta_k \, d\mu < \varepsilon/2.$$

Die Bemerkung folgt für  $\mu(A) < \varepsilon/(2k) =: \delta$ .

Das folgende Lemma ist von unabhängigem Interesse, zum Beispiel in der Variationsrechnung. Es besagt unter anderem, dass das Integral bezüglich punktweiser Konvergenz nichtnegativer Funktionen unterhalbstetig ist.

**Satz 6.2 (Lemma von Fatou)** Sei  $f_k : X \rightarrow [0, \infty]$  eine Folge von  $\mu$ -messbaren Funktionen. Für  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ,  $f(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  gilt dann

$$\int f \, d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

BEWEIS: Für die Folge  $g_k = \inf_{j \geq k} f_j$  gilt  $g_{k+1} \geq g_k$  und  $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = f$ . Mit Satz 5.5 folgt, da andererseits  $g_k \leq f_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\int f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k \, d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

□

**Satz 6.3 (Satz über dominierte Konvergenz von Lebesgue)** Sei  $f_1, f_2, \dots$  eine Folge von  $\mu$ -messbaren Funktionen, und  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  für  $\mu$ -fast-alles  $x \in X$ . Es gebe eine integrierbare Funktion  $g : X \rightarrow [0, \infty]$  mit  $\sup_k |f_k(x)| \leq g(x)$  für  $\mu$ -fast-alles  $x$ . Dann ist  $f$  integrierbar bzgl.  $\mu$ , und es gilt

$$\int f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

Es gilt sogar  $\|f - f_k\|_{L^1(\mu)} = \int |f - f_k| \, d\mu \rightarrow 0$ , vgl. Definition 6.1.

BEWEIS: Die Folge  $2g - |f - f_k| \geq 0$  konvergiert punktweise fast überall gegen  $g$ . Mit Satz 6.2 erhalten wir

$$\begin{aligned} \limsup_{k \rightarrow \infty} \left| \int f \, d\mu - \int f_k \, d\mu \right| &\leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int |f - f_k| \, d\mu \\ &= \int 2g \, d\mu - \liminf_{k \rightarrow \infty} \int (2g - |f - f_k|) \, d\mu \\ &\leq \int 2g \, d\mu - \int \liminf_{k \rightarrow \infty} (2g - |f - f_k|) \, d\mu \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Als erste Anwendung wollen wir das eindimensionale Riemannintegral mit dem Lebesgueintegral bzgl. des Maes  $\mathcal{L}^1$  vergleichen. Sei  $I = [a, b]$  ein kompaktes Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  beschrnkt. Fr eine durch Unterteilungspunkte  $a = x_0 \leq \dots \leq x_N = b$  gegebene Zerlegung  $\mathcal{Z}$  von  $[a, b]$  in Teilintervalle  $I_j = [x_{j-1}, x_j]$  werden Ober- und Untersumme wie folgt gebildet:

$$\bar{S}_{\mathcal{Z}}(f) = \sum_{j=1}^N (\sup_{I_j} f) (x_j - x_{j-1}) \quad \text{bzw.} \quad \underline{S}_{\mathcal{Z}}(f) = \sum_{j=1}^N (\inf_{I_j} f) (x_j - x_{j-1}).$$

Fr zwei Zerlegungen  $\mathcal{Z}_1$  und  $\mathcal{Z}_2$  mit gemeinsamer Verfeinerung  $\mathcal{Z}_1 \cup \mathcal{Z}_2$  sieht man leicht

$$\underline{S}_{\mathcal{Z}_1}(f) \leq \underline{S}_{\mathcal{Z}_1 \cup \mathcal{Z}_2}(f) \leq \bar{S}_{\mathcal{Z}_1 \cup \mathcal{Z}_2}(f) \leq \bar{S}_{\mathcal{Z}_2}(f).$$

$f$  heit Riemannintegrierbar mit Integral  $\int_a^b f(x) dx = S$ , wenn gilt:

$$\sup_{\mathcal{Z}} \underline{S}_{\mathcal{Z}}(f) = \inf_{\mathcal{Z}} \bar{S}_{\mathcal{Z}}(f) = S.$$

Aus der Vorlesung Analysis I sind hinreichende Kriterien fr die Riemannintegrierbarkeit bekannt, zum Beispiel Stetigkeit auf  $[a, b]$ . Es blieb aber die Frage offen, welche Funktionen – im Sinne einer Charakterisierung durch punktweise Eigenschaften – Riemannintegrierbar sind; dies knnen wir nun beantworten. Das Ergebnis ist analog zur Charakterisierung der Quadrierbarkeit in Satz 1.6. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir so die Integrationsregeln aus Analysis I auch fr das Lebesgueintegral zur Verfgung haben, jedenfalls wenn die Funktionen Riemannintegrierbar sind.

**Satz 6.4 (Riemannintegrierbarkeit)** *Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine beschrnkte Funktion auf dem kompakten Intervall  $I = [a, b]$ . Dann gilt:*

$$f \text{ Riemannintegrierbar} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L}^1(\{x \in I : f \text{ ist nicht stetig in } x\}) = 0.$$

*In diesem Fall ist  $f$  auch Lebesgueintegrierbar, und die Integrale stimmen berein.*

BEWEIS: Fr eine Zerlegung  $\mathcal{Z}$  mit Teilintervallen  $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ ,  $1 \leq j \leq N$ , definieren wir die Riemannschen Treppenfunktionen

$$\bar{f}_{\mathcal{Z}}(x) = \max_{I_j \ni x} \sup_{I_j} f \geq \limsup_{y \rightarrow x} f(y) \quad \text{und} \quad \underline{f}_{\mathcal{Z}}(x) = \min_{I_j \ni x} \inf_{I_j} f \leq \liminf_{y \rightarrow x} f(y).$$

Sei  $N_f(s) = \{x \in I : \limsup_{y \rightarrow x} f(y) - \liminf_{y \rightarrow x} f(y) \geq s\}$  fr  $s > 0$ . Sind  $\mathcal{Z}_1, \mathcal{Z}_2$  beliebige Zerlegungen, so folgt  $\bar{f}_{\mathcal{Z}_2}(x) - \underline{f}_{\mathcal{Z}_1}(x) \geq s$  fr alle  $x \in N_f(s)$ , und hieraus mit Lemma 5.3

$$\bar{S}_{\mathcal{Z}_2}(f) - \underline{S}_{\mathcal{Z}_1}(f) = \int_I (\bar{f}_{\mathcal{Z}_2} - \underline{f}_{\mathcal{Z}_1}) d\mathcal{L}^1 \geq s \mathcal{L}^1(N_f(s)).$$

Ist  $f$  Riemannintegrierbar, so bilden wir das Infimum ber alle  $\mathcal{Z}_1, \mathcal{Z}_2$  und schließen  $\mathcal{L}^1(N_f(s)) = 0$  fr alle  $s > 0$ , womit die eine Richtung der Behauptung gezeigt ist.

Sei nun  $f$   $\mathcal{L}^1$ -fast-berall stetig, und  $\mathcal{Z}_i$  eine beliebige Folge von Zerlegungen mit Feinheit  $\delta_i := \max_{1 \leq j \leq N_i} |x_{i,j} - x_{i,j-1}| \rightarrow 0$ . Ist  $f$  stetig in  $x$ , so folgt

$$\bar{f}_{\mathcal{Z}_i}(x) \leq \sup_{|y-x| \leq \delta_i} f(y) \searrow f(x) \quad \text{und} \quad \underline{f}_{\mathcal{Z}_i}(x) \geq \inf_{|y-x| \leq \delta_i} f(y) \nearrow f(x) \text{ mit } i \rightarrow \infty.$$

Also konvergieren  $\bar{f}_{Z_i}, \underline{f}_{Z_i}$  punktweise  $\mathcal{L}^1$ -fast-überall auf  $I$  gegen  $f$ , insbesondere ist  $f$   $\mathcal{L}^1$ -messbar nach Satz 5.1. Wegen  $|\bar{f}_{Z_i}|, |\underline{f}_{Z_i}| \leq \sup_I |f| < \infty$  folgt aus Satz 6.3

$$\bar{S}_{Z_i}(f) = \int_I \bar{f}_{Z_i} d\mathcal{L}^1 \rightarrow \int_I f d\mathcal{L}^1 \quad \text{und} \quad \underline{S}_{Z_i}(f) = \int_I \underline{f}_{Z_i} d\mathcal{L}^1 \rightarrow \int_I f d\mathcal{L}^1.$$

Also ist  $f$  Riemannintegrierbar mit Riemannintegral  $\int_a^b f(x) dx = \int_I f d\mathcal{L}^1$ .  $\square$

Ein uneigentliches Riemannintegral kann dann und nur dann als Lebesgueintegral aufgefasst werden, wenn es absolut konvergiert. Dies zeigt man leicht mit Definition 5.4, Satz 6.4 und einem Konvergenzsatz. Zum Beispiel ist das Integral  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$  nicht als Lebesgueintegral definiert, vergleiche auch Beispiel 5.3 und Beispiel 6.2 unten.

Wir kommen nun zu einer zweiten Anwendung des Satzes von Lebesgue, nämlich der Frage der Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Integralen, deren Integrand von einem Parameter abhängt.

**Satz 6.5 (Stetigkeit von Parameterintegralen)** *Sei  $X$  ein metrischer Raum,  $\mu$  ein Maß auf  $Y$  und  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x, \cdot)$  integrierbar bzgl.  $\mu$  für alle  $x \in X$ . Betrachte*

$$F : X \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \int f(x, y) d\mu(y).$$

*Es sei  $f(\cdot, y)$  stetig in  $x_0 \in X$  für  $\mu$ -fast-alles  $y \in Y$ . Weiter gebe es eine  $\mu$ -integrierbare Funktion  $g : Y \rightarrow [0, \infty]$ , so dass für alle  $x \in X$  gilt:*

$$|f(x, y)| \leq g(y) \quad \text{für alle } y \in Y \setminus N_x, \quad \text{mit einer } \mu\text{-Nullmenge } N_x.$$

*Dann ist  $F$  stetig in  $x_0$ .*

BEWEIS: Zu jeder Folge  $x_k \rightarrow x_0$  gibt es nach Voraussetzung eine  $\mu$ -Nullmenge  $N$ , so dass für alle  $y \in Y \setminus N$  gilt:

$$f(x_k, y) \rightarrow f(x_0, y) \quad \text{und} \quad |f(x_k, y)| \leq g(y) \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Aus dem Konvergenzsatz von Lebesgue, Satz 6.3, folgt

$$F(x_0) = \int f(x_0, y) d\mu(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f(x_k, y) d\mu(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} F(x_k).$$

$\square$

**Satz 6.6 (Differentiation unter dem Integralzeichen)** *Sei  $I$  offenes Intervall,  $\mu$  ein Maß auf  $Y$  und  $f : I \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x, \cdot)$  integrierbar bzgl.  $\mu$  für alle  $x \in I$ . Setze*

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \int f(x, y) d\mu(y).$$

*Es sei  $f(\cdot, y)$  in  $x_0 \in I$  differenzierbar für  $\mu$ -fast-alles  $y \in Y$ , und es gebe eine  $\mu$ -integrierbare Funktion  $g : Y \rightarrow [0, \infty]$ , so dass für alle  $x \in I$  gilt:*

$$\frac{|f(x, y) - f(x_0, y)|}{|x - x_0|} \leq g(y) \quad \text{für alle } y \in Y \setminus N_x,$$

mit einer geeigneten  $\mu$ -Nullmenge  $N_x$ . Dann folgt

$$F'(x_0) = \int \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) d\mu(y).$$

BEWEIS: Zu jeder Folge  $x_k \rightarrow x_0$  gibt es nach Voraussetzung eine  $\mu$ -Nullmenge  $N \subset Y$ , so dass für alle  $y \in Y \setminus N$  gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k, y) - f(x_0, y)}{x_k - x_0} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y),$$

$$\left| \frac{f(x_k, y) - f(x_0, y)}{x_k - x_0} \right| \leq g(y).$$

Aus dem Konvergenzsatz von Lebesgue, Satz 6.3, folgt mit  $k \rightarrow \infty$

$$\frac{F(x_k) - F(x_0)}{x_k - x_0} = \int \frac{f(x_k, y) - f(x_0, y)}{x_k - x_0} d\mu(y) \rightarrow \int \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) d\mu(y).$$

□

Wir wollen noch eine Version von Satz 6.6 formulieren, die etwas leichter zu handhaben ist.

**Folgerung 6.1** Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen,  $\mu$  ein Maß auf  $Y$  und  $f : U \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x, \cdot)$  integrierbar bezüglich  $\mu$  für alle  $x \in U$ . Betrachte

$$F : U \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \int f(x, y) d\mu(y).$$

Es gebe eine  $\mu$ -Nullmenge  $N \subset Y$ , so dass für alle  $y \in Y \setminus N$  gilt:  $f(\cdot, y) \in C^1(U)$  und

$$|D_x f(x, y)| \leq g(y) \quad \text{mit einer integrierbaren Funktion } g : Y \rightarrow [0, \infty].$$

Dann ist  $F \in C^1(U)$  und es gilt für alle  $x \in U$

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(x) = \int \frac{\partial f}{\partial x_i}(x, y) d\mu(y).$$

BEWEIS: Nach Voraussetzung gilt für alle  $y \in Y$  mit Ausnahme der  $\mu$ -Nullmenge  $N$

$$\frac{|f(x + he_i, y) - f(x, y)|}{|h|} \leq \int_0^1 \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + t h e_i, y) \right| dt \leq g(y).$$

Nach Satz 6.6 ist die Funktion  $F$  in jedem Punkt  $x \in U$  nach  $x_i$  partiell differenzierbar, und die partielle Ableitung ist durch Differentiation unter dem Integralzeichen gegeben. Aber nach Satz 6.5 sind die partiellen Ableitungen stetig auf  $U$ , also ist  $F \in C^1(U)$ . □

**Beispiel 6.2** Als Beispiel untersuchen wir das uneigentliche Integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

Das Integral konvergiert jedenfalls nicht absolut. Zur Regularisierung bilden wir das Parameterintegral

$$F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, F(t) = \int_0^\infty e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx.$$



Die Funktion  $f(t, x) = e^{-tx} \frac{\sin x}{x}$  hat für  $t \geq \delta > 0$  die Abschätzungen

$$|f(t, x)|, |\partial_t f(t, x)| \leq e^{-\delta x} =: g(x) \quad \text{wobei } g \in L^1([0, \infty)).$$

Differentiation unter dem Integral, siehe Folgerung 6.1, und zweimalige partielle Integration ergibt für alle  $t > 0$

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_0^\infty e^{-tx} (-\sin x) dx \\ &= \left[ e^{-tx} \cos x \right]_{x=0}^{x=\infty} + t \int_0^\infty e^{-tx} \cos x dx \\ &= -1 + t^2 \int_0^\infty e^{-tx} \sin x dx \\ &= -1 - t^2 F'(t). \end{aligned}$$

Weiter ist  $\lim_{t \nearrow \infty} f(t, x) = 0$  für  $x > 0$ , mit Majorante  $e^{-x}$ . Aus Satz 6.3 folgt  $\lim_{t \nearrow \infty} F(t) = 0$ , und somit  $F(t) = \pi/2 - \arctan t$  für alle  $t > 0$ .

Für  $t \searrow 0$  argumentieren wir anders. Für  $t \geq 0$  und  $0 < r < R < \infty$  verwenden wir  $\sin x = \operatorname{Im} e^{ix}$  und partielle Integration:

$$\begin{aligned} \int_r^R e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx &= \operatorname{Im} \int_r^R e^{(i-t)x} \frac{dx}{x} \\ &= \operatorname{Im} \left[ \frac{e^{(i-t)x}}{(i-t)x} \right]_{x=r}^{x=R} + \operatorname{Im} \int_r^R \frac{e^{(i-t)x}}{(i-t)} \frac{dx}{x^2}. \end{aligned}$$

Mit  $R \nearrow \infty$  sehen wir im Fall  $t = 0$  die Existenz von  $F(0) = \lim_{R \nearrow \infty} \int_0^R \frac{\sin x}{x} dx$ . Weiter folgt für  $t \geq 0$  die Abschätzung, beachte  $|i - t| \geq 1$ ,

$$\left| \int_r^\infty e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{r}.$$

Somit liefert Aufspaltung der Integrale auf  $(0, r)$  sowie  $(r, \infty)$

$$|F(0) - F(t)| \leq \left| \int_0^r (1 - e^{-tx}) \frac{\sin x}{x} dx \right| + \frac{4}{r}.$$

Der Integrand konvergiert für  $t \searrow 0$  punktweise gegen Null und ist gleichmäßig beschränkt, also ist  $\limsup_{t \searrow 0} |F(0) - F(t)| \leq 4/r$ . Mit  $r \nearrow \infty$  folgt

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = F(0) = \lim_{t \searrow 0} F(t) = \lim_{t \searrow 0} (\pi/2 - \arctan t) = \pi/2.$$

Wir führen jetzt die  $L^p$ -Räume ein und zeigen, dass sie Banachräume sind. Dies ist mit die wichtigste Konsequenz der Konvergenzsätze.

**Definition 6.1 ( $L^p$ -Raum)** Für  $\mu$ -messbares  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  und  $1 \leq p \leq \infty$  setzen wir

$$\|f\|_{L^p(\mu)} = \begin{cases} \left( \int |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{für } 1 \leq p < \infty \\ \inf \{s > 0 : \mu(\{|f| > s\}) = 0\} & \text{für } p = \infty. \end{cases}$$

Auf  $\mathcal{L}^p(\mu) = \{f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} : f \text{ } \mu\text{-messbar, } \|f\|_{L^p(\mu)} < \infty\}$  betrachten wir die Äquivalenzrelation

$$f \sim g \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = g(x) \text{ für } \mu\text{-fast-alle } x \in X,$$

und definieren den  $L^p$ -Raum durch  $L^p(\mu) = \mathcal{L}^p(\mu) / \sim$ .

Wir schreiben  $\|\cdot\|_{L^p}$  statt  $\|\cdot\|_{L^p(\mu)}$ , wenn sich das Maß aus dem Kontext ergibt. Es ist üblich, die Elemente von  $L^p(\mu)$  wieder als Funktionen zu bezeichnen. Etwas allgemeiner kann auch der Begriff der  $L^p$ -Funktion auf einer messbaren Teilmenge definiert werden.

**Definition 6.2** Für  $E \subset X$   $\mu$ -messbar und  $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  sei  $f_0 : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  die Fortsetzung mit  $f_0(x) = 0$  für alle  $x \in X \setminus E$ . Wir setzen dann

$$\mathcal{L}^p(E) = \{f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} : f_0 \in \mathcal{L}^p(X)\},$$

und  $L^p(E, \mu) = \mathcal{L}^p(E, \mu) / \sim$  (analog zu Definition 6.1).

**Proposition 6.1** Für  $1 \leq p \leq \infty$  ist  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_{L^p(\mu)})$  ein normierter Vektorraum. Insbesondere gelten für  $\lambda \in \mathbb{R}$  und  $f, g \in L^p(\mu)$  folgende Aussagen:

- (1)  $\|f\|_{L^p} = 0 \quad \Rightarrow \quad f = 0 \text{ } \mu\text{-fast-überall.}$
- (2)  $f \in L^p(\mu), \lambda \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lambda f \in L^p(\mu) \text{ und } \|\lambda f\|_{L^p} = |\lambda| \|f\|_{L^p}.$
- (3)  $f, g \in L^p(\mu) \quad \Rightarrow \quad f + g \in L^p(\mu) \text{ und } \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$

BEWEIS: Sei zunächst  $1 \leq p < \infty$ . Dann ist  $\|f\|_{L^p}$  wohldefiniert nach Satz 5.4, und Folgerung 5.3 impliziert Aussage (1). Weiter folgt Behauptung (2) aus der Linearität des Integrals, siehe Satz 5.6. Da die Funktion  $t \mapsto t^p$  auf  $[0, \infty)$  konvex ist, gilt nun

$$|f + g|^p = 2^p \left| \frac{f + g}{2} \right|^p \leq 2^{p-1} (|f|^p + |g|^p).$$

Nach dem Majorantenkriterium ist mit  $f, g \in L^p(\mu)$  also auch  $f + g \in L^p(\mu)$ . Die Dreiecksungleichung wird unten in Satz 6.8 mithilfe der Hölderschen Ungleichung gezeigt.

Im Fall  $p = \infty$  ist (1) klar. Für (2) und (3) verwenden wir, wobei  $\lambda > 0$  angenommen wird,

$$\{|\lambda f| > \lambda s\} = \{|f| > s\} \quad \text{und} \quad \{|f + g| > s_1 + s_2\} \subset (\{|f| > s_1\} \cup \{|g| > s_2\}).$$

Daraus ergibt sich leicht die Behauptung. □

**Lemma 6.1 (Youngsche Ungleichung)** Für  $1 < p, q < \infty$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  und  $x, y \geq 0$  gilt

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

BEWEIS: Sei  $y \geq 0$  fest und  $f(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q - xy$ . Dann gilt

$$f'(x) = x^{p-1} - y \begin{cases} < 0 & \text{für } x < y^{\frac{1}{p-1}} \\ > 0 & \text{für } x > y^{\frac{1}{p-1}} \end{cases}$$

Also gilt für alle  $x \geq 0$

$$f(x) \geq f(y^{\frac{1}{p-1}}) = \frac{1}{p} y^{\frac{p}{p-1}} + \frac{1}{q} y^{\frac{p}{p-1}} - y^{\frac{p}{p-1}} = 0.$$

□

**Satz 6.7 (Höldersche Ungleichung)** Für  $\mu$ -messbare  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  gilt

$$\left| \int f g d\mu \right| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}, \quad \text{falls } 1 \leq p, q \leq \infty \text{ mit } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

BEWEIS: Wir können  $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^q} = 1$  und  $f, g \geq 0$  annehmen. Aus Lemma 6.1 folgt

$$\int f g d\mu \leq \int \left( \frac{1}{p} f^p + \frac{1}{q} g^q \right) d\mu = 1 = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Der Fall  $p = 1, q = \infty$  ergibt sich direkt aus Satz 5.4. □

Die Höldersche Ungleichung hat als Spezialfall für  $p = q = 2$  die Ungleichung von Cauchy-Schwarz. Wir können nun den noch fehlenden Beweis der Dreiecksungleichung in  $L^p(\mu)$  nachtragen.

**Satz 6.8 (Minkowski-Ungleichung)** Für  $f, g \in L^p(\mu)$  mit  $1 \leq p \leq \infty$  gilt

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

BEWEIS: Indem wir im letzten Schritt die Höldersche Ungleichung anwenden, folgt

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{L^p(\mu)}^p &= \int |f + g|^p d\mu \\ &\leq \int |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int |g| |f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \|f\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p-1} + \|g\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p-1}. \end{aligned}$$

Kürzen liefert die Behauptung. □

Das folgende Lemma stellt den wesentlichen Schritt im Beweis der Vollständigkeit von  $L^p(\mu)$  dar.

**Lemma 6.2** Sei  $1 \leq p < \infty$  und  $f_k = \sum_{j=1}^k u_j$  mit  $u_j \in L^p(\mu)$ . Falls  $\sum_{j=1}^{\infty} \|u_j\|_{L^p} < \infty$ , so gelten folgende Aussagen:

- (1) Es gibt eine  $\mu$ -Nullmenge  $N$ , so dass  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  für alle  $x \in X \setminus N$  existiert.
- (2) Mit  $f := 0$  auf  $N$  gilt  $f \in L^p(\mu)$ .
- (3)  $\|f - f_k\|_{L^p} \rightarrow 0$ .

BEWEIS: Wir betrachten die Funktionen

$$g_k = \sum_{j=1}^k |u_j| \quad \text{und} \quad g = \sum_{j=1}^{\infty} |u_j|.$$

Es gilt  $g_1 \leq g_2 \leq \dots$  und  $g_k(x) \rightarrow g(x) \in [0, \infty]$  mit  $k \rightarrow \infty$  für alle  $x \in X$ . Aus dem Satz über monotone Konvergenz, Satz 5.5, und der Minkowski-Ungleichung folgt

$$\|g\|_{L^p} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \|u_j\|_{L^p} < \infty.$$

Wegen Folgerung 5.3 ist  $N := \{g = \infty\}$  eine  $\mu$ -Nullmenge. Für  $x \in X \setminus N$  ist die reelle Reihe  $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(x)$  absolut konvergent, also ist  $(f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$  eine Cauchyfolge in  $\mathbb{R}$ . Damit existiert der Grenzwert  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ , und es gilt weiter

$$|f_k|^p \leq g^p \in L^1(\mu) \quad \text{sowie} \quad |f - f_k|^p \leq 2^{p-1}(|f|^p + |f_k|^p) \leq 2^p g^p.$$

Der Satz über majorisierte Konvergenz, Satz 6.3, liefert  $f \in L^p(\mu)$  und  $\|f - f_k\|_{L^p} \rightarrow 0$ .  $\square$

**Satz 6.9 (Riesz-Fischer)**  $(L^p(\mu), \|\cdot\|_{L^p})$  ist vollständig, also ein Banachraum.

BEWEIS: Sei  $f_k \in L^p(\mu)$  eine gegebene Cauchyfolge bezüglich der Norm  $\|\cdot\|_{L^p}$ . Es reicht aus, eine Teilfolge anzugeben, die in  $L^p(\mu)$  konvergiert. Wir betrachten zuerst den Fall  $1 \leq p < \infty$ , und können nach evtl. Wahl einer Teilfolge annehmen:

$$\|f_{k+1} - f_k\|_{L^p} \leq 2^{-k} \text{ für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Mit  $f_0 := 0$  gilt  $f_k = \sum_{j=1}^k u_j$  für  $u_j = f_j - f_{j-1}$ . Die Voraussetzungen von Lemma 6.2 sind erfüllt, also konvergiert  $f_k$  in  $L^p(\mu)$  sowie punktweise  $\mu$ -fast-überall gegen eine Funktion  $f \in L^p(\mu)$ . Dies beweist den Satz für  $1 \leq p < \infty$ .

Sei nun  $p = \infty$ . Wegen  $|\|f_k\|_{L^\infty} - \|f_l\|_{L^\infty}| \leq \|f_k - f_l\|_{L^\infty}$  existiert  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_{L^\infty}$ . Die folgenden Mengen haben  $\mu$ -Maß Null:

$$N_k = \{|f_k| > \|f_k\|_{L^\infty}\} \quad \text{sowie} \quad N_{k,l} = \{|f_k - f_l| > \|f_k - f_l\|_{L^\infty}\}.$$

Also ist  $N = \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k \cup \bigcup_{k,l=1}^{\infty} N_{k,l}$  ebenfalls eine Nullmenge. Für  $x \in X \setminus N$  gilt nun

$$|f_k(x) - f_l(x)| \leq \|f_k - f_l\|_{L^\infty} < \varepsilon \quad \text{für } k, l \geq k(\varepsilon),$$

insbesondere ist  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  definiert. Weiter haben wir für  $x \in X \setminus N$

$$|f(x)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_{L^\infty}, \text{ und}$$

$$|f_k(x) - f(x)| = \lim_{l \rightarrow \infty} |f_k(x) - f_l(x)| \leq \varepsilon \text{ für } k \geq k(\varepsilon).$$

Dies bedeutet  $\|f\|_{L^\infty} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_{L^\infty} < \infty$  und  $\|f_k - f\|_{L^\infty} \rightarrow 0$  mit  $k \rightarrow \infty$ .  $\square$

Ein Teilergebnis des Beweises, das oft benutzt wird, ist die

**Folgerung 6.2** Konvergiert  $f_k$  gegen  $f$  in  $L^p(\mu)$ , so konvergiert eine Teilfolge  $f_{k_j}$  punktweise  $\mu$ -fast-überall gegen  $f$ .

Auf die Wahl der Teilfolge in Folgerung 6.2 kann für  $p < \infty$  im allgemeinen nicht verzichtet werden. Betrachte dazu folgendes

**Beispiel 6.3** Jedes  $n \in \mathbb{N}$  besitzt eine eindeutige Darstellung  $n = 2^k + j$  mit  $k \in \mathbb{N}_0$ ,  $0 \leq j < 2^k$ . Definiere damit eine Folge von Funktionen  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } j 2^{-k} \leq x \leq (j+1)2^{-k} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es folgt  $\int_0^1 f_n(x) dx = 2^{-k} < 2/n \rightarrow 0$  mit  $n \rightarrow \infty$ . Andererseits gilt  $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$  für alle  $x \in [0, 1)$ , denn zu  $x \in [0, 1)$ ,  $k \in \mathbb{N}$  können wir  $j \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$  wählen mit  $j 2^{-k} \leq x < (j+1) 2^{-k}$ , also  $f_n(x) = 1$  für  $n = 2^k + j$ . Also konvergiert die Folge nicht punktweise  $\mathcal{L}^1$ -fast-überall gegen Null.

Wir betrachten nun speziell das  $n$ -dimensionale Lebesguemaß. Im Gegensatz zu einem allgemeinen Maßraum haben wir auf  $\mathbb{R}^n$  eine Metrik zur Verfügung. Eine naheliegende Frage ist dann, ob  $L^p$ -Funktionen durch stetige Funktionen approximiert werden können. Ziel ist eine Version für  $L^p$ -Funktionen auf einer offenen Teilmenge  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , siehe Definition 6.2. Wie allgemein üblich schreiben wir kurz  $L^p(\Omega)$  statt  $L^p(\Omega, \mathcal{L}^n)$ .

**Definition 6.3** Der Träger einer Funktion  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ist die Menge

$$\text{spt } f = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}.$$

Der Raum der stetigen Funktionen mit kompaktem Träger in  $\Omega$  wird mit  $C_c^0(\Omega)$  bezeichnet.

Für  $K \subset \Omega$  kompakt sei  $\text{dist}(\cdot, K) : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ ,  $\text{dist}(x, K) = \inf_{z \in K} |x - z|$  die Abstandsfunktion von  $K$ . Wir brauchen die folgenden zwei Tatsachen:

$$(6.2) \quad \text{dist}(\cdot, K) \text{ ist Lipschitzstetig mit Konstante Eins.}$$

$$(6.3) \quad \text{dist}(\mathbb{R}^n \setminus \Omega, K) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega} \text{dist}(x, K) > 0.$$

**Satz 6.10 (Dichtheit von  $C_c^0(\Omega)$  in  $L^p(\Omega)$ )** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $1 \leq p < \infty$ . Dann gibt es zu jedem  $f \in L^p(\Omega)$  eine Folge  $f_k \in C_c^0(\Omega)$  mit  $\|f - f_k\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$ .

BEWEIS: Wir zeigen die Aussage zuerst für  $f = \chi_E$ , wobei  $E \subset \Omega$  eine  $\mathcal{L}^n$ -messbare Menge ist mit  $\mathcal{L}^n(E) < \infty$ . Nach Satz 4.3 existiert  $K \subset E$  kompakt mit  $\mathcal{L}^n(E \setminus K) < \varepsilon/2$ . Setze

$$f_\varrho : \Omega \rightarrow [0, 1], f_\varrho(x) = \left(1 - \frac{\text{dist}(x, K)}{\varrho}\right)^+.$$

Nach (6.2), (6.3) ist  $f_\varrho \in C^0(\mathbb{R}^n)$  und  $\text{spt } f_\varrho = \{x : \text{dist}(x, K) \leq \varrho\}$  kompakte Teilmenge von  $\Omega$  für  $\varrho > 0$  hinreichend klein. Da  $f_\varrho = f$  auf  $K$ , folgt

$$\begin{aligned} \int_\Omega |f_\varrho - f|^p d\mathcal{L}^n &\leq 2^{p-1} \int_{\Omega \setminus K} (|f_\varrho|^p + |f|^p) d\mathcal{L}^n \\ &\leq \mathcal{L}^n(\{0 < \text{dist}(\cdot, K) \leq \varrho\}) + \mathcal{L}^n(E \setminus K) \\ &< \varepsilon \quad \text{für } \varrho > 0 \text{ hinreichend klein.} \end{aligned}$$

Sei nun  $f \in L^p(\Omega)$  beliebig. Wir können  $f \geq 0$  annehmen, sonst betrachte  $f^+$  und  $f^-$ . Nach Satz 5.3 gibt es eine Folge  $f_1 \leq f_2 \leq \dots$  von nichtnegativen  $\mathcal{L}^n$ -Treppenfunktionen auf  $\mathbb{R}^n$

mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f_0(x)$  für alle  $x \in \mathbb{R}^n$ ; dabei bezeichnet  $f_0$  die Fortsetzung von  $f$  mit  $f \equiv 0$  auf  $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ . Es folgt  $f_k \rightarrow f_0$  in  $L^p(\Omega)$  mit dem Satz über majorisierte Konvergenz. Da jede Treppenfunktion endliche Linearkombination von charakteristischen Funktionen ist, folgt die Behauptung des Satzes.  $\square$

**Bemerkung 6.2** Sei  $BC^0(\Omega)$  der Raum der beschränkten, stetigen Funktionen  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  auf der offenen Menge  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . Der Raum ist vollständig mit der Supremumsnorm  $\|f\|_\Omega$ . Indem wir  $f \in BC^0(\Omega)$  seine fast-überall Äquivalenzklasse zuordnen, erhalten wir eine lineare Abbildung

$$I : (BC^0(\Omega), \|\cdot\|_\Omega) \rightarrow (L^\infty(\Omega), \|\cdot\|_{L^\infty(\Omega)}).$$

Für  $f \in BC^0(\Omega)$  sind die Mengen  $\{|f| > s\}$  offen, also gilt  $\mu(\{|f| > s\}) > 0$  genau wenn  $s < \|f\|_\Omega$ , und damit weiter  $\|I(f)\|_{L^\infty(\Omega)} = \|f\|_\Omega$ . Gilt  $I(f_n) \rightarrow [f]$  in  $L^\infty(\Omega)$ , so ist  $f_n$  eine Cauchyfolge bezüglich  $\|\cdot\|_\Omega$ , konvergiert also gleichmäßig gegen ein  $f \in BC^0(\Omega)$ . Es folgt  $[f] = I(f)$ , also ist  $I(BC^0(\Omega))$  abgeschlossen in  $L^\infty(\Omega)$ . Es gibt aber Funktionen  $f \in L^\infty(\Omega)$  ohne stetige Repräsentantin. Somit ist  $I(BC^0(\Omega))$  nicht dicht in  $L^\infty(\Omega)$ .

Die Entstehung des Konzepts des Lebesgueintegrals ist eng verknüpft mit dem Problem der Darstellbarkeit einer periodischen Funktion durch ihre Fourierreihe. Sei  $L^2(I; \mathbb{C})$  der Raum der  $\mathcal{L}^1$ -messbaren Funktionen  $f : I = (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{C}$ , also  $u = \operatorname{Re} f$  und  $v = \operatorname{Im} f$  sind  $\mathcal{L}^1$ -messbar, mit

$$\|f\|_{L^2} = \left( \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} < \infty.$$

Dabei schreiben wir im folgenden  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$  statt  $\int_I f(x) d\mathcal{L}^1(x)$ . Nach Satz 6.9 ist  $L^2(I; \mathbb{C})$  bezüglich der  $L^2$ -Norm vollständig, also ein Hilbertraum mit dem hermiteschen Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle_{L^2} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Die Funktionen  $w_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , bilden ein Orthonormalsystem und spannen den Raum  $\mathbb{P}$  der trigonometrischen Polynome auf. Das  $n$ -te Fourierpolynom von  $f$  ist definiert als die Orthogonalprojektion von  $f$  auf den Raum  $\mathbb{P}_n$  der trigonometrischen Polynome vom Grad höchstens  $n$ , also

$$f_n = \sum_{k=-n}^n \langle f, w_k \rangle_{L^2} w_k = \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

Dabei bezeichnet  $\hat{f}(k)$  die Fourierkoeffizienten von  $f$ :

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \langle f, w_k \rangle_{L^2}.$$

Die Folge  $f_n$  heißt Fourierreihe von  $f$ . Wegen  $f - f_n \perp_{L^2} \mathbb{P}_n$  gilt für alle  $p \in \mathbb{P}_n$  die Gleichung

$$(6.4) \quad \|f - p\|_{L^2}^2 = \|(f - f_n) + (f_n - p)\|_{L^2}^2 = \|f - f_n\|_{L^2}^2 + \|f_n - p\|_{L^2}^2.$$

Insbesondere folgt mit  $p \equiv 0$  die Besselsche Ungleichung

$$(6.5) \quad 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2 = 2\pi \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n |\hat{f}(k)|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{L^2}^2 < \infty.$$

Für  $f \in L^2(I; \mathbb{C})$  und  $m \geq n$  folgt

$$\|f_m - f_n\|_{L^2}^2 = 2\pi \sum_{k=n+1}^m |\hat{f}(k)|^2 < \varepsilon \quad \text{für } n \geq N,$$

das heißt  $f_n$  ist eine  $L^2$ -Cauchyfolge und konvergiert nach Satz 6.9, dem Satz von Riesz-Fischer, gegen eine gewisse  $L^2$ -Funktion. Die entscheidende Frage lautet: ist dieser Grenzwert die Funktion  $f$ ? Wegen (6.4) haben wir die folgende Bestapproximations-Eigenschaft der Fourierreihe:

$$(6.6) \quad \|f - f_n\|_{L^2} = \min_{p \in \mathbb{P}_n} \|f - p\|_{L^2}.$$

Die  $L^2$ -Konvergenz der Fourierreihe gegen  $f$  folgt somit aus nachstehendem Resultat:

**Satz 6.11** *Der Raum  $\mathbb{P}$  der trigonometrischen Polynome ist dicht in  $L^2(I; \mathbb{C})$ .*

BEWEIS: Nach Satz 6.10 ist  $C_c^0(I; \mathbb{C})$  dicht in  $L^2(I; \mathbb{C})$ . Weiter kann jede  $C_c^0$ -Funktion bezüglich der  $L^2$ -Norm (sogar gleichmäßig) durch stückweise konstante Funktionen approximiert werden. Wir zeigen nun, dass die Fourierreihe  $f_n$  einer beliebigen stückweise konstanten Funktion  $f$  punktweise – bis auf eventuell in den Sprungstellen – gegen  $f$  konvergiert. Dann konvergiert  $f_n$  auch bezüglich der  $L^2$ -Norm gegen  $f$ , denn die Cauchyfolge  $f_n$  ist in  $L^2(I; \mathbb{C})$  konvergent und nach Folgerung 6.2 kann der Grenzwert nur die Funktion  $f$  sein. Damit ist die Behauptung des Lemma dann bewiesen.

Die Funktion  $f$  sei mit Periode  $2\pi$  auf  $\mathbb{R}$  fortgesetzt. Nach Definition von  $f_n$  gilt für  $x_0 \in I$

$$f_n(x_0) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e^{ikx_0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sum_{k=-n}^n e^{-ik(x-x_0)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + \xi) \sum_{k=-n}^n e^{-ik\xi} d\xi.$$

Dabei wurde  $x = x_0 + \xi$  substituiert und die Periodizität ausgenutzt. Nun ist  $(f_0)_n = f_0$  für die konstante Funktion  $f_0(x) \equiv 1$ , da  $f_0 \in \mathbb{P}_n$ . Es folgt

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=-n}^n e^{-ik\xi} d\xi.$$

Weiter berechnen wir für  $\xi \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k=-n}^n e^{-ik\xi} = e^{-in\xi} \sum_{k=0}^{2n} e^{ik\xi} = e^{-in\xi} \frac{e^{i(2n+1)\xi} - 1}{e^{i\xi} - 1} = \frac{e^{i(n+1)\xi} - e^{-in\xi}}{e^{i\xi} - 1}.$$

Damit erhalten wir die Darstellung

$$\begin{aligned} f_n(x_0) - f(x_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x_0 + \xi) - f(x_0)) \sum_{k=-n}^n e^{-ik\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0)}{e^{i\xi} - 1} e^{i(n+1)\xi} d\xi - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0)}{e^{i\xi} - 1} e^{-in\xi} d\xi. \end{aligned}$$

Ist  $f$  stückweise konstant und  $x_0$  keine Sprungstelle von  $f$ , so verschwindet  $f(x_0 + \xi) - f(x_0)$  nahe bei  $\xi = 0$ . Auf der rechten Seite stehen dann die Fourierkoeffizienten  $\hat{F}(-n-1) - \hat{F}(n)$

der beschränkten Funktion  $F(\xi) = (f(x_0 + \xi) - f(x_0))/(e^{i\xi} - 1)$ , und aus der Besselschen Ungleichung (6.5) folgt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$ .  $\square$

Es bezeichne nun  $\ell^2(\mathbb{C})$  den Raum aller komplexen Folgen  $c = (c_k)_{k \in \mathbb{Z}}$  mit

$$\|c\|_{\ell^2}^2 = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 < \infty.$$

Der Raum  $\ell^2(\mathbb{C})$  ist vollständig und damit ein Hilbertraum. Dies folgt aus dem Satz von Riesz-Fischer, angewandt auf das Zahlmaß auf  $\mathbb{Z}$ ; es kann natürlich auch ad hoc gezeigt werden. Das bewiesene Resultat kann damit folgendermaßen formuliert werden:

**Satz 6.12 (Vollständigkeit der trigonometrischen Polynome)** *Für  $f \in L^2(I; \mathbb{C})$  konvergiert die Fourierreihe bezüglich der  $L^2$ -Norm gegen  $f$ , und die Abbildung*

$$\mathcal{F} : (L^2(I; \mathbb{C}), \|\cdot\|_{L^2}) \longrightarrow (\ell^2(\mathbb{C}), \|\cdot\|_{\ell^2}), \quad \mathcal{F}(f) = (\hat{f}(k))_{k \in \mathbb{Z}},$$

*ist eine (bijektive) Isometrie von Hilberträumen.*

BEWEIS: Die Konvergenz  $f_n \rightarrow f$  in  $L^2(I; \mathbb{C})$  gilt nach Satz 6.11 und (6.6); insbesondere folgt hieraus die Injektivität der Abbildung  $\mathcal{F}$ . Die Surjektivität ergibt sich aus Satz 6.9, denn für  $c \in \ell^2(\mathbb{C})$  ist die Folge  $f_n = \sum_{k=-n}^n c_k e^{-ikx}$  eine Cauchyfolge in  $L^2(I; \mathbb{C})$ . Schließlich erhalten wir aus (6.4) mit  $p \equiv 0$  und der gezeigten  $L^2$ -Konvergenz  $f_n \rightarrow f$ , vgl. (6.5),

$$2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^2}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|f\|_{L^2}^2 - \|f - f_n\|_{L^2}^2) = \|f\|_{L^2}^2.$$

$\square$

Das Resultat ist ein Spezialfall des Spektralsatzes für selbstadjungierte Operatoren. Dieser verallgemeinert die aus der Linearen Algebra bekannte Diagonalisierbarkeit symmetrischer Matrizen, und wird in verschiedenen Varianten in der Funktionalanalysis bewiesen. Der Operator ist hier  $-\frac{d^2}{dx^2}$ , wir können ihn als Endomorphismus des Raums  $C_{per}^\infty(I)$  diejenigen Funktionen auffassen, deren  $2\pi$ -periodische Fortsetzung glatt ist:

$$H : C_{per}^\infty(I) \rightarrow C_{per}^\infty(I), \quad Hf = -\frac{d^2 f}{dx^2}.$$

Mit partieller Integration zeigt man  $\langle Hf, g \rangle_{L^2} = \langle f, Hg \rangle_{L^2}$  für alle  $f, g \in C_{per}^\infty(I)$ , sowie  $\langle Hf, f \rangle_{L^2} \geq 0$ . Die  $w_k$  sind Eigenfunktionen von  $H$  zu den Eigenwerten  $\lambda_k = k^2$ :

$$Hw_k = k^2 w_k \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}.$$

Die  $w_k$  bilden eine Basis von  $\mathbb{P}$ , aber nicht von  $C_{per}^\infty(I)$ . Der Satz besagt, dass der von den Eigenfunktionen von  $H$  aufgespannte Raum  $\mathbb{P}$  aber dicht in  $L^2(I; \mathbb{C})$  ist.

**Satz 6.13 (Egorov)** *Sei  $\mu$  ein Maß auf  $\mathcal{A} \subset 2^X$  mit  $\mu(X) < \infty$ . Konvergiert die Folge  $f_k$  messbarer Funktionen punktweise  $\mu$ -fast-überall gegen  $f$ , so gibt es zu  $\delta > 0$  eine Menge  $A \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(X \setminus A) < \delta$ , so dass  $f_k|_A$  gleichmäßig gegen  $f|_A$  konvergiert.*



BEWEIS: Für jedes  $\varepsilon > 0$  bilden die Mengen  $C_j^\varepsilon = \bigcup_{k=j}^\infty \{|f - f_k| \geq \varepsilon\} \in \mathcal{A}$  eine absteigende Folge. Ist  $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ , so gilt  $x \notin C_j^\varepsilon$  für  $j$  groß, also folgt nach Satz 2.4(ii)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mu(C_j^\varepsilon) = \mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty C_j^\varepsilon\right) = 0.$$

Hier wurde die Bedingung  $\mu(X) < \infty$  benutzt. Wähle nun eine Folge  $\varepsilon_\nu \searrow 0$ , und bestimme zu jedem  $\nu \in \mathbb{N}$  ein  $j_\nu \in \mathbb{N}$  mit  $\mu(C_{j_\nu}^{\varepsilon_\nu}) < 2^{-\nu}\delta$ , also

$$\mu\left(\bigcup_{\nu=1}^\infty C_{j_\nu}^{\varepsilon_\nu}\right) < \delta.$$

Mit  $A := X \setminus \left(\bigcup_{\nu=1}^\infty C_{j_\nu}^{\varepsilon_\nu}\right) \in \mathcal{A}$  folgt  $\sup_{x \in A} |f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon_\nu$  für  $k \geq j_\nu$ .  $\square$

**Satz 6.14 (Konvergenzsatz von Vitali)** Sei  $\mu$  ein Maß auf  $\mathcal{A} \subset 2^X$  und  $1 \leq p < \infty$ . Die Folge  $f_n \in L^p(\mu)$  konvergiere punktweise  $\mu$ -fast-überall gegen  $f$ . Dann sind folgende Aussagen (a) und (b) äquivalent:

(a)  $f \in L^p(\mu)$  und  $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ .

(b) Mit  $\lambda(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_A |f_n|^p d\mu$  gilt:

(1) Zu  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $\delta > 0$  mit  $\lambda(A) < \varepsilon$  für alle  $A \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(A) < \delta$ .

(2) Zu  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $E \in \mathcal{A}$  mit  $\mu(E) < \infty$  und  $\lambda(X \setminus E) < \varepsilon$ .

Eine Folge mit (1) und (2) heißt gleichgradig integrierbar.

BEWEIS: Es gelte  $f_n \rightarrow f$  in  $L^p(\mu)$ . Die Minkowski-Ungleichung ergibt dann für jedes  $A \in \mathcal{A}$

$$\left| \|f_n\|_{L^p(A)} - \|f\|_{L^p(A)} \right| \leq \|f_n - f\|_{L^p(A)} \leq \|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0,$$

also folgt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(A)} = \|f\|_{L^p(A)}$  und somit

$$\lambda(A) = \int_A |f|^p d\mu.$$

Eigenschaft (1) gilt nach Bemerkung 6.1. Mit  $E_\delta = \{|f|^p > \delta\} \in \mathcal{A}$  gilt

$$\mu(E_\delta) \leq \frac{1}{\delta} \int |f|^p d\mu < \infty.$$

Für  $\delta \searrow 0$  konvergiert  $\chi_{X \setminus E_\delta} |f|^p$  punktweise gegen Null mit Majorante  $|f|^p$ , also folgt für  $\delta > 0$  hinreichend klein

$$\lambda(X \setminus E_\delta) = \int_{X \setminus E_\delta} |f|^p d\mu < \varepsilon.$$

Seien jetzt umgekehrt (1) und (2) vorausgesetzt. Zu  $\varepsilon > 0$  sei  $E \in \mathcal{A}$  wie in (2) und  $\delta > 0$  wie in (1) gewählt. Da  $\mu(E) < \infty$ , gibt es nach dem Satz von Egorov ein  $A \in \mathcal{A}$  mit  $A \subset E$  und  $\mu(E \setminus A) < \delta$ , so dass  $f_n \rightarrow f$  gleichmäßig auf  $A$ . Nun gilt

$$|f_n - f|^p \leq \chi_A |f - f_n|^p + 2^{p-1}(\chi_{X \setminus E} + \chi_{E \setminus A})(|f|^p + |f_n|^p).$$

Ferner folgt aus dem Lemma von Fatou, Satz 6.2, für alle  $B \in \mathcal{A}$

$$\int_B |f|^p d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_B |f_n|^p d\mu \leq \lambda(B).$$

Also erhalten wir mit  $n \rightarrow \infty$  wegen (2) und (1)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} \leq 2^p (\lambda(X \setminus E) + \lambda(E \setminus A)) < 2^{p+1} \varepsilon.$$

□

Bedingung (1) schließt eine Konzentration des Integrals wie in Beispiel 6.1 aus, und Bedingung (2) verhindert zum Beispiel eine Konzentration bei Unendlich wie im Beispiel

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n = \chi_{[n, n+1]}.$$

## 7 Der Satz von Fubini

Mit dem Cavalierischen Prinzip kann das Volumen von Körpern durch Zerlegung in parallele Schnitte berechnet werden. Allgemeiner können mit dem Satz von Fubini mehrdimensionale Integrale bzw. allgemeiner Integrale in Produkträumen auf Integrationen in den Faktoren zurückgeführt werden. Gleichzeitig liefert der Satz eine optimale Aussage zur Vertauschbarkeit der Reihenfolge der Integrationen bei iterierten Integralen.

Die Idee der Volumenberechnung durch Zerlegung in parallele Schnitte wurde schon von Archimedes benutzt und ist in folgender Fassung als Cavalierisches Prinzip bekannt: gilt für die Schnitte in jeder Höhe  $y$  von zwei Körpern  $K, L \subset \mathbb{R}^3$  das Verhältnis  $\mathcal{L}^2(K_y) = \theta \mathcal{L}^2(L_y)$ , so folgt auch  $\mathcal{L}^3(K) = \theta \mathcal{L}^3(L)$ . Mit diesem Argument lässt sich das Volumen einer Kugel folgendermaßen berechnen.

**Beispiel 7.1** Betrachte in  $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$  die folgenden Mengen und die Maße ihrer zweidimensionalen Schnitte in Höhe  $y \in (0, 1)$ ; dabei sei  $\pi = \mathcal{L}^2(\{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\})$ .

$$\begin{aligned} \text{Zylinder:} \quad Z &= \{(x, y) : |x| < 1, 0 < y < 1\} & \mathcal{L}^2(Z_y) &= \pi, \\ \text{Kegel:} \quad K &= \{(x, y) : |x| < y, 0 < y < 1\} & \mathcal{L}^2(K_y) &= \pi y^2, \\ \text{Halbkugel:} \quad H &= \{(x, y) : |x| < \sqrt{1 - y^2}, 0 < y < 1\} & \mathcal{L}^2(H_y) &= \pi(1 - y^2). \end{aligned}$$

Durch Vergleich mit einem Quader gleicher Höhe und gleichen Querschnitts folgt aus dem Cavalierischen Prinzip  $\mathcal{L}^3(Z) = \pi$ . Betrachte weiter die Pyramide

$$P = \{y(x, 1) : x \in (-1, 1)^2, 0 < y < 1\}.$$

Sechs kongruente Exemplare setzen sich zu einem Würfel der Kantenlänge zwei zusammen, also gilt  $6 \mathcal{L}^3(P) = 8$ . Wegen  $\mathcal{L}^2(P_y) = 4y^2$  folgt aus dem Cavalierischen Prinzip  $\mathcal{L}^3(K) = \frac{\pi}{4} \mathcal{L}^3(P) = \frac{\pi}{3}$ . Schließlich erhalten wir, wieder mit Cavalieri,

$$\mathcal{L}^3(Z) = \mathcal{L}^3(K) + \mathcal{L}^3(H) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^3(H) = \frac{2\pi}{3}.$$

Insbesondere folgt  $\mathcal{L}^3(K) : \mathcal{L}^3(H) : \mathcal{L}^3(Z) = 1 : 2 : 3$ .

Wir wollen nun Produktmaße einführen, wobei wir uns an der Konstruktion des Lebesgue-maßes aus Kapitel 4 orientieren können. Wir beschränken uns aber auf zwei Faktoren, der allgemeine Fall ist analog. Wir arbeiten hier mit äußeren Maßen, für beliebige Maße verweisen wir auf das Buch von Elstrodt.

**Definition 7.1 (Produktmenge)** Seien  $\alpha, \beta$  äußere Maße auf  $X, Y$ . Ist  $P \subset X \times Y$  von der Form  $P = A \times B$  mit  $A, B$  messbar bzgl.  $\alpha, \beta$ , so heißt  $P$  Produktmenge.

Die Darstellung  $P = A \times B$  ist eindeutig, außer wenn  $P = \emptyset$ .

**Lemma 7.1** Seien  $\alpha, \beta$  äußere Maße auf  $X, Y$ . Dann gilt:

- (1) Das System  $\mathcal{P}$  der Produktmengen ist ein Halbring.
- (2) Die Funktion  $\lambda : \mathcal{P} \rightarrow [0, \infty]$ ,  $\lambda(A \times B) = \alpha(A)\beta(B)$  ist ein Prämaß auf  $\mathcal{P}$ .

BEWEIS: Aussage (1) wurde in Folgerung 1.1 bewiesen. Ist  $A \times B = \emptyset$ , so ist  $A = \emptyset$  oder  $B = \emptyset$ , und damit  $\lambda(\emptyset) = \alpha(A)\beta(B) = 0$ . Hier und im Folgenden verwenden wir die Regel  $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$ . Sei nun  $P = A \times B$  eine Produktmenge. Der  $y$ -Schnitt von  $P$  ist

$$P_y = \{x \in X : (x, y) \in P\} = \begin{cases} A & y \in B \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ist  $P = \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$ , für paarweise disjunkte Produktmengen  $P_j$ , so folgt  $P_y = \bigcup_{j=1}^{\infty} (P_j)_y$ , ebenfalls disjunkt, und weiter mit dem Satz über monotone Konvergenz

$$\lambda(P) = \int_Y \alpha(P_y) d\beta(y) = \int_Y \sum_{j=1}^{\infty} \alpha((P_j)_y) d\beta(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_Y \alpha((P_j)_y) d\beta(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(P_j).$$

Dies beweist Aussage (2). □

**Definition 7.2 (Produktmaß)** Seien  $\alpha, \beta$  äußere Maße auf  $X, Y$ . Das Produktmaß  $\alpha \times \beta$  einer Menge  $E \subset X \times Y$  ist

$$(\alpha \times \beta)(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \alpha(A_j) \beta(B_j) : A_j, B_j \text{ messbar, } E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j \right\}.$$

Damit ist  $\alpha \times \beta$  die Caratheodory-Fortsetzung des Produktinhalts  $\lambda$  aus Lemma 7.1.

Ein wichtiges Beispiel ist natürlich das Lebesguemaß.

**Lemma 7.2** Es gilt  $\mathcal{L}^n = \mathcal{L}^k \times \mathcal{L}^m$  für  $n = k + m$ .

BEWEIS: Die Quader im  $\mathbb{R}^n$  sind die Produkte  $P \times Q$  von Quadern im  $\mathbb{R}^k$  und  $\mathbb{R}^m$ , und es gilt  $\lambda^n(P \times Q) = \lambda^k(P) \lambda^m(Q)$ . Somit ist

$$\mathcal{L}^n(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \lambda^k(P_j) \lambda^m(Q_j) : P_j, Q_j \text{ Quader, } E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j \times Q_j \right\}.$$

Es folgt direkt  $\mathcal{L}^k \times \mathcal{L}^m \leq \mathcal{L}^n$ . Für die umgekehrte Ungleichung reicht der Fall von Produktmengen, also  $\mathcal{L}^n(A \times B) \leq \mathcal{L}^k(A) \mathcal{L}^m(B)$ . Denn daraus folgt für  $E \subset \mathbb{R}^n$  beliebig

$$\mathcal{L}^n(E) \leq \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(A_j \times B_j) : A_j, B_j \text{ messbar, } E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j \right\} \leq (\mathcal{L}^k \times \mathcal{L}^m)(E).$$

Betrachte nun  $A \times B$  mit  $\mathcal{L}^k(A), \mathcal{L}^m(B) < \infty$ . Zu  $\varepsilon > 0$  gibt es Quader  $P_i, Q_j$  mit  $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$  und  $B \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ , sodass  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda^k(P_i) < \mathcal{L}^k(A) + \varepsilon$  und  $\sum_{j=1}^{\infty} \lambda^m(Q_j) < \mathcal{L}^m(B) + \varepsilon$ . Es folgt  $A \times B \subset \bigcup_{i,j=1}^{\infty} P_i \times Q_j$  und damit

$$\mathcal{L}^n(A \times B) \leq \sum_{i,j=1}^{\infty} \lambda^k(P_i) \lambda^m(Q_j) < (\mathcal{L}^k(A) + \varepsilon) (\mathcal{L}^m(B) + \varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{L}^k(A) \mathcal{L}^m(B).$$

Für  $\mathcal{L}^k(A) \mathcal{L}^m(B) = \infty$  ist nichts zu zeigen, es bleibt der Fall  $\mathcal{L}^k(A) = \infty, \mathcal{L}^m(B) = 0$  (oder umgekehrt). Mit  $A_\ell = \{x \in \mathbb{R}^n : \ell - 1 \leq |x| \leq \ell\}$  folgt


$$\mathcal{L}^n(A \times B) \leq \sum_{\ell=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(A_\ell \times B) \leq \sum_{\ell=1}^{\infty} \mathcal{L}^k(A_\ell) \mathcal{L}^m(B) = 0.$$

□

**Satz 7.1 (Cavalierisches Prinzip)** Seien  $\alpha$  und  $\beta$   $\sigma$ -endliche äußere Maße auf  $X$  bzw.  $Y$ , und  $D \subset X \times Y$  sei  $\alpha \times \beta$ -messbar. Dann ist  $D_y = \{x \in X : (x, y) \in D\}$   $\alpha$ -messbar für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$ , die Funktion  $y \mapsto \alpha(D_y)$  ist  $\beta$ -messbar und es gilt

$$(\alpha \times \beta)(D) = \int_Y \alpha(D_y) d\beta(y) = \int_Y \int_X \chi_D(x, y) d\alpha(x) d\beta(y).$$

Eine entsprechende Aussage gilt, wenn erst das  $\beta$ -Maß von  $D_x = \{y \in Y : (x, y) \in D\}$  gebildet und dann bezüglich  $\alpha$  über  $X$  integriert wird.



BEWEIS: Wir zeigen den Satz erst für  $(\alpha \times \beta)(D) < \infty$ . Nach Satz 3.2 gibt es eine Menge  $E \supset D$  mit  $E \in \sigma(\mathcal{P})$  und  $(\alpha \times \beta)(E \setminus D) = 0$ . Genauer besagt der dortige Zusatz: es kann  $E = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} E^{\nu}$  gewählt werden, wobei  $E^{\nu} = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_{\nu}^i$  paarweise disjunkte Vereinigung von Produktmengen  $P_{\nu}^i$  mit  $E^1 \supset E^2 \supset \dots$  und  $(\alpha \times \beta)(E^1) < \infty$ . Wir wollen zunächst folgende drei Aussagen beweisen:

$$(7.1) \quad E_y = \{x \in X : (x, y) \in E\} \text{ ist } \alpha\text{-messbar für alle } y \in Y,$$

$$(7.2) \quad \text{die Funktion } f_E : Y \rightarrow [0, \infty], y \mapsto \alpha(E_y) \text{ ist } \beta\text{-messbar,}$$

$$(7.3) \quad \gamma(E) := \int_Y f_E d\beta = (\alpha \times \beta)(E).$$

Sei  $\mathcal{E}$  das System aller  $\alpha \times \beta$ -messbaren Mengen mit (7.1), (7.2) und (7.3). Für eine Produktmenge  $A \times B$  gilt  $(A \times B)_y = A$ , falls  $y \in B$ , und  $(A \times B)_y = \emptyset$  sonst. Daraus folgt  $A \times B \in \mathcal{E}$ , und zwar genauer

$$f_{A \times B} = \alpha(A) \chi_B \quad \text{und} \quad \gamma(A \times B) = \alpha(A)\beta(B) = (\alpha \times \beta)(A \times B).$$

Als nächstes betrachte eine disjunkte Vereinigung  $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$  mit  $E_i \in \mathcal{E}$ . Dann ist  $E_y = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i)_y$   $\alpha$ -messbar,  $f_E = \sum_{i=1}^{\infty} f_{E_i}$  ist  $\beta$ -messbar, und aus dem Satz über monotone Konvergenz folgt

$$\gamma(E) = \int_Y \sum_{i=1}^{\infty} f_{E_i} d\beta = \sum_{i=1}^{\infty} \int_Y f_{E_i} d\beta = \sum_{i=1}^{\infty} (\alpha \times \beta)(E_i) = (\alpha \times \beta)(E).$$

Schließlich sei  $E^1 \supset E^2 \supset \dots$  eine absteigende Folge mit  $E^{\nu} \in \mathcal{E}$  und  $(\alpha \times \beta)(E^1) < \infty$ . Für  $E = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} E^{\nu}$  ist  $E_y = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} (E^{\nu})_y$   $\alpha$ -messbar für alle  $y \in Y$ , und wegen  $\int_Y f_{E^1} d\beta = (\alpha \times \beta)(E^1) < \infty$  gilt  $\alpha((E^1)_y) = f_{E^1}(y) < \infty$  für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$ . Aus Satz 2.4 folgt

$$f_E(y) = \alpha(E_y) = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \alpha((E^{\nu})_y) = \lim_{\nu \rightarrow \infty} f_{E^{\nu}}(y) \quad \text{für } \beta\text{-fast-alle } y \in Y.$$

Insbesondere ist  $f_E$   $\beta$ -messbar, und wegen  $f_{E^\nu} \leq f_{E^1}$  liefert der Satz von Lebesgue

$$\gamma(E) = \int_Y f_E d\beta = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int_Y f_{E^\nu} d\beta = \lim_{\nu \rightarrow \infty} (\alpha \times \beta)(E^\nu) = (\alpha \times \beta)(E).$$

Insgesamt sind nun (7.1), (7.2) und (7.3) für  $E$  wie oben gezeigt. Durch Anwendung auf eine  $\alpha \times \beta$ -Nullmenge  $N$  statt  $D$  erhalten wir eine Menge  $C \supset N$  mit  $C \in \mathcal{E}$  und  $(\alpha \times \beta)(C) = 0$ , also folgt

$$0 = (\alpha \times \beta)(C) = \int_Y \alpha(C_y) d\beta(y) \quad \Rightarrow \quad \alpha(N_y) \leq \alpha(C_y) = 0 \text{ für } \beta\text{-fast-alle } y \in Y.$$

Daraus folgt mit  $N = E \setminus D$  für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$ : die Menge  $D_y = E_y \setminus N_y$  ist  $\alpha$ -messbar und es gilt  $f_D(y) = f_E(y)$ . Insbesondere ist  $f_D$   $\beta$ -messbar und

$$\int_Y f_D d\beta = \int_Y f_E d\beta = (\alpha \times \beta)(E) = (\alpha \times \beta)(D).$$

Ist  $D$  lediglich  $\alpha \times \beta$ -messbar, so verwenden wir die Voraussetzung an  $\alpha$  und  $\beta$ . Nach Lemma 3.3 gilt  $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$  für  $\alpha \times \beta$ -messbare  $D_n$  mit  $(\alpha \times \beta)(D_n) < \infty$  und  $D_1 \subset D_2 \subset \dots$ . Also ist  $D_y = \bigcup_{n=1}^{\infty} (D_n)_y$  messbar bezüglich  $\alpha$ , es gilt  $f_{D_1} \leq f_{D_2} \leq \dots$  und

$$f_D(y) = \alpha(D_y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha((D_n)_y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{D_n}(y).$$

Folglich ist  $f_D$  messbar bzgl.  $\beta$  und der Satz über monotone Konvergenz impliziert

$$\int_Y f_D d\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y f_{D_n} d\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha \times \beta)(D_n) = (\alpha \times \beta)(D).$$

Damit ist der Satz bewiesen. □

Das folgende Beispiel zeigt, dass auf die Bedingung der  $\sigma$ -Endlichkeit der Maße im allgemeinen nicht verzichtet werden kann.

**Beispiel 7.2** Für  $D = \{(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] : x = y\} \subset \mathbb{R} \times [0, 1]$  gilt

$$\int_{\mathbb{R}} \text{card}(D_x) d\mathcal{L}^1(x) = 1 \neq 0 = \int_{[0,1]} \mathcal{L}^1(D_y) d\text{card}(y).$$

Mit  $I_k = [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$  gilt  $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} (\bigcup_{k=1}^n I_k \times I_k)$ , also ist  $D$  messbar bezüglich  $\mathcal{L}^1 \times \text{card}$ . Aus Satz 7.1 folgt  $(\mathcal{L}^1 \times \text{card})(D) = \infty$ .

Wir kommen nun zu Anwendungen des Cavalierischen Prinzips.

**Beispiel 7.3** Wir berechnen das Lebesguemaß  $\alpha_n = \mathcal{L}^n(B_1(0))$  der  $n$ -dimensionalen Kugel  $B_1(0) = \{z \in \mathbb{R}^n : |z| < 1\}$ . Aus Lemma 7.2 und Satz 7.1 folgt mit der Substitution  $y = \cos \vartheta$

$$\alpha_n = \int_{-1}^1 \mathcal{L}^{n-1}(\{x \in \mathbb{R}^{n-1} : |x| < \sqrt{1-y^2}\}) dy = \alpha_{n-1} \int_{-1}^1 (1-y^2)^{\frac{n-1}{2}} dy = \alpha_{n-1} \underbrace{\int_0^\pi \sin^n \vartheta d\vartheta}_{=: A_n}.$$

Durch partielle Integration ergibt sich die Rekursionsformel  $A_n = \frac{n-1}{n} A_{n-2}$  für  $n \geq 2$ , wobei  $A_0 = \pi$  und  $A_1 = 2$ . Es folgt

$$A_{2k} = \frac{2k-1}{2k} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot A_0 = \pi \prod_{j=1}^k \frac{2j-1}{2j} \quad \text{und} \quad A_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} \cdot A_1 = 2 \prod_{j=1}^k \frac{2j}{2j+1}.$$

Also gilt  $A_{2k+1}A_{2k} = \frac{2\pi}{2k+1}$  bzw.  $A_{2k}A_{2k-1} = \frac{\pi}{k}$ , und somit

$$\begin{aligned} \alpha_{2k} &= (A_{2k}A_{2k-1}) \cdot \dots \cdot (A_2A_1)\alpha_0 = \frac{\pi^k}{k!}, \\ \alpha_{2k+1} &= (A_{2k+1}A_{2k}) \cdot \dots \cdot (A_3A_2)\alpha_1 = \frac{\pi^k}{(k+\frac{1}{2})(k-\frac{1}{2}) \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

**Beispiel 7.4** Für  $A \subset \mathbb{R}^n$  sei  $K(A) = \{y(x, 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1} : 0 < y < 1, x \in A\}$ ; dies ist der Kegel mit Spitze 0 über der Basis  $A \times \{1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ . Wir behaupten: Ist  $A$  messbar bzgl.  $\mathcal{L}^n$ , so ist  $K(A)$  messbar bzgl.  $\mathcal{L}^{n+1}$  und es gilt

$$\mathcal{L}^{n+1}(K(A)) = \frac{1}{n+1} \mathcal{L}^n(A).$$

Dazu beachten wir zunächst  $K(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \times (0, 1)$  sowie

$$K\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} K(A_i) \quad \text{und} \quad K(\mathbb{R}^n \setminus A) = (\mathbb{R}^n \times (0, 1)) \setminus K(A).$$

Also ist das System  $\{A \subset \mathbb{R}^n : K(A) \text{ ist Borelmenge}\}$  eine  $\sigma$ -Algebra. Es ist leicht zu sehen, dass für  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen auch  $K(\Omega)$  offen in  $\mathbb{R}^{n+1}$  ist. Also ist für jede Borelmenge  $B \subset \mathbb{R}^n$  der Kegel  $K(B)$  eine Borelmenge, insbesondere  $\mathcal{L}^{n+1}$ -messbar, und aus Satz 7.1 folgt

$$\mathcal{L}^{n+1}(K(B)) = \int_0^1 \mathcal{L}^n(\{yx : x \in B\}) dy = \int_0^1 y^n \mathcal{L}^n(B) dy = \frac{1}{n+1} \mathcal{L}^n(B).$$

Ist nun  $A \subset \mathbb{R}^n$  lediglich  $\mathcal{L}^n$ -messbar, so gibt es nach Satz 4.2 Borelmengen  $B_{1,2} \subset \mathbb{R}^n$  mit  $B_1 \subset A \subset B_2$  und  $\mathcal{L}^n(B_2 \setminus B_1) = 0$ . Es folgt  $K(B_1) \subset K(A) \subset K(B_2)$  und  $\mathcal{L}^{n+1}(K(B_2) \setminus K(B_1)) = \mathcal{L}^{n+1}(K(B_2 \setminus B_1)) = 0$ . Also ist  $K(A)$   $\mathcal{L}^{n+1}$ -messbar und die Formel für das Volumen des Kegels gilt auch für  $A$ .

Der folgende Satz über Integrale auf Produkträumen besitzt zahlreiche Anwendungen.

**Satz 7.2 (Fubini)** Seien  $\alpha$  und  $\beta$   $\sigma$ -endliche äußere Maße auf  $X$  bzw.  $Y$  und  $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  sei  $\alpha \times \beta$ -messbar. Ist das Integral  $\int f d(\alpha \times \beta)$  definiert, so gilt:

- (1) für  $\beta$ -fast-alles  $y \in Y$  ist  $f(\cdot, y)$   $\alpha$ -messbar, und  $\int_X f(x, y) d\alpha(x)$  existiert,
- (2)  $y \mapsto \int_X f(x, y) d\alpha(x)$  ist  $\beta$ -messbar und  $\int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y)$  existiert,
- (3)  $\int_{X \times Y} f d(\alpha \times \beta) = \int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y)$ .

Der Satz gilt auch mit vertauschter Reihenfolge der Integrationen, also folgt

$$\int_{X \times Y} f d(\alpha \times \beta) = \int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) = \int_X \int_Y f(x, y) d\beta(y) d\alpha(x).$$

Zusatz: Für  $\alpha \times \beta$ -messbares  $f$  ist die Voraussetzung erfüllt, wenn  $f \geq 0$  oder wenn z.B.

$$\int_Y \int_X |f(x, y)| d\alpha(x) d\beta(y) < \infty.$$

BEWEIS: Für  $f = \chi_E$  mit  $\alpha \times \beta$ -messbarem  $E \subset X \times Y$  folgen (1)–(3) aus Satz 7.1:

- (1) für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$  ist  $f(\cdot, y) = \chi_{(E_y)}$   $\alpha$ -messbar, mit  $\int_X f(x, y) d\alpha(x) = \alpha(E_y)$ ,
- (2)  $y \mapsto \alpha(E_y)$  ist  $\beta$ -messbar mit Integral  $\int_Y \alpha(E_y) d\beta(y)$ ,
- (3)  $\int_{X \times Y} f d(\alpha \times \beta) = (\alpha \times \beta)(E) = \int_Y \alpha(E_y) d\beta(y) = \int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y)$ .

Wie man leicht sieht, folgen (1)–(3) auch für nichtnegative Treppenfunktionen. Nach Satz 5.3 gibt es zu  $\alpha \times \beta$ -messbarem  $f \geq 0$  eine Folge  $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$  von Treppenfunktionen mit  $f_k(x, y) \nearrow f(x, y)$  für alle  $(x, y) \in X \times Y$ . Dann gilt:

- (1)  $f(\cdot, y)$  ist monotoner Limes der  $f_k(\cdot, y)$ . Für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$  ist damit  $f(\cdot, y)$   $\alpha$ -messbar und  $\int_X f(\cdot, y) d\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X f_k(\cdot, y) d\alpha$  mit Satz 5.5.
- (2) Nach (1) ist  $y \mapsto \int_X f(\cdot, y) d\alpha$  monotoner Limes von  $y \mapsto \int_X f_k(\cdot, y) d\alpha$  für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$ . Damit ist  $y \mapsto \int_X f(\cdot, y) d\alpha$   $\beta$ -messbar, und  $\int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Y \int_X f_k(x, y) d\alpha(x) d\beta(y)$  wieder nach Satz 5.5.
- (3) Es folgt wieder mit Satz 5.5 und mit (2)

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\alpha \times \beta) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} f_k d(\alpha \times \beta) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Y \int_X f_k(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) \\ &= \int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y). \end{aligned}$$

Damit ist der Satz von Fubini für  $f \geq 0$  bewiesen. Sei schließlich nur das Integral von  $f$  definiert, also zum Beispiel  $\int f^- d(\alpha \times \beta) < \infty$ . Wie gezeigt gilt dann

$$\int_Y \int_X f^-(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) = \int_{X \times Y} f^- d(\alpha \times \beta) < \infty,$$

insbesondere folgt für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$

$$\int_X f^-(x, y) d\alpha(x) < \infty, \quad \text{und} \quad f^-(x, y) < \infty \text{ für } \alpha\text{-fast-alle } x \in X.$$

Wir schließen wieder in drei Schritten:

- (1) Für  $\beta$ -fast-alle  $y \in Y$  ist die Funktion  $f(\cdot, y) = f^+(\cdot, y) - f^-(\cdot, y)$  definiert und  $\alpha$ -messbar, mit Integral  $\int_X f(\cdot, y) d\alpha = \int_X f^+(\cdot, y) d\alpha - \int_X f^-(\cdot, y) d\alpha$ .



- (2) die Funktion  $y \mapsto \int_X f(\cdot, y) d\alpha$  ist Differenz zweier messbarer Funktionen, also messbar. Das Integral der Funktion existiert, denn es gilt

$$\int_X \left( \int_X f(x, y) d\alpha(x) \right)^- d\beta(y) \leq \int_Y \int_X f^-(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) < \infty.$$

- (3) Schließlich gilt mit der Linearität des Integrals, siehe Satz 5.6,

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\alpha \times \beta) &= \int_{X \times Y} f^+ d(\alpha \times \beta) - \int_{X \times Y} f^- d(\alpha \times \beta) \\ &= \int_Y \int_X f^+(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) - \int_Y \int_X f^-(x, y) d\alpha(x) d\beta(y) \\ &= \int_Y \int_X (f^+(x, y) - f^-(x, y)) d\alpha(x) d\beta(y) \\ &= \int_Y \int_X f(x, y) d\alpha(x) d\beta(y). \end{aligned}$$

Damit ist der Satz bewiesen. Der Zusatz ist klar im Fall  $f \geq 0$ , im andern Fall verwende

$$\int_{X \times Y} |f| d(\alpha \times \beta) = \int_Y \int_X |f(x, y)| d\alpha(x) d\beta(y) < \infty,$$

das Integral von  $f$  bezüglich  $\alpha \times \beta$  ist somit definiert.  $\square$

**Beispiel 7.5** Ein Beispiel, wo die iterierten Integrale existieren aber verschieden sind, ist

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = \pi.$$

Beachte dabei, dass der Integrand gegeben ist durch  $f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \arctan \frac{x}{y}$  für  $y \neq 0$ . In diesem Fall folgt aus dem Satz von Fubini, dass das Integral bezüglich des Produktmaßes nicht existiert. Es kommt aber auch vor, dass die iterierten Integrale gleich sind, und dennoch das Integral bezüglich des Produktmaßes nicht definiert ist:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = 0,$$

aber das  $\mathcal{L}^2$ -Integral über  $[-1, 1]^2$  existiert nicht wegen

$$\int_{[0,1]^2} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} d\mathcal{L}^2(x, y) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left( \frac{1}{y} - \frac{y}{1 + y^2} \right) dy = \infty.$$

**Beispiel 7.6** Sei  $\mu$  ein  $\sigma$ -endliches äußeres Maß auf  $X$  und  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  sei  $\mu$ -messbar. Ist die Funktion  $\varphi : [0, \infty] \rightarrow [0, \infty]$  stetig mit  $\varphi(0) = 0$ , sowie auf  $(0, \infty)$  stetig differenzierbar mit  $\varphi'(t) \geq 0$ , so gilt

$$\int_X \varphi(f(x)) d\mu(x) = \int_0^\infty \varphi'(t) \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) dt.$$

Betrachte dazu den Subgraph  $E = \{(x, t) \in X \times [0, \infty) : t < f(x)\}$ . Die Funktionen  $(x, t) \mapsto t$ ,  $(x, t) \mapsto f(x)$  und  $(x, t) \mapsto \varphi'(t)$  sind  $\mu \times \mathcal{L}^1$ -messbar. Folglich ist auch  $E$  messbar bezüglich

$\mu \times \mathcal{L}^1$  sowie die Funktion  $(x, t) \mapsto \varphi'(t)\chi_E(x, t)$ . Aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung und dem Satz von Fubini folgt

$$\begin{aligned}\int_X \varphi(f(x)) d\mu(x) &= \int_X \int_0^\infty \varphi'(t) \chi_E(x, t) dt d\mu(x) \\ &= \int_E \varphi'(t) d(\mu \times \mathcal{L}^1)(x, t) \\ &= \int_0^\infty \int_X \varphi'(t) \chi_E(x, t) d\mu(x) dt \\ &= \int_0^\infty \varphi'(t) \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) dt.\end{aligned}$$

Für  $\varphi(t) = t^p$  mit  $p > 0$  und  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$   $\mu$ -messbar folgt zum Beispiel

$$\int_X |f|^p d\mu = \int_0^\infty p t^{p-1} \mu(\{x : |f(x)| > t\}) dt.$$

Eine wichtige Anwendung des Satzes von Fubini ist die partielle Integration.

**Satz 7.3 (Partielle Integration)** Sind für  $f, g \in C^1(\mathbb{R}^n)$  die Funktionen  $(\partial_j f)g$ ,  $f(\partial_j g)$  und  $fg$  integrierbar, so folgt

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j f)g dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f(\partial_j g) dx.$$

BEWEIS: Es reicht aus, die folgende Behauptung zu beweisen:

$$(7.4) \quad \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j f dx = 0 \quad \text{für alle } f \in C^1(\mathbb{R}^n) \text{ mit } f, \partial_j f \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Denn aus der Voraussetzung folgt  $fg \in L^1(\mathbb{R}^n)$  sowie  $\partial_j(fg) = (\partial_j f)g + f(\partial_j g) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , also ergibt sich mit (7.4)

$$0 = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j(fg) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j f)g dx + \int_{\mathbb{R}^n} f(\partial_j g) dx,$$

und die Folgerung ist bewiesen. Wir zeigen (7.4) zunächst unter der Annahme, dass es ein  $R > 0$  gibt mit  $f(x) = 0$  für  $|x_j| \geq R$ . Der Satz von Fubini ergibt für  $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \partial_j f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \partial_j f(x', x_n) dx' dx_n = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}} \partial_j f(x', x_n) dx_n dx'.$$

Für  $j = n$  ist das rechte Integral Null nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, und für  $1 \leq j \leq n-1$  verschwindet das mittlere Integral nach Induktion. Ist  $f$  beliebig wie in (7.4), so wähle  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$  mit  $0 \leq \varphi \leq 1$  sowie

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \leq 1, \\ 0 & \text{für } t \geq 2, \end{cases}$$

und definiere  $\eta_R(x) = \varphi(\frac{x_j}{R})$ . Dann ist  $(\eta_R f)(x) = 0$  für  $|x_j| \geq 2R$ , und es folgt

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta_R(\partial_j f) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j \eta_R) f dx.$$

Es ist  $\eta_R(x) = 1$  für  $|x_j| \leq R$ , insbesondere  $\eta_R \rightarrow 1$  und  $\partial_j \eta_R \rightarrow 0$  punktweise auf  $\mathbb{R}^n$  mit  $R \rightarrow \infty$ . Außerdem haben wir mit  $C = \max |\varphi'|$  die Abschätzungen

$$|\eta_R(\partial_j f)| \leq |\partial_j f| \in L^1(\mathbb{R}^n) \quad \text{und} \quad |(\partial_j \eta_R)f| \leq \frac{C}{R} |f| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Behauptung (7.4) folgt mit  $R \rightarrow \infty$  aus dem Konvergenzsatz von Lebesgue.  $\square$

**Folgerung 7.1 (Partielle Integration)** *Sei Für  $f \in C_c^1(\Omega)$  und  $g \in C^1(\Omega)$  gilt*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j f) g \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f (\partial_j g) \, dx \quad \text{für } j = 1, \dots, n.$$

*Ist  $X \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$  so gilt außerdem*

$$\int_{\Omega} \langle \text{grad } f, X \rangle \, dx = - \int_{\Omega} f (\text{div } X) \, dx.$$

BEWEIS: Nach Voraussetzung ist  $fg \in C_c^1(\Omega)$ , also  $\int_{\Omega} \partial_j (fg) \, dx = 0$ . Die zweite Fassung folgt durch Ausschreiben in Koordinaten aus der ersten.  $\square$

Die Verallgemeinerung des Satzes von Fubini auf kartesische Produkte mit endlich vielen (statt nur zwei) Faktoren soll hier nicht ausgeführt werden. Man zeigt analog zu Lemma 7.2, dass in einem endlichen Produkt von Maßen beliebig Klammern gesetzt oder weggelassen werden können. Der Satz von Fubini wird durch Induktion über die Anzahl der Faktoren verallgemeinert, wobei die Reihenfolge der Integrationen bezüglich der einzelnen Variablen beliebig gewählt werden kann.



## 8 Der Transformationssatz


Neben dem Satz von Fubini ist die Transformation auf geeignete Koordinaten das zweite wichtige Hilfsmittel zur Berechnung von Maßen beziehungsweise Integralen im  $\mathbb{R}^n$ . Nach einigen Beispielen behandeln wir in einem Exkurs die Umrechnung der Differentialoperatoren Gradient, Divergenz und Laplace auf beliebige krummlinige Koordinaten. Diese Formeln kommen bei diversen Problemen in Geometrie und Physik zur Anwendung.

Zu Anfang des Kapitels erinnern wir an folgenden Begriff:

**Definition 8.1 (Diffeomorphismus)** Eine Abbildung  $\phi : U \rightarrow V$  zwischen offenen Mengen  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  heißt  $C^1$ -Diffeomorphismus, wenn  $\phi$  bijektiv ist und  $\phi, \phi^{-1}$  stetig differenzierbar sind.

**Beispiel 8.1 (Polarkoordinaten im  $\mathbb{R}^2$ )** Betrachte die glatte Abbildung

$$\phi : (0, \infty) \times (0, 2\pi) = U \rightarrow V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}, \quad \phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi).$$



Die Umkehrabbildung von  $\phi$  lautet mit  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\phi^{-1}(x, y) = \begin{cases} (r, \arccos \frac{x}{r}) & \text{falls } y \geq 0, \\ (r, 2\pi - \arccos \frac{x}{r}) & \text{falls } y < 0. \end{cases}$$

Für  $x < 0$  gilt alternativ  $\phi^{-1}(x, y) = (r, \frac{\pi}{2} + \arccos \frac{y}{r})$ , insbesondere ist  $\phi^{-1}$  glatt auf ganz  $V$  und somit  $\phi$  diffeomorph.

Unser Beweis des Transformationssatzes stützt sich auf folgende infinitesimale Fassung. Dabei verwenden wir für  $x \in \mathbb{R}^n$  und  $\varrho > 0$  die Bezeichnung

$$Q(x, \varrho) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq \varrho\} \quad \text{mit } \|x\| = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|,$$

das heißt  $Q(x, \varrho)$  ist der achsenparallele Würfel mit Mittelpunkt  $x$  und Kantenlänge  $2\varrho$ .

**Lemma 8.1** Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen,  $x_0 \in U$  und  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  mit  $D\phi(x_0) \in \text{Gl}_n(\mathbb{R})$ . Gegeben sei eine Folge  $Q_j = Q(x_j, \varrho_j) \subset U$  mit  $\varrho_j \rightarrow 0$  und  $x_0 \in Q_j$  für alle  $j$ . Dann gilt

$$\limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{L}^n(\phi(Q_j))}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \leq |\det D\phi(x_0)|.$$

BEWEIS: Wir können nach geeigneten Translationen  $x_0 = 0$  und  $\phi(0) = 0$  annehmen, außerdem sei zunächst  $D\phi(0) = \text{Id}$ . Nach Definition der Differenzierbarkeit gilt dann

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\|\phi(x) - (\phi(0) + D\phi(0)x)\|}{\|x\|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\|\phi(x) - x\|}{\|x\|}.$$

Hier können wir die Maximumsnorm verwenden wegen  $\|x\| \leq |x| \leq \sqrt{n} \|x\|$ . Sei nun  $\varepsilon > 0$ . Für  $x \in Q_j$  gilt  $\|x\| \leq \|x - x_j\| + \|x_j - 0\| \leq 2\varrho_j$ , also folgt für  $j$  hinreichend groß

$$\|\phi(x) - x\| \leq \varepsilon \|x\| \leq 2\varepsilon \varrho_j \quad \text{für alle } x \in Q_j.$$

Dies impliziert die Abschätzung

$$\|\phi(x) - \phi(x_j)\| \leq \|\phi(x) - x\| + \|x - x_j\| + \|x_j - \phi(x_j)\| \leq (1 + 4\varepsilon)\varrho_j,$$

und damit weiter

$$\frac{\mathcal{L}^n(\phi(Q_j))}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \leq (1 + 4\varepsilon)^n.$$

Mit  $j \rightarrow \infty$  und  $\varepsilon \searrow 0$  ergibt sich die Behauptung des Lemmas im Fall  $D\phi(0) = \text{Id}$ . Allgemein sei  $S = D\phi(0)$  und  $\phi_0 = S^{-1} \circ \phi$ , also  $D\phi_0(0) = \text{Id}$ . Aus Satz 4.7 folgt

$$\begin{aligned} \limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{L}^n(\phi(Q_j))}{\mathcal{L}^n(Q_j)} &= \limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{L}^n(S(\phi_0(Q_j)))}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \\ &= |\det S| \limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{L}^n(\phi_0(Q_j))}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \\ &\leq |\det S| = |\det D\phi(0)|. \end{aligned}$$

□

Es ist praktisch, in der Transformationsformel statt  $d\mathcal{L}^n$  die klassischen Bezeichnungen  $dx$  bzw.  $dy$  zu verwenden, um zwischen Bild und Urbild zu unterscheiden.

**Satz 8.1 (Transformationsformel)** Seien  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $\phi : U \rightarrow V$  ein  $C^1$ -Diffeomorphismus. Ist  $A \subset U$   $\mathcal{L}^n$ -messbar, so ist auch  $\phi(A)$   $\mathcal{L}^n$ -messbar und es gilt

$$(8.1) \quad \mathcal{L}^n(\phi(A)) = \int_A |\det D\phi(x)| dx.$$

Weiter gilt für jede  $\mathcal{L}^n$ -messbare Funktion  $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$

$$(8.2) \quad \int_V f(y) dy = \int_U f(\phi(x)) |\det D\phi(x)| dx,$$

falls eines der Integrale definiert ist.

BEWEIS: Wir betrachten auf der  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{A}$  der  $\mathcal{L}^n$ -messbaren Mengen  $A \subset U$  die Maße

$$\lambda(A) = \int_A |\det D\phi| d\mathcal{L}^n \quad \text{sowie} \quad \mu(A) = \mathcal{L}^n(\phi(A)).$$

Nach Definition des Bildmaßes gilt  $\mu(A) = \psi(\mathcal{L}^n)(A)$  mit  $\psi = \phi^{-1}$ . Für  $\mathcal{L}^n$ -messbares  $A \subset U$  ist  $\psi^{-1}(A) = \phi(A)$   $\mathcal{L}^n$ -messbar nach Satz 4.5, und damit ist  $A$  auch  $\mu$ -messbar nach Satz 2.1. Die Einschränkung des äußeren Maßes  $\mu$  auf  $\mathcal{A}$  ist somit ein Maß. Weiter ist  $\lambda$  das Lebesguemaß mit Dichtefunktion  $|\det D\phi|$ , und die Maßeigenschaft von  $\lambda$  auf  $\mathcal{A}$  folgt aus Satz 6.1. Weiter wurde in den Sätzen 6.1 und 4.5 bewiesen:

$$(8.3) \quad N \subset U \text{ mit } \mathcal{L}^n(N) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(N) = \mu(N) = 0.$$

Wir zeigen nun  $\lambda \geq \mu$ . Indem wir  $U$  durch offene, relativ kompakte Mengen ausschöpfen, können wir dabei  $\lambda(U) < \infty$  und  $\mu(U) < \infty$  voraussetzen. Nach Satz 4.2 ist jede  $\mathcal{L}^n$ -messbare Menge von der Form  $A = E \setminus N$ , wobei  $\mathcal{L}^n(N) = 0$  und  $E = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$  mit offenen  $U_1 \supset U_2 \supset \dots$ . Wegen Satz 2.4(ii) (hier brauchen wir  $\lambda(U), \mu(U) < \infty$ ) reicht es daher aus, die Ungleichung auf allen offenen Mengen nachzuweisen. Aber nach Lemma 1.2 ist jede offene Menge als abzählbare Vereinigung von kompakten, achsenparallelen Würfeln in  $U$  mit paarweise disjunktem Inneren darstellbar. Damit bleibt zu zeigen:

$$(8.4) \quad \lambda(Q_0) \geq \mu(Q_0) \text{ für alle } Q_0 = Q(p_0, \varrho_0) \subset U.$$

Angenommen es ist  $\lambda(Q_0) < \mu(Q_0)$  für ein  $Q_0 = Q(p_0, \varrho_0)$ . Wähle dann ein  $\theta \in [0, 1)$  mit  $\lambda(Q_0) < \theta\mu(Q_0)$ , und zerlege  $Q_0$  durch Halbierung der Kanten in  $2^n$  kompakte Teilwürfel  $Q_{0,1}, \dots, Q_{0,2^n}$ . Wäre  $\lambda(Q_{0,i}) \geq \theta\mu(Q_{0,i})$  für alle  $i$ , so folgt durch Summation

$$\lambda(Q_0) = \sum_{i=1}^{2^n} \lambda(Q_{0,i}) \geq \theta \sum_{i=1}^{2^n} \mu(Q_{0,i}) = \theta\mu(Q_0),$$

ein Widerspruch. Hierbei wurde benutzt, dass die Ränder der  $Q_{0,i}$  nach (8.3) jeweils Nullmengen sind. Unter den  $Q_{0,i}$  gibt es also einen Würfel  $Q_1$  mit  $\lambda(Q_1) < \theta\mu(Q_1)$ . Bestimme so induktiv eine Schachtelung  $Q_0 \supset Q_1 \supset \dots$  mit

$$(8.5) \quad \lambda(Q_j) < \theta\mu(Q_j) \quad \text{für alle } j \in \mathbb{N}.$$

Es gilt  $\bigcap_{j=1}^{\infty} Q_j = \{x_0\}$  mit  $x_0 \in U$ . Da  $\det D\phi$  stetig, folgt mit  $j \rightarrow \infty$

$$\left| \frac{\lambda(Q_j)}{\mathcal{L}^n(Q_j)} - |\det D\phi(x_0)| \right| = \frac{1}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \left| \int_{Q_j} (|\det D\phi(x)| - |\det D\phi(x_0)|) dx \right| \rightarrow 0.$$

Zusammen mit Lemma 8.1 folgt aber nun

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \frac{\lambda(Q_j)}{\mu(Q_j)} = \liminf_{j \rightarrow \infty} \left( \frac{\lambda(Q_j)}{\mathcal{L}^n(Q_j)} \cdot \frac{\mathcal{L}^n(Q_j)}{\mu(Q_j)} \right) \geq 1,$$

ein Widerspruch zu (8.5). Dies zeigt (8.4) und damit die Ungleichung  $\lambda \geq \mu$ . Als nächstes betrachte  $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Es gilt  $\{f \circ \phi < s\} = \phi^{-1}(\{f < s\})$ , nach Satz 4.5 ist mit  $f$  auch  $f \circ \phi$  messbar bezüglich  $\mathcal{L}^n$  und umgekehrt. Es folgt weiter für  $\mathcal{L}^n$ -messbares  $f : V \rightarrow [0, \infty]$

$$(8.6) \quad \int_U f(\phi(x)) |\det D\phi(x)| dx \geq \int_V f(y) dy.$$

Und zwar ergibt sich (8.6) erst für  $f = \chi_B$ , indem wir  $A = \phi^{-1}(B)$  in der Ungleichung  $\lambda(A) \geq \mu(A)$  wählen, dann für nichtnegative  $\mathcal{L}^n$ -Treppenfunktionen und schließlich für beliebige, messbare  $f$  durch Approximation von unten nach Satz 5.3. Um schließlich für  $f \geq 0$  die Gleichheit in (8.2) zu zeigen, wenden wir (8.6) auf  $\psi : V \rightarrow U$  statt  $\phi$  und auf  $g = f \circ \phi | \det D\phi|$  an. Dies liefert wegen  $1 = \det D(\phi \circ \psi)(y) = (\det D\phi)(\psi(y)) \det D\psi(y)$

$$\int_V f(y) dy = \int_V g(\psi(y)) |\det D\psi(y)| dy \geq \int_U g(x) dx = \int_U f(\phi(x)) |\det D\phi(x)| dx.$$

Damit ist (8.2) für  $f \geq 0$  bewiesen, Gleichung (8.1) folgt daraus mit  $f = \chi_{\phi(A)}$ . Für beliebige  $f$  zerlegen wir schließlich  $f = f^+ - f^-$ .  $\square$

**Beispiel 8.2 (Gauß-Integral)** Für  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$  folgt mit Fubini

$$\int_{\mathbb{R}^2} f d\mathcal{L}^2 = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right) dx = \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Für Polarkoordinaten  $\phi : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$  gilt  $\det D\phi(r, \theta) = r$ . Da  $\{(x, 0) : x \geq 0\}$  eine  $\mathcal{L}^2$ -Nullmenge ist, folgt aus dem Transformationssatz, und anschließend dem Satz von Fubini,

$$\int_{\mathbb{R}^2} f d\mathcal{L}^2 = \int_{(0, \infty) \times (0, 2\pi)} e^{-r^2} r d\mathcal{L}^2(r, \theta) = \int_0^\infty e^{-r^2} r \left( \int_0^{2\pi} d\theta \right) dr = \pi.$$

Also gilt  $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ .

**Beispiel 8.3 (Lineare Transformationsformel)** Betrachte den Spezialfall von Satz 8.1, dass der Diffeomorphismus  $\phi : U \rightarrow V$  Einschränkung einer linearen Abbildung ist, das heißt  $\phi(x) = Sx$  mit  $S \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ . Dann gilt  $D\phi(x) = S$  für alle  $x \in U$ , und die Formeln aus dem Transformationssatz lauten, vgl. auch Satz 4.7,

$$\mathcal{L}^n(S(D)) = |\det S| \mathcal{L}^n(D) \quad \text{bzw.} \quad \int_V f(y) d\mathcal{L}^n(y) = |\det S| \int_U f(Sx) d\mathcal{L}^n(x).$$


**Beispiel 8.4 (Polarkoordinaten im  $\mathbb{R}^3$ )** Betrachte im  $\mathbb{R}^3$  Polarkoordinaten

$$\phi(r, \theta, \varphi) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta).$$

Die Abbildung  $\phi$  ist ein  $C^\infty$ -Diffeomorphismus der offenen Mengen  $U = (0, \infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi)$  und  $V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, 0, z) : x \geq 0\}$ . Die Inverse lautet explizit

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \theta = \arccos \frac{z}{r}, \varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{für } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{für } y \leq 0. \end{cases}$$





Die Jacobimatrix von  $\phi$  ist

$$D\phi(r, \theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen, zum Beispiel durch Entwicklung nach der dritten Zeile,

$$\det D\phi = r^2 \sin \theta.$$

Mit der Transformationsformel und Fubini gilt für  $E = [r_1, r_2] \times [\theta_1, \theta_2] \times [\varphi_1, \varphi_2]$

$$\mathcal{L}^3(\phi(E)) = \int_{r_1}^{r_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \sin \theta \, d\varphi \, d\theta \, dr = \frac{r_2^3 - r_1^3}{3} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) (\varphi_2 - \varphi_1).$$

Das nächste Ziel ist die Umrechnung der Operatoren Gradient, Divergenz und Laplace in krummlinige Koordinaten. Dazu führen wir folgenden Begriff ein: für einen  $C^k$ -Diffeomorphismus  $\phi : U \rightarrow V$  zwischen offenen Mengen  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  ist die Gramsche Matrix  $g \in C^{k-1}(U, \mathbb{R}^{n \times n})$ ,  $g = (g_{ij})$ , definiert durch

$$(8.7) \quad g(x) = D\phi(x)^T D\phi(x) \quad \text{bzw.} \quad g_{ij}(x) = \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x), \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \right\rangle.$$

Die Matrix  $g(x)$  ist eventuell einfacher als die Jacobimatrix, zum Beispiel ist sie im Fall der Polarkoordinaten im  $\mathbb{R}^3$  eine Diagonalmatrix:

$$(g_{ij}(r, \theta, \varphi))_{1 \leq i, j \leq 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Dies bedeutet geometrisch, dass sich die Koordinatenlinien senkrecht schneiden. Allgemein ist  $g(x)$  symmetrisch und strikt positiv definit, denn wegen  $D\phi(x) \in \text{Gl}_n(\mathbb{R})$  gilt

$$\langle g(x)v, v \rangle = \langle D\phi(x)^T D\phi(x)v, v \rangle = |D\phi(x)v|^2 > 0 \quad \text{für } v \neq 0.$$

Insbesondere ist die Matrix  $g(x)$  invertierbar. Wir setzen

$$(8.8) \quad g^{ij}(x) = (g(x)^{-1})_{ij}, \quad \text{also} \quad \sum_{j=1}^n g^{ij} g_{jk} = \delta_{ik}.$$

Wegen  $\det g = \det (D\phi^T D\phi) = |\det D\phi|^2$  lautet die Transformationsformel alternativ

$$(8.9) \quad \int_V f(y) dy = \int_U f(\phi(x)) \sqrt{\det g(x)} dx.$$

Wir überlegen nun, wie sich Funktionen und Vektorfelder unter einem Diffeomorphismus  $\phi : U \rightarrow V$  transformieren. Für Funktionen  $v : V \rightarrow \mathbb{R}$  ist die transformierte Funktion

$$(8.10) \quad u = v \circ \phi : U \rightarrow \mathbb{R},$$

zum Beispiel gilt für Polarkoordinaten  $u(r, \theta, \varphi) = v(r \sin \theta \sin \varphi, r \sin \theta \cos \varphi, r \cos \theta)$ . In der Physik ist es üblich, die neue Funktion mit demselben Buchstaben zu bezeichnen, da sie dieselbe physikalische Größe repräsentiert. Zum Beispiel kann eine Temperaturverteilung  $T$  entweder als Funktion  $T = T(x, y, z)$  der Euklidischen Koordinaten oder als Funktion  $T = T(r, \theta, \varphi)$  der Polarkoordinaten aufgefasst werden. Für Mathematiker ist das etwas verwirrend, wir behalten die Unterscheidung lieber bei. Vektorfelder  $Y : V \rightarrow \mathbb{R}^n$  haben eine andere Transformationsregel als Funktionen. Eine Kurve  $x(t) \in U$  hat die Bildkurve  $y(t) = \phi(x(t))$ , also entspricht dem Geschwindigkeitsvektor  $x'(t)$  der Vektor  $y'(t) = D\phi(x(t))x'(t)$ . Allgemein lautet die Regel, wenn  $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  das transformierte Vektorfeld bezeichnet,

$$(8.11) \quad Y \circ \phi = D\phi \cdot X : U \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Ein Beispiel: sei  $\phi(x) = y_0 + \frac{1}{\lambda}Tx$  die Abbildung einer Landkarte in die dargestellte, reale Landschaft. Dabei ist  $\lambda > 0$  der Maßstab und  $T \in \mathbb{SO}(2)$  adjustiert die Himmelsrichtung. Einem Geschwindigkeitsvektor  $X$  am Punkt  $x$  auf der Karte entspricht real an der Stelle  $\phi(x)$  der Vektor  $Y = \frac{1}{\lambda}TX = D\phi(x)X$ . Allgemein ist das Vektorfeld  $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  mit (8.11) eindeutig bestimmt, und es gilt die Formel

$$(8.12) \quad X = \sum_{i,j=1}^n g^{ij} \left\langle Y \circ \phi, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle e_j.$$

Denn mit (8.12) berechnen wir wegen  $\sum_{j=1}^n g^{ij} g_{jk} = \delta_{ik}$

$$\begin{aligned} \left\langle D\phi \cdot X, \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \right\rangle &= \sum_{i,j=1}^n g^{ij} \left\langle Y \circ \phi, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial x_j}, \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \left\langle Y \circ \phi, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \sum_{j=1}^n g^{ij} g_{jk} \\ &= \left\langle Y \circ \phi, \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \right\rangle. \end{aligned}$$

Da die Vektoren  $\frac{\partial \phi}{\partial x_k}$  eine Basis bilden, folgt  $Y \circ \phi = D\phi \cdot X$  wie gewünscht. Natürlich ist auch die Formel  $X = (D\phi)^{-1}(Y \circ \phi)$  richtig, aber (8.12) ist oft einfacher zu berechnen.

**Satz 8.2 (Umrechnung von Differentialoperatoren)** Sei  $\phi \in C^1(U, V)$  ein Diffeomorphismus zwischen den offenen Mengen  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  mit Gramscher Matrix  $(g_{ij})$ .

(1) Für  $v \in C^1(V)$  gilt mit  $u = v \circ \phi$

$$(\text{grad } v) \circ \phi = D\phi \cdot \text{grad}_g u, \quad \text{wobei } \text{grad}_g u := \sum_{i,j=1}^n g^{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} e_j.$$

(2) Für  $Y \in C^1(V, \mathbb{R}^n)$  gilt mit  $Y \circ \phi = D\phi \cdot X$

$$(\operatorname{div} Y) \circ \phi = \operatorname{div}_g X := \frac{1}{\sqrt{\det g}} \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (\sqrt{\det g} X_j).$$

(3) Ist  $\phi \in C^2(U, V)$  und  $v \in C^2(V)$ , so folgt wieder mit  $u = v \circ \phi$

$$(\Delta v) \circ \phi = \operatorname{div}_g \operatorname{grad}_g u = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \sqrt{\det g} g^{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

BEWEIS: Nach der Definition des Gradienten und der Kettenregel gilt

$$\left\langle (\operatorname{grad} v) \circ \phi, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle = (Dv) \circ \phi \cdot D\phi \cdot e_i = D(v \circ \phi) \cdot e_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}.$$

Also folgt (1) aus Gleichung (8.12), und allgemein gilt für ein Vektorfeld  $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(8.13) \quad \langle D\phi \cdot \operatorname{grad}_g u, D\phi \cdot X \rangle = \sum_{j=1}^n \left\langle D\phi \cdot \operatorname{grad}_g u, \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\rangle X_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} X_j.$$

Aussage (2) führen wir durch partielle Integration auf die Umrechnungsformel für den Gradienten zurück. Sei  $\psi \in C^1(V)$  beliebig und  $\varphi = \psi \circ \phi$ . Dann folgt mit partieller Integration, dem Transformationssatz, Behauptung (1), (8.13) und der Definition von  $\operatorname{div}_g X$

$$\begin{aligned} \int_V \psi \operatorname{div} Y \, dy &= - \int_V \langle \operatorname{grad} \psi, Y \rangle \, dy \\ &= - \int_U \langle (\operatorname{grad} \psi) \circ \phi, Y \circ \phi \rangle \sqrt{\det g} \, dx \\ &= - \int_U \langle D\phi \cdot \operatorname{grad}_g \varphi, D\phi \cdot X \rangle \sqrt{\det g} \, dx \\ &= - \int_U \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} X_j \sqrt{\det g} \, dx \\ &= \int_U \varphi \operatorname{div}_g X \sqrt{\det g} \, dx \\ &= \int_V \psi (\operatorname{div}_g X) \circ \phi^{-1} \, dy. \end{aligned}$$

Da  $\psi$  beliebig ist, folgt aus Lemma 8.2 dass  $\operatorname{div} Y = (\operatorname{div}_g X) \circ \phi^{-1}$ , und damit Aussage (2). Schließlich ergibt sich (3) durch Kombination von (1) und (2), und zwar gilt

$$(\Delta v) \circ \phi = (\operatorname{div} \operatorname{grad} v) \circ \phi \quad \text{mit} \quad (\operatorname{grad} v) \circ \phi = D\phi \cdot \operatorname{grad}_g u \text{ nach (1),}$$

also folgt weiter wegen (2) und  $g^{ji} = g^{ij}$

$$(\Delta v) \circ \phi = \operatorname{div}_g \operatorname{grad}_g u = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \sqrt{\det g} g^{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

□

Wir tragen noch das oben benutzte Lemma nach.

**Lemma 8.2** Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $u \in C^0(U)$  mit  $\int_U u \varphi dx = 0$  für alle  $\varphi \in C_c^\infty(U)$ . Dann ist  $u$  die Nullfunktion.

BEWEIS: Angenommen es gibt ein  $x \in U$  mit  $u(x) > 0$ . Dann gibt es  $\varrho > 0$  und  $\delta > 0$  mit  $u(x) \geq \delta$  auf  $B_\varrho(x) \subset U$ . Wähle eine Funktion  $\eta \in C_c^\infty(U)$  mit  $\text{spt } \eta \subset B_\varrho(x)$ ,  $\eta \geq 0$  und  $\int_U \eta(x) dx > 0$ . Aus der Monotonie des Integrals ergibt sich der Widerspruch

$$0 = \int_U u(x) \eta(x) dx \geq \int_U \delta \eta(x) dx > 0.$$

□

**Beispiel 8.5 (Polarkoordinatendarstellung des Laplaceoperators)** Für Polarkoordinaten im  $\mathbb{R}^3$ , siehe Beispiel 8.4, ergeben sich folgende Formeln:

$$\begin{aligned} \text{grad}_g u &= \frac{\partial u}{\partial r} e^r + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} e^\theta + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi} e^\varphi, \\ \text{div}_g X &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 X^r) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} ((\sin \theta) X^\theta) + \frac{\partial X^\varphi}{\partial \varphi}, \\ \Delta_g u &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( (\sin \theta) \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}. \end{aligned}$$

Hier bezeichnet  $e^r, e^\theta, e^\varphi$  die Standardbasis im  $(r, \theta, \varphi)$ -Raum, und  $X^r, X^\theta, X^\varphi$  sind die zugehörigen Koordinaten von  $X$ . Für die Funktion  $v(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  ist  $u(r) = 1/r$  und somit  $\Delta v = 0$  auf  $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ .

Die Gramsche Matrix  $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  eines Diffeomorphismus  $\phi \in C^1(U, V)$  definiert in jedem Punkt  $x \in U$  ein Skalarprodukt und eine zugehörige Euklidische Norm, und zwar gilt

$$g(x)(v, w) = \langle D\phi(x)v, D\phi(x)w \rangle \quad \text{und} \quad \|v\|_{g(x)} = \sqrt{g(x)(v, v)} = |D\phi(x)v|.$$

Ein solches ortsabhängiges Skalarprodukt nennt man eine Riemannsche Metrik, genauer spricht man hier von der durch  $\phi$  induzierten Metrik. Mit  $g$  kann nicht nur das Maß des Bildes berechnet werden, sondern auch die Bogenlänge von Kurven  $\phi \circ \gamma : [a, b] \rightarrow V$ :

$$L(\phi \circ \gamma) = \int_a^b \left| \frac{d}{dt} \phi(\gamma(t)) \right| dt = \int_a^b |D\phi(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{g(\gamma(t))(\gamma'(t), \gamma'(t))} dt.$$

In seinem Habilitationsvortrag *Über die Hypothesen, die der Geometrie zugrundeliegen* hat Bernhard Riemann 1854 die Idee einer Geometrie für solche ortsabhängigen Skalarprodukte entworfen, die später Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie wurde.

## 9 Das Flächenmaß auf Untermannigfaltigkeiten

Hauptziel dieses Abschnitts ist die Definition des Flächenmaßes für  $n$ -dimensionale  $C^1$ -Untermannigfaltigkeiten des  $\mathbb{R}^{n+k}$ . Dazu wird zunächst der Flächeninhalt für Immersionen ad hoc definiert und an einigen Beispielen motiviert. Diese Definition wird dann mittels lokaler Parameterdarstellungen auf Untermannigfaltigkeiten übertragen. Als Anwendung wird die Aufspaltung von Gebietsintegralen bezüglich Radial- und Winkelkoordinaten, die sogenannte Zwiebelformel, behandelt.

Zur Definition des Flächeninhalts muss zunächst geklärt werden, was unter einer Fläche zu verstehen ist. Am einfachsten ist der Begriff der parametrisierten Fläche oder Immersion. Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen. Eine Abbildung  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^{n+k})$  heißt Immersion, wenn gilt:

$$\text{rang } Df(x) = n \quad \text{bzw. äquivalent} \quad \ker Df(x) = \{0\} \quad \text{für alle } x \in U.$$

Die Vektoren  $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)$  bilden dann eine Basis von  $\text{Bild } Df(x) \subset \mathbb{R}^{n+k}$ . Die Zahl  $n$  heißt Dimension, die Zahl  $k$  Kodimension von  $f$ . Wir definieren analog zu (8.7) im vorigen Kapitel die Gramsche Matrix oder induzierte Metrik

$$g(x) = Df(x)^T Df(x) \quad \text{bzw.} \quad g_{ij}(x) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right\rangle.$$

Offenbar ist  $(g_{ij})$  für eine beliebige Abbildung  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^{n+k})$  definiert und positiv semi-definit. Die Matrix ist genau dann strikt positiv definit und damit invertierbar, wenn  $f$  eine Immersion ist, denn es gilt  $\langle g(x)v, v \rangle = |Df(x)v|^2$ , also  $\ker g(x) = \ker Df(x)$ .

**Definition 9.1 (Flächenformel)** Sei  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^{n+k})$  eine  $n$ -dimensionale Immersion mit Gramscher Matrix  $g$ , und  $E \subset U$  sei  $\mathcal{L}^n$ -messbar. Der ( $n$ -dimensionale) Flächeninhalt von  $f$  auf  $E$  ist definiert durch

$$A(f, E) = \int_E Jf(x) dx \quad \text{mit } Jf = \sqrt{\det g}.$$

Die Funktion  $Jf$  heißt Flächenintegrand oder Jacobische von  $f$ .

Wir wollen einige Spezialfälle betrachten.

**Beispiel 9.1** Sei  $f = S \circ \phi : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ , wobei  $\phi \in C^1(U, V)$  Diffeomorphismus der offenen Mengen zwischen  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  und  $S : \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^{n+k}$  lineare Isometrie. Wir berechnen für  $E \subset U$  messbar mit  $Df(x) = SD\phi(x)$  und der Transformationsformel, Satz 8.1,

$$A(f, E) = \int_E \sqrt{\det D\phi(x)^T S^T S D\phi(x)} dx = \int_E |\det D\phi(x)| dx = \mathcal{L}^n(\phi(E)).$$

Das ist jedenfalls das gewünschte Ergebnis.

**Beispiel 9.2** Eine eindimensionale Immersion  $f : I = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $f = f(t)$ , heißt auch reguläre Kurve. Die Gramsche Matrix ist dann nur  $g_{11} = \langle f'(t), f'(t) \rangle = |f'(t)|^2$ , und nach Definition 9.1 ist die Länge der Kurve

$$L(f) = \int_a^b |f'(t)| dt.$$

Allgemein zählt die Flächenformel das Maß des Bildes mit Vielfachheit, wenn es mehrfach überdeckt wird, zum Beispiel gilt  $L(f, [0, 3\pi]) = 3\pi$  für die Kurve  $f(t) = (\cos t, \sin t)$ .

**Beispiel 9.3** Eine zweidimensionale Immersion  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f = f(x, y)$ , heißt auch reguläre Fläche. Die GRamsche Matrix lautet

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 & \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle \\ \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle & \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \end{pmatrix}.$$

Also lautet die Jacobische

$$Jf = \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 - \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle^2} = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial f}{\partial y} \right|.$$

Hier wurde für  $a, b \in \mathbb{R}^3$  die Formel  $|a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2 = |a \times b|^2$  benutzt. Betrachte als Beispiel Polarkoordinaten auf der Sphäre, also

$$f : U = (0, \pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3, f(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

Mit Beispiel 8.4 im vorigen Kapitel gilt  $Jf(\theta, \varphi) = \sin \theta$ , insbesondere ist  $f$  eine reguläre Fläche mit Flächeninhalt

$$A(f) = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\varphi d\theta = 4\pi.$$

**Beispiel 9.4** Für  $u \in C^1(U)$  ist die Graphenabbildung  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ ,  $f(x) = (x, u(x))$ , eine Immersion. Denn ist  $P : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$  die Projektion auf die ersten  $n$  Koordinaten, so gilt

$$PDf(x)v = \frac{d}{dt}P(f(x+tv))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(x+tv)|_{t=0} = v,$$

das heißt  $Df(x)$  ist injektiv. Wir berechnen

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j} \right\rangle = \left\langle \left( e_i, \frac{\partial u}{\partial x_i} \right), \left( e_j, \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right\rangle = \delta_{ij} + \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j},$$

oder  $(Df)^T Df = \text{Id}_{\mathbb{R}^n} + (Du)^T Du$ . Zu  $x \in U$  gibt es nun eine Orthonormalbasis  $v_1, \dots, v_n$  des  $\mathbb{R}^n$  mit  $Du(x)v_1 = |Du(x)|$  und  $Du(x)v_j = 0$  für  $j \geq 2$ . Das ist trivial im Fall  $Du(x) = 0$ , für  $Du(x) \neq 0$  wähle  $v_1 = Du(x)/|Du(x)|$  und ergänze zu einer Orthonormalbasis. Es folgt

$$\langle Du(x)^T Du(x)v_i, v_j \rangle = (Du(x)v_i) (Du(x)v_j) = \begin{cases} |Du(x)|^2 & \text{für } i = j = 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Also ergibt sich die klassische Formel

$$(9.1) \quad A(f) = \int_U \sqrt{1 + |Du(x)|^2} \, dx \quad \text{für } f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, f(x) = (x, u(x)).$$

Als geometrische Größe sollte der Flächeninhalt nicht von der Wahl der Parametrisierung abhängen. Dies wollen wir sofort überprüfen.

**Satz 9.1 (Invarianz des Flächeninhalts)** Sei  $\phi \in C^1(U, V)$  ein Diffeomorphismus und  $f \in C^1(V, \mathbb{R}^{n+k})$  eine Immersion. Dann gilt

$$A(f, \phi(E)) = A(f \circ \phi, E) \quad \text{für jede } \mathcal{L}^n\text{-messbare Menge } E \subset U.$$

BEWEIS: Es gilt nach Kettenregel

$$D(f \circ \phi)(x)^T D(f \circ \phi)(x) = D\phi(x)^T Df(\phi(x))^T Df(\phi(x)) D\phi(x).$$

Nehmen wir die Determinante und dann die Wurzel, so folgt leicht

$$(9.2) \quad J(f \circ \phi)(x) = Jf(\phi(x)) |\det D\phi(x)|.$$

Die Behauptung folgt damit aus dem Transformationssatz, Satz 8.1.  $\square$

Wir wollen nun einen globaleren Standpunkt einnehmen und Flächen betrachten, die nicht bzw. nicht a priori durch eine einzige Parametrisierung gegeben sind. Unser Ziel ist es, auf diesen Flächen – genauer: Untermannigfaltigkeiten – ein  $n$ -dimensionales Flächenmaß zu definieren. Wir erinnern vorher an die relevanten Begriffe aus Analysis II, siehe Kapitel 24.

**Definition 9.2 (Untermannigfaltigkeit)** Eine Menge  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$ ,  $n, k \in \mathbb{N}$ , heißt  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse  $C^1$ , falls gilt: zu jedem  $p \in M$  gibt es eine offene Umgebung  $W \subset \mathbb{R}^{n+k}$  und einen  $C^1$ -Diffeomorphismus  $\phi : W \rightarrow \phi(W) \subset \mathbb{R}^{n+k}$  mit

$$\phi(M \cap W) = (\mathbb{R}^n \times \{0\}) \cap \phi(W).$$

Wir nennen  $\phi$  eine lokale Plättung von  $M$ . Folgende alternative Charakterisierungen sind aus Analysis II bekannt.

**Satz 9.2 (Untermannigfaltigkeitskriterien)** Seien  $n, k \in \mathbb{N}$ . Für  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  sind folgende Aussagen äquivalent:

- (1)  $M$  ist eine  $n$ -dimensionale  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit.
- (2) Niveaumengenkriterium: Zu jedem  $p \in M$  gibt es eine offene Umgebung  $W \subset \mathbb{R}^{n+k}$  und eine Funktion  $h \in C^1(W, \mathbb{R}^k)$  mit  $\text{rang } Dh(q) = k$  für alle  $q \in W$ , so dass

$$M \cap W = \{q \in W : h(q) = 0\}.$$

- (3) Graphenkriterium: Zu jedem  $p \in M$  gibt es nach geeigneter Umnummerierung der Koordinaten eine offene Umgebung  $U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$  und eine Funktion  $u \in C^1(U, V)$ , so dass gilt:

$$M \cap (U \times V) = \{(x, u(x)) : x \in U\}.$$

**Beispiel 9.5** Die Sphäre  $\mathbb{S}^n = \{p \in \mathbb{R}^{n+1} : |p| = 1\}$  ist eine  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit von  $\mathbb{R}^{n+1}$  der Dimension  $n$ , denn für jedes  $p \in \mathbb{S}^n$  können wir im Niveaumengenkriterium  $W = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$  und  $h(q) = |q|^2 - 1$  wählen:

$$Dh(q) = 2q \neq 0 \text{ auf } W \quad \text{und} \quad \mathbb{S}^n \cap W = \mathbb{S}^n = \{q \in W : h(q) = 0\}.$$

Wir brauchen nun einige topologische Tatsachen. Jede Menge  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  ist, versehen mit dem Abstand  $d(p, q) = |p - q|$  für  $p, q \in M$ , ein metrischer Raum. Nach Analysis II, Beispiel 16.2, sind die offenen Mengen in  $M$  von der Form  $M \cap W$  mit  $W \subset \mathbb{R}^{n+k}$  offen, die abgeschlossenen Mengen sind  $M \cap A$  mit  $A \subset \mathbb{R}^{n+k}$  abgeschlossen. Eine Menge  $K \subset M$  ist genau dann kompakt in  $M$ , wenn sie kompakt in  $\mathbb{R}^{n+k}$  ist.

**Satz 9.3 ( $\sigma$ -Kompaktheit von Untermannigfaltigkeiten)** Jede  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  ist als abzählbare Vereinigung  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$  von kompakten Mengen darstellbar.

BEWEIS: Wir verwenden (dreimal) die Tatsache, dass abgeschlossene Teilmengen einer kompakten Menge kompakt sind. Als erstes zeigen wir:

$M \cap \overline{B_r(p)}$  ist kompakt für  $p \in M$  und  $r > 0$  hinreichend klein.

Sei dazu  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  lokale Plättung mit  $p \in W$ . Da  $\phi : W \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  stetig, ist  $M \cap W = \phi^{-1}(\mathbb{R}^n \times \{0\})$  abgeschlossen in  $W$ . Für  $\overline{B_r(p)} \subset W$  ist damit  $M \cap \overline{B_r(p)}$  abgeschlossen, also kompakt. Setze nun für  $p \in M$

$$r(p) = \sup\{r > 0 : M \cap \overline{B_r(p)} \text{ ist kompakt}\} \in (0, \infty].$$

Dann ist  $M \cap \overline{B_r(p)}$  kompakt für alle  $r < r(p)$ . Wir behaupten

$$r(p) \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} r(p_i) \quad \text{für } p_i, p \in M \text{ mit } p_i \rightarrow p.$$

Zu  $r < r(p)$  wähle  $R \in (r, r(p))$ . Dann gilt  $M \cap \overline{B_r(p_i)} \subset M \cap \overline{B_R(p)}$  für  $i$  hinreichend groß, also  $r(p_i) \geq r$ . Für  $P \subset M$  dicht ist damit  $M$  Vereinigung der kompakten Teilmengen

$$M = \bigcup_{p \in P} M \cap \overline{B_{\frac{r(p)}{2}}(p)}.$$

Betrachte nun  $Q_{j,l} = 2^{-l}(j + [0, 1]^{n+k})$  für  $j \in \mathbb{Z}^{n+k}$ ,  $l \in \mathbb{N}_0$ . Wähle in jedem Würfel  $Q_{j,l}$ , der  $M$  trifft, einen Punkt  $p_{j,l} \in M$ . Die Menge  $P$  dieser  $p_{j,l}$  ist abzählbar und dicht in  $M$ .  $\square$

**Definition 9.3 (lokale Parametrisierung)** Sei  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  eine  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse  $C^1$ . Eine lokale Parametrisierung von  $M$  ist eine injektive Immersion  $f : U \rightarrow M \subset \mathbb{R}^{n+k}$ , wobei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen, der Klasse  $C^1$ .

Wir beabsichtigen, die Untermannigfaltigkeit  $M$  durch Bildgebiete von Parametrisierungen zu überdecken und das Maß in jedem einzelnen Bildgebiet mit der Flächenformel zu berechnen.

**Lemma 9.1** Für jede Untermannigfaltigkeit  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  der Klasse  $C^1$  gibt es lokale  $C^1$ -Parametrisierungen  $f_i : U_i \rightarrow M$ , wobei  $i \in \mathbb{N}$ , so dass  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} f(U_i)$ .

BEWEIS: Zu jedem  $p \in M$  gibt es eine lokale Plättung  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  mit  $p \in W$ . Dann ist  $U = \mathbb{R}^n \cap \phi(W)$  offen in  $\mathbb{R}^n$ , und  $f = \phi^{-1}|_{\mathbb{R}^n \cap \phi(W)}$  ist eine lokale Parametrisierung von  $M$  mit  $p \in f(U)$ . Außerdem ist das Bildgebiet  $f(U) = M \cap W$  offen in  $M$ . Eine kompakte Menge  $K \subset M$  wird also durch endlich viele Bildgebiete überdeckt. Die Behauptung folgt mit Satz 9.3.  $\square$

Die folgenden Eigenschaften von lokalen Parametrisierungen sind wesentlich.

**Satz 9.4** Für eine  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  gelten folgende Aussagen.

- (1) Ist  $f : U \rightarrow M$  eine lokale Parametrisierung von  $M$ , so ist  $f(U)$  offen in  $M$  und  $f : U \rightarrow f(U)$  ist homeomorph, das heißt  $f^{-1}$  ist stetig bezüglich der induzierten (Euklidischen) Metrik auf  $f(U)$ .



(2) Sind  $f_i : U_i \rightarrow f(U_i) = V_i$  für  $i = 1, 2$  lokale  $C^1$ -Parametrisierungen von  $M$ , so ist  $f_2^{-1} \circ f_1 : f_1^{-1}(V_1 \cap V_2) \rightarrow f_2^{-1}(V_1 \cap V_2)$  ein  $C^1$ -Diffeomorphismus.

BEWEIS: Wir zeigen (1) erst unter der Annahme, dass eine lokale Plättung  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  existiert mit  $f(U) \subset W$ . Dann ist  $\phi \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{n+k}$  definiert, injektiv, und es gilt


$$\text{rang } D(\phi \circ f)(x) = \text{rang } (D\phi(f(x)) Df(x)) = n \quad \text{für alle } x \in U.$$

Also ist  $V = (\phi \circ f)(U) \subset \mathbb{R}^n$  offen, und  $\phi \circ f : U \rightarrow V$  ist  $C^1$ -Diffeomorphismus. Es folgt

$$f(U) = \phi^{-1}(V) = M \cap \phi^{-1}(V \times \mathbb{R}^k),$$

das heißt  $f(U)$  ist offen in  $M$ . Weiter folgt aus der Darstellung  $f^{-1} = (\phi \circ f)^{-1} \circ \phi|_{f(U)}$  die Stetigkeit, womit (1) unter der Zusatzannahme bewiesen ist.

Allgemein wähle zu  $p \in f(U)$  eine Plättung  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  mit  $p \in W$ , und setze  $\tilde{U} = U \cap f^{-1}(W)$  sowie  $\tilde{f} = f|_{\tilde{U}}$ . Dann ist  $f(\tilde{U}) \subset f(U)$  offene Umgebung von  $p$ , also  $f(U)$  offen in  $M$ . Und  $f^{-1}|_{f(\tilde{U})} = (\tilde{f}|_{\tilde{U}})^{-1}$  ist stetig, das heißt  $f^{-1}$  ist stetig auf ganz  $f(U)$ .



In (2) können wir annehmen, dass  $V_1 \cap V_2 \subset W$  für eine Plättung  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$ . Denn es reicht, die  $C^1$ -Eigenschaft auf einer Umgebung jedes  $x \in f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$  zu zeigen. Wie oben gezeigt sind  $\phi \circ f_i : f_i^{-1}(V_1 \cap V_2) \rightarrow \phi(V_1 \cap V_2)$  diffeomorph, und auf  $f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$  gilt  $f_2^{-1} \circ f_1 = (\phi \circ f_2)^{-1} \circ (\phi \circ f_1)$ .  $\square$

Es gibt eine weitere Charakterisierung, die wir zumindest erwähnen wollen. Und zwar hat eine  $n$ -dimensionale  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  folgende Eigenschaft:

Zu jedem  $p \in M$  gibt es eine offene Umgebung  $V \subset M$  und einen Homeomorphismus  $f : U \rightarrow V$ ,  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen, der eine  $C^1$ -Immersion nach  $\mathbb{R}^{n+k}$  ist.

Zur Erinnerung: eine offene Menge  $V \subset M$  hat die Form  $V = M \cap W$  mit  $W$  offen in  $\mathbb{R}^{n+k}$ . Auf  $V$  ist die induzierte Metrik zugrunde gelegt, das heißt  $f^{-1} : V \rightarrow U$  muss stetig sein bezüglich der Standardmetrik auf  $\mathbb{R}^{n+k}$ .

Ist  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  eine lokale Plättung von  $M$ , so kann  $U = \mathbb{R}^n \cap \phi(W)$  und  $f = \phi^{-1}|_U$  gewählt werden, denn  $\phi : U \rightarrow M \cap W$  ist bijektiv und  $f^{-1} = \phi|_{M \cap W}$  ist stetig. Umgekehrt kann gezeigt werden: eine beliebige Menge  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  mit der obigen Eigenschaft ist eine  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse  $C^1$ . Danach stellt die Eigenschaft ein viertes, äquivalentes Kriterium dar, durch das Untermannigfaltigkeiten charakterisiert sind, siehe Satz 9.2. Für eine gegebene injektive Immersion  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  mit  $f(U) \subset M$  sind Offenheit von  $f(U)$  und Stetigkeit von  $f^{-1} : f(U) \rightarrow U$  eventuell schwierig zu zeigen, jedenfalls ohne die Kriterien aus Satz 9.2. Ist dagegen  $M$  schon als Untermannigfaltigkeit erkannt, so sind beide Eigenschaften automatisch erfüllt nach Satz 9.4(1).

**Satz 9.5 (Definition des Flächenmaßes)** Sei  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  eine  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse  $C^1$ . Dann heißt  $E \subset M$  messbar, falls gilt:

$f^{-1}(E)$  ist  $\mathcal{L}^n$ -messbar für jede lokale Parametrisierung  $f : U \rightarrow M$ .

Das System  $\mathcal{M}$  der messbaren Teilmengen von  $M$  ist eine  $\sigma$ -Algebra, diese enthält die Borelmengen in  $M$ . Weiter gibt es genau ein Maß  $\mu_M$  auf  $\mathcal{M}$ , so dass für jede lokale Parametrisierung  $f : U \rightarrow M$  und jede messbare Menge  $E \subset f(U)$  gilt:

$$\mu_M(E) = \int_{f^{-1}(E)} Jf(x) dx.$$

BEWEIS: Trivialerweise gilt  $\emptyset \in \mathcal{M}$ . Für jede lokale Parametrisierung  $f : U \rightarrow M$  gilt

$$f^{-1}(M \setminus E) = U \setminus f^{-1}(E) \quad \text{und} \quad f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(E_i).$$

Also ist  $\mathcal{M}$  eine  $\sigma$ -Algebra. Mit  $V$  offen in  $M$  ist  $f^{-1}(V)$  offen im  $\mathbb{R}^n$ , das heißt  $\mathcal{M}$  enthält alle Borelmengen. Sei nun  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$  eine disjunkte Zerlegung in Mengen  $M_i \in \mathcal{M}$ , so dass  $M_i \subset V_i$  für lokale Parametrisierungen  $f_i : U_i \rightarrow f(U_i) = V_i$ . Eine solche Zerlegung existiert, denn nach Lemma 9.1 gibt es lokale Parametrisierungen  $f_i : U_i \rightarrow f(U_i) = V_i$  mit  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$ , und wir können die Borelmengen  $M_i = V_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} V_j$  wählen. Aus den verlangten Eigenschaften folgt für das gesuchte Maß  $\mu_M$  und alle messbaren  $E \subset M$

$$(9.3) \quad \mu_M(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_M(E \cap M_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f_i^{-1}(E \cap M_i)} Jf_i(x) dx.$$

Dies beweist die Eindeutigkeit. Andererseits wird durch (9.3) ein Maß auf  $\mathcal{M}$  definiert: ist  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$  mit  $E_j$  messbar und paarweise disjunkt, so folgt nämlich

$$\mu_M(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f_i^{-1}(E \cap M_i)} Jf_i(x) dx = \sum_{i,j=1}^{\infty} \int_{f_i^{-1}(E_j \cap M_i)} Jf_i(x) dx = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_M(E_j).$$

Ist  $f : U \rightarrow V = f(U)$  irgendeine lokale Parametrisierung und  $E \subset V$  messbar, so ist  $\phi_i = f_i^{-1} \circ f : f^{-1}(V \cap V_i) \rightarrow f_i^{-1}(V \cap V_i)$  ein  $C^1$ -Diffeomorphismus zwischen offenen Mengen

nach Satz 9.4. Aus Satz 9.1 folgt

$$\begin{aligned}
\mu_M(E) &= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f_i^{-1}(E \cap M_i)} Jf_i(y) dy \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\phi_i(f^{-1}(E \cap M_i))} Jf_i(y) dy \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f^{-1}(E \cap M_i)} J(f_i \circ \phi_i)(x) dx \\
&= \int_{f^{-1}(E)} Jf(x) dx.
\end{aligned}$$

□

In der Regel werden nur endlich viele Parametrisierungen benötigt, um ein Flächenintegral auszurechnen. Man kann sogar zeigen, dass jede kompakte zusammenhängende Untermannigfaltigkeit bis auf eine  $\mu_M$ -Nullmenge durch eine einzige Parametrisierung erfasst werden kann, aber diese Aussage hat eher theoretischen Wert.

**Folgerung 9.1 (Oberflächenintegral)** Sei  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  eine  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse  $C^1$ , und  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$  eine paarweise disjunkte, messbare Zerlegung, so dass  $M_i \subset V_i$  für lokale Parametrisierungen  $f_i : U_i \rightarrow V_i$ . Für eine messbare Funktion  $u : M \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  gilt die Formel

$$\int_M u d\mu_M = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{f_i^{-1}(M_i)} u(f_i(x)) Jf_i(x) dx,$$

wenn entweder  $u$  nichtnegativ ist oder wenn  $u$  bezüglich  $\mu_M$  integrierbar ist.

BEWEIS: Die Aussage gilt nach Satz 9.5, wenn  $u$  eine charakteristische Funktion ist, und damit auch für messbare Treppenfunktionen. Für  $u \geq 0$  folgt die Behauptung durch Approximation von unten mit Treppenfunktionen  $u_k$  aus dem Satz über monotone Konvergenz. Auf der rechten Seite benutzt man monotone Konvergenz erts für die einzelnen Integrale und dann nachmals für die Reihe. Für integrierbares  $u$  zerlegen wir in  $u^+$  und  $u^-$ . □

Die gegebene Definition des Flächenmaßes ist gut geeignet, um auf einer festen Untermannigfaltigkeit  $M$  das Maß von Teilmengen bzw. Integrale von Funktionen zu berechnen. Dagegen ist die Konstruktion unpraktisch, wenn Aussagen über Folgen von Untermannigfaltigkeiten benötigt werden. Es kann auf  $\mathbb{R}^{n+k}$  ein Maß  $\mathcal{H}^n$  definiert werden – das  $n$ -dimensionale Hausdorffmaß –, so dass die Einschränkung auf jede  $n$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit  $M$  das jeweilige Flächenmaß  $\mu_M$  ergibt. Die Flächenformel wird bei diesem Zugang ein Satz. Wir sind hier von der Flächenformel als Definition ausgegangen, um schneller Beispiele zu rechnen. Die Nachteile unseres Zugangs zeigen sich auch darin, dass folgende Tatsache eigentlich trivial gelten müßte.

**Lemma 9.2 (Transformation des Flächeninhalts unter Ähnlichkeiten)** Sei  $T : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  eine Ähnlichkeitsabbildung, das heißt es gibt  $\lambda > 0$ ,  $Q \in \mathbb{O}(n+k)$  und  $a \in \mathbb{R}^{n+k}$  mit  $T(p) = \lambda Q(p+a)$ . Ist  $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$  eine  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit, so auch  $N = T(M)$  und für die zugehörigen Maße  $\mu_M$  bzw.  $\mu_N$  gilt:

(1) Ist  $A \subset M$  messbar, so ist  $T(A) \subset N$  messbar und

$$\mu_N(T(A)) = \lambda^n \mu_M(A).$$

(2) Ist  $u : N \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mu_N$ -messbar, so ist  $u \circ T : M \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$   $\mu_M$ -messbar und es gilt, sofern eines der Integrale existiert,

$$\int_N u(q) d\mu_N(q) = \lambda^n \int_M u(T(p)) d\mu_M(p).$$

BEWEIS: Zu  $q \in N$  wähle eine lokale Plättung  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  von  $M$  mit  $T^{-1}(q) \in W$ . Dann ist  $\phi \circ T^{-1} : T(W) \rightarrow \phi(W)$  eine lokale Plättung von  $N$  mit  $q \in T(W)$ , also ist  $N$  eine  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit. Ist  $f : U \rightarrow M$  lokale Parametrisierung, so auch  $T \circ f : U \rightarrow N$  und umgekehrt. Wegen  $(T \circ f)^{-1}(T(A)) = f^{-1}(A)$  ist  $A \subset M$  messbar genau wenn  $T(A) \subset N$  messbar ist. Zum Beweis von (1) können wir mittels Zerlegung wie in (9.3) annehmen, dass  $A \subset f(U)$  für eine lokale Parametrisierung  $f : U \rightarrow M$ . Nun gilt wegen  $DT(x) = \lambda Q$

$$D(T \circ f)(x)^T D(T \circ f)(x) = Df(x)^T DT(f(x))^T DT(f(x)) Df(x) = \lambda^2 Df(x)^T Df(x).$$

Mit Satz 9.5 folgt

$$\mu_N(T(A)) = \int_{(T \circ f)^{-1}(T(A))} J(T \circ f)(x) dx = \lambda^n \int_{f^{-1}(A)} Jf(x) dx = \lambda^n \mu_M(A).$$

Für  $u = \chi_B$  mit  $B \subset N$   $\mu_N$ -messbar folgt (2) aus (1). Durch Approximation mit Treppenfunktionen von unten, siehe 5.3, ergibt sich (2) dann für  $u \geq 0$ , und schließlich durch Zerlegung in  $u^+$  und  $u^-$  für beliebige  $\mu_N$ -messbare Funktionen  $u$ .  $\square$

**Satz 9.6 (Zwiebelformel)** Für  $u \in L^1(\mathbb{R}^{n+1})$  ist  $u|_{\partial B_r} \in L^1(\mu_{\partial B_r})$  für fast alle  $r > 0$ , wobei  $\partial B_r = \partial B_r(0)$ , und es gilt

$$\int_{\mathbb{R}^{n+1}} u(p) dp = \int_0^\infty \int_{\partial B_r} u(p) d\mu_{\partial B_r}(p) dr = \int_0^\infty r^n \int_{\mathbb{S}^n} u(r\omega) d\mu_{\mathbb{S}^n}(\omega) dr.$$

BEWEIS: Sei  $f : U \rightarrow V \subset \mathbb{S}^n$  lokale Parametrisierung und  $C(V) = \{r\omega : \omega \in V, r > 0\}$  der offene Kegel über  $V$ . Betrachte den Diffeomorphismus

$$\phi : (0, \infty) \times U \rightarrow C(V), \phi(r, x) = rf(x).$$

Mit  $g_{ij}(x) = \langle \frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j} \rangle$  lautet die Gramsche Matrix von  $\phi$

$$D\phi(r, x)^T D\phi(r, x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 g(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}.$$

Ist  $E = f(A)$  für  $\mathcal{L}^n$ -messbares  $A \subset U$  und  $C(E)$  der Kegel über  $E$ , so folgt aus dem Transformationssatz und Fubini

$$\begin{aligned} \int_{C(E)} u(p) dp &= \int_{(0, \infty) \times A} u(rf(x)) r^n \sqrt{\det g(x)} d\mathcal{L}^{n+1}(r, x) \\ &= \int_0^\infty r^n \int_A u(rf(x)) \sqrt{\det g(x)} dx dr \\ &= \int_0^\infty r^n \int_E u(r\omega) d\mu_{\mathbb{S}^n}(\omega) dr \\ &= \int_0^\infty \int_{\{r\omega : \omega \in E\}} u(p) d\mu_{\partial B_r}(p) dr, \end{aligned}$$

wobei zuletzt Lemma 9.2 benutzt wurde. Wähle nun eine disjunkte Zerlegung  $\mathbb{S}^n = \bigcup_{j=1}^N E_j$  mit  $E_j \subset V_j$ , wobei  $f_j : U_j \rightarrow V_j$  lokale Parametrisierungen sind. Durch Addition folgt die Behauptung.  $\square$

**Beispiel 9.6** Mit  $u = \chi_{B_1(0)}$  folgt für das Maß  $\omega_n = \mu_{\mathbb{S}^n}(\mathbb{S}^n)$  der  $n$ -dimensionalen Sphäre

$$\alpha_{n+1} = \mathcal{L}^{n+1}(B_1(0)) = \int_0^1 \mu_{\partial B_r}(\partial B_r) dr = \int_0^1 \omega_n r^n dr = \frac{\omega_n}{n+1},$$

also zum Beispiel  $\omega_1 = 2\pi$ ,  $\omega_2 = 4\pi$  und  $\omega_3 = 2\pi^2$ , vgl. Beispiel 7.3.



## 10 Der Integralsatz von Gauß

In diesem Abschnitt beweisen wir den Integralsatz von Gauß (Englisch: *divergence theorem*), der eine mehrdimensionale Verallgemeinerung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung ist. Aussage des Satzes ist, unter geeigneten technischen Voraussetzungen, die Formel

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} X \, d\mathcal{L}^n = \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle \, d\mu.$$

Dabei ist  $X$  ein Vektorfeld,  $\nu$  die äußere Einheitsnormale auf dem Rand von  $\Omega$  und  $\mu$  das Flächenmaß auf  $\partial\Omega$ . In der Flüssigkeitsdynamik und der Elektrodynamik wird die Divergenz als Quellenstärke und das Randintegral als Fluss des Vektorfelds durch  $\partial\Omega$  interpretiert. Aus dem Satz folgen dann entsprechende Erhaltungsgesetze.

Vorab behandeln wir heuristisch den Fall, wenn das zugrundeliegende Gebiet ein  $n$ -dimensionaler Quader  $Q$  ist, das heißt  $Q = (a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n)$ . Außerhalb der niederdimensionalen Kanten ist die äußere Einheitsnormale

$$\nu(x) = \begin{cases} -e_i & \text{für } x \in \partial Q \text{ mit } x_i = a_i \\ e_i & \text{für } x \in \partial Q \text{ mit } x_i = b_i. \end{cases}$$

Wir setzen  $Q_i = (a_1, b_1) \times \dots \times \widehat{(a_i, b_i)} \times \dots \times (a_n, b_n) \subset \mathbb{R}^{n-1}$ , wobei das Dach bedeutet, dass der Faktor wegzulassen ist. Für ein hinreichend glattes Vektorfeld  $X : \overline{Q} \rightarrow \mathbb{R}^n$  berechnen wir mit dem Satz von Fubini und dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$$\begin{aligned} \int_Q \operatorname{div} X \, d\mathcal{L}^n &= \sum_{i=1}^n \int_Q \frac{\partial X_i}{\partial x_i} \, d\mathcal{L}^n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{Q_i} \int_{a_i}^{b_i} \frac{\partial X_i}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \, dx_i \, dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{Q_i} X_i(x_1, \dots, b_i, \dots, x_n) \, dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_n \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \int_{Q_i} X_i(x_1, \dots, a_i, \dots, x_n) \, dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\{x_i=b_i\}} \langle X(x), e_i \rangle \, d\mu(x) - \sum_{i=1}^n \int_{\{x_i=a_i\}} \langle X(x), e_i \rangle \, d\mu(x) \\ &= \int_{\partial Q} \langle X, \nu \rangle \, d\mu. \end{aligned}$$

Aber wir wollen natürlich die Aussage nicht nur für Quader haben. Eine geeignete Klasse von Gebieten wird in folgendem Satz definiert. Dieser ist analog zu den Untermannigfaltigkeitskriterien, siehe Satz 9.2 beziehungsweise Analysis II, Satz 24.2.

**Satz 10.1 (Kriterien für  $C^1$ -Rand)** Für  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen sind äquivalent:

- (1) Plättung: zu jedem  $p \in \partial\Omega$  gibt es eine offene Umgebung  $W \subset \mathbb{R}^n$  und einen  $C^1$ -Diffeomorphismus  $\phi : W \rightarrow \phi(W)$  mit

$$\phi(\Omega \cap W) = \mathbb{H}^n \cap \phi(W), \quad \text{wobei } \mathbb{H}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times (-\infty, 0).$$

- (2) Subniveau: zu jedem  $p \in \partial\Omega$  gibt es eine offene Umgebung  $W \subset \mathbb{R}^n$  und eine Funktion  $h \in C^1(W)$  mit  $Dh(q) \neq 0$  für alle  $q \in W$ , so dass

$$\Omega \cap W = \{q \in W : h(q) < 0\}.$$

- (3) Subgraph: zu jedem  $p \in \partial\Omega$  gibt es eine offene Menge  $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ , ein offenes Intervall  $I \subset \mathbb{R}$  und eine  $C^1$ -Funktion  $u : U \rightarrow I$ , so dass nach geeigneter Ummummerierung der Koordinaten gilt:

$$\Omega \cap (U \times I) = \{(x, y) \in U \times I : y < u(x)\}.$$

Die Menge  $\Omega$  hat  $C^1$ -Rand, wenn eines (und damit jedes) der drei Kriterien erfüllt ist.

In diesem Kapitel arbeiten wir ausschließlich mit dem Subgraphenkriterium (3). Anschaulich hat eine Menge  $C^1$ -Rand, wenn ihr Rand eine  $(n - 1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit ist, und die Menge lokal auf einer Seite des Randes liegt. Dies wird in folgendem Lemma präzisiert.

**Lemma 10.1** *In der Situation von Satz 10.1(3) gilt*

$$\begin{aligned} \partial\Omega \cap (U \times I) &= \{(x, y) \in U \times I : y = u(x)\}, \\ (\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}) \cap (U \times I) &= \{(x, y) \in U \times I : y > u(x)\}. \end{aligned}$$

Insbesondere ist  $\partial\Omega$  eine  $(n - 1)$ -dimensionale  $C^1$ -Untermannigfaltigkeit des  $\mathbb{R}^n$  nach dem Graphenkriterium in Satz 9.2.

BEWEIS: Mit der Funktion  $h : U \times I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x, y) = y - u(x)$ , gilt nach Voraussetzung  $\Omega \cap (U \times I) = \{h < 0\}$ . Aus der Stetigkeit von  $h$  folgt  $\partial\Omega \cap (U \times I) \subset \{h = 0\}$ . Ist andererseits  $h(x, y) = 0$ , so folgt für  $\varepsilon > 0$  hinreichend klein  $(x, y - \varepsilon) \in U \times I$  und

$$h(x, y - \varepsilon) = h(x, y) - \varepsilon < 0.$$

Dies zeigt  $(x, y) \in \overline{\Omega}$ , und wegen  $(x, y) \notin \Omega$  folgt  $(x, y) \in \partial\Omega \cap (U \times I)$ . Damit ist die erste Behauptung bewiesen, und die zweite folgt wegen  $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ .  $\square$

**Beispiel 10.1** Der Halbraum  $\mathbb{H}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times (-\infty, 0)$  hat  $C^1$ -Rand, denn in Satz 10.1(3) können wir  $U = \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $I = (-\infty, \infty)$  und  $u : U \rightarrow I$ ,  $u(x) \equiv 0$ , wählen, und zwar für jeden Punkt  $p \in \partial\mathbb{H}^n$ . Dagegen hat  $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : x_n \neq 0\}$  keinen  $C^1$ -Rand, obwohl der Rand  $\partial\Omega = \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$  eine  $(n - 1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit ist. Denn für eine lokale Beschreibung als Subgraph wie in Satz 10.1(3) würde mit Lemma 10.1 folgen:

$$\{(x, y) \in U \times I : y > u(x)\} = (\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}) \cap (U \times I) = \emptyset,$$

ein Widerspruch wegen  $I$  offen und  $u(x) \in I$  für  $x \in U$ .

Als nächstes erinnern wir an das Konzept des Tangentialraums. Ein Vektor  $v \in \mathbb{R}^n$  heißt Tangentialvektor von  $M \subset \mathbb{R}^n$  im Punkt  $p \in M$ , wenn es eine Abbildung  $\gamma : (-\delta, \delta) \rightarrow M$  gibt mit  $\gamma(0) = p$  und  $\gamma'(0) = v$ . Ist  $M$  eine  $m$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit, so ist die Menge  $T_p M$  aller Tangentialvektoren in  $p \in M$  ein  $m$ -dimensionaler Unterraum, der Tangentialraum von  $M$  in  $p$ , siehe Kapitel 24 in Analysis II. Die Hyperebene  $T_p(\partial\Omega)$  besitzt genau zwei Einheitsnormalen, von denen wir jetzt eine auszeichnen.



**Lemma 10.2 (Definition der äußeren Normale)** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen mit  $C^1$ -Rand. Dann gibt es zu  $p \in \partial\Omega$  genau einen Vektor  $\nu(p) \in \mathbb{R}^n$  mit folgenden Eigenschaften:

- (1)  $\nu(p) \perp T_p(\partial\Omega)$  und  $|\nu(p)| = 1$ ,
- (2)  $p + t\nu(p) \notin \Omega$  für  $t > 0$  hinreichend klein.

Das Vektorfeld  $\nu : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $p \mapsto \nu(p)$ , ist stetig und heißt äußere Normale von  $\Omega$ .

BEWEIS: Wähle mit Satz 10.1(3) zu  $p \in \partial\Omega$  nach eventueller Umnummerierung der Koordinaten eine Darstellung  $\Omega \cap (U \times I) = \{(x, y) \in U \times I : y < u(x)\}$ . Wir zeigen die Existenz und Eindeutigkeit der äußeren Normale gleich für alle  $q \in \partial\Omega \cap (U \times I)$ . Nach Lemma 10.1 ist die Graphenabbildung  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $f(x) = (x, u(x))$ , eine lokale Parametrisierung von  $\partial\Omega$ . Der Tangentialraum  $T_q(\partial\Omega)$  im Punkt  $q = (x, u(x))$  hat die Basis

$$(e_i, \frac{\partial u}{\partial x_i}(x)) = \frac{d}{dt} f(x + te_i)|_{t=0} \quad \text{für } i = 1, \dots, n-1.$$

Definiere nun auf  $\partial\Omega \cap (U \times I)$  das Vektorfeld

$$(10.1) \quad \nu(q) = \frac{(-Du(x), 1)}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}} \quad \text{für } q = (x, u(x)).$$

Damit erfüllt  $\nu(q)$  die Bedingung (1). Wir berechnen  $q + t\nu(q) = (x(t), y(t))$  mit

$$x(t) = x - t \frac{Du(x)}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}} \quad \text{und} \quad y(t) = u(x) + t \frac{1}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}}.$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{dt} (y(t) - u(x(t)))|_{t=0} = \frac{1}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}} + Du(x) \frac{Du(x)}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}} = \sqrt{1 + |Du(x)|^2} > 0.$$

Mit Lemma 10.1 folgt  $q + t\nu(q) \notin \Omega$ , sowie  $q - t\nu(q) \in \Omega$ , für  $t > 0$  hinreichend klein, das heißt  $\nu(q)$  ist der eindeutig bestimmte Vektor mit den Eigenschaften (1) und (2). Außerdem ergibt sich aus (10.1) die Stetigkeit von  $\nu$ .  $\square$

**Definition 10.1 ( $C^1(\overline{\Omega})$ -Raum)** Für  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  bezeichnen wir mit  $C^1(\overline{\Omega})$  den Unterraum aller Funktionen  $f \in C^1(\Omega)$ , für die  $f$  und  $Df$  stetige Fortsetzungen auf  $\overline{\Omega}$  besitzen. Es ist dabei üblich, die Fortsetzung von  $f$  wieder mit  $f$  zu bezeichnen.

Wir zeigen nun eine lokale Version des Satzes von Gauß.

**Lemma 10.3** Sei  $\Omega = \{(x, y) \in U \times I : y < u(x)\}$ , wobei  $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$  offen,  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  und  $u \in C^1(U, I)$ . Hat das Vektorfeld  $X \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$  kompakten Träger in  $U \times I$ , so gilt

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} X \, d\mathcal{L}^n = \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle \, d\mu.$$

BEWEIS: Da  $X(x, a) = 0$  für alle  $x \in U$ , folgt mit Fubini

$$(10.2) \quad \int_{\Omega} \frac{\partial X_n}{\partial y} d\mathcal{L}^n = \int_U \int_a^{u(x)} \frac{\partial X_n}{\partial y}(x, y) dy dx = \int_U X_n(x, u(x)) dx.$$

Weiter behaupten wir für  $i = 1, \dots, n-1$

$$(10.3) \quad \int_{\Omega} \frac{\partial X_i}{\partial x_i} d\mathcal{L}^n = - \int_U X_i(x, u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx.$$

Aus (10.2) und (10.3) folgt das Lemma, denn wir haben

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div} X d\mathcal{L}^n &= - \sum_{i=1}^{n-1} \int_U X_i(x, u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx + \int_U X_n(x, u(x)) dx \\ &= \int_U \left\langle X(x, u(x)), \frac{(-Du(x), 1)}{\sqrt{1 + |Du(x)|^2}} \right\rangle \sqrt{1 + |Du(x)|^2} dx \\ &= \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle d\mu. \end{aligned}$$

Dabei haben wir im letzten Schritt Folgerung 9.1 zur Berechnung des Oberflächenintegrals, Formel (9.1) für die Jacobische von Graphen und Formel (10.1) für die äußere Normale benutzt. Um Gleichung (10.3) zu verifizieren, wählen wir eine Abschneidefunktion  $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$  mit  $\eta(t) = 1$  für  $t \leq -2$  und  $\eta(t) = 0$  für  $t \geq -1$ , und setzen  $\eta_\varepsilon(t) = \eta(t/\varepsilon)$ . Es folgt  $\eta_\varepsilon(y - u(x)) = 0$  für  $y \geq u(x) - \varepsilon$  und

$$\lim_{\varepsilon \searrow 0} \eta_\varepsilon(y - u(x)) = \begin{cases} 1 & \text{falls } y < u(x), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Mit zweimaliger partieller Integration, siehe Satz 7.3, sehen wir für  $i = 1, \dots, n-1$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\partial X_i}{\partial x_i}(x, y) \eta_\varepsilon(y - u(x)) d\mathcal{L}^n(x, y) &= \int_{\Omega} X_i(x, y) \eta'_\varepsilon(y - u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) d\mathcal{L}^n(x, y) \\ &= - \int_{\Omega} \frac{\partial X_i}{\partial y}(x, y) \eta_\varepsilon(y - u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) d\mathcal{L}^n(x, y). \end{aligned}$$

Da die beteiligten Funktionen beschränkt sind, folgt mit Lebesgue für  $\varepsilon \searrow 0$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\partial X_i}{\partial x_i} d\mathcal{L}^n &= - \int_{\Omega} \frac{\partial X_i}{\partial y}(x, y) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) d\mathcal{L}^n(x, y) \\ &= - \int_U \left( \int_a^{u(x)} \frac{\partial X_i}{\partial y}(x, y) dy \right) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx \\ &= - \int_U X_i(x, u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx. \end{aligned}$$

Das ist (10.3), also ist das Lemma bewiesen.  $\square$

Wir müssen schließlich das Resultat globalisieren. Das entscheidende Hilfsmittel ist dabei eine sogenannte Teilung der Eins, die nun konstruiert werden soll.

**Lemma 10.4 (Teilung der Eins)** Sei  $W_\lambda$ ,  $\lambda \in \Lambda$ , eine offene Überdeckung der kompakten Menge  $K \subset \mathbb{R}^n$ . Dann gibt es eine untergeordnete Teilung der Eins, das heißt es gibt eine endliche Familie von Funktionen  $\chi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,  $j \in J$ , so dass gilt:

(1)  $\sum_{j \in J} \chi_j(p) = 1$  für alle  $p \in K$ .

(2) Für jedes  $j \in J$  gibt es ein  $\lambda = \lambda(j)$  mit  $\text{spt } \chi_j \subset W_\lambda$ .

BEWEIS: Wähle eine beschränkte offene Menge  $\Omega \supset K$ , und bestimme zu jedem  $p \in \bar{\Omega}$  einen Ball  $B_{r(p)}(p)$  wie folgt: für  $p \in K$  wähle  $\lambda(p) \in \Lambda$  mit  $p \in W_{\lambda(p)}$ , und weiter  $r(p) > 0$  mit  $\overline{B_{2r(p)}(p)} \subset (W_{\lambda(p)} \cap \Omega)$ . Zu  $p \in \bar{\Omega} \setminus K$  wähle  $r(p) > 0$  mit  $\overline{B_{2r(p)}(p)} \cap K = \emptyset$ . Endlich viele Kugeln  $B_{r(p_j)}(p_j)$ ,  $1 \leq j \leq N$ , überdecken  $\bar{\Omega}$ . Wähle nun  $\tilde{\chi}_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  mit

$$\tilde{\chi}_j = \begin{cases} 1 & \text{auf } B_{r(p_j)}(p_j) \\ 0 & \text{auf } \mathbb{R}^n \setminus B_{2r(p_j)}(p_j). \end{cases}$$

Es folgt  $\sum_{j=1}^N \tilde{\chi}_j \geq 1$  auf  $\bar{\Omega}$ . Die Funktionen  $\chi_j = \tilde{\chi}_j / (\sum_{j=1}^N \tilde{\chi}_j)$  mit  $j \in J := \{j : p_j \in K\}$  sind glatt in  $\Omega$  mit  $\text{spt } \chi_j \subset \subset (W_{\lambda(p_j)} \cap \Omega)$ , und wegen  $\tilde{\chi}_j|_K = 0$  für  $j \notin J$  gilt  $\sum_{j \in J} \chi_j \equiv 1$  auf  $K$ .  $\square$

**Satz 10.2 (Integralsatz von Gauß)** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  eine offene, beschränkte Menge mit  $C^1$ -Rand und äußerer Normale  $\nu : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Dann gilt für ein Vektorfeld  $X \in C^1(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n)$

$$\int_{\Omega} \text{div } X \, d\mathcal{L}^n = \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle \, d\omega.$$

BEWEIS: Wähle nach Satz 10.1(3) zu jedem  $p \in \partial\Omega$  eine Umgebung  $W_p$ , in der  $\Omega$  bezüglich geeigneter Koordinaten als Subgraph dargestellt ist. Für  $p \in \Omega$  setze einfach  $W_p = \Omega$ . Die Mengen  $W_p$  bilden eine offene Überdeckung von  $\bar{\Omega}$ . Wähle mit Lemma 10.4 eine untergeordnete Teilung der Eins  $\chi_1, \dots, \chi_N \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Liegt  $\text{spt } \chi_j$  in einer Randumgebung  $W_p = U \times I$  wie in 10.1(3), so folgt aus Lemma 10.3

$$\int_{\Omega} \text{div } (\chi_j X) \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle \chi_j X, \nu \rangle \, d\mu.$$

Ist  $\text{spt } \chi_j \subset W_p = \Omega$ , so folgt einfach mit partieller Integration, Satz 7.3,

$$\int_{\Omega} \text{div } (\chi_j X) \, dx = 0 = \int_{\partial\Omega} \langle \chi_j X, \nu \rangle \, d\mu.$$

Durch Addition erhalten wir wie gewünscht

$$\int_{\Omega} \text{div } X \, dx = \sum_{j=1}^N \int_{\Omega} \text{div } (\chi_j X) \, dx = \sum_{j=1}^N \int_{\partial\Omega} \langle \chi_j X, \nu \rangle \, d\mu = \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle \, d\mu.$$

$\square$

Der Satz von Gauß wird oft für Gebiete benötigt, die nicht  $C^1$ -Rand haben, zum Beispiel Polyeder. Der gegebene Beweis kann auf Gebiete ausgedehnt werden, deren Rand lokal ein Lipschitzgraph ist\*.

---

\*siehe H.W. Alt, Lineare Funktionalanalysis.

**Beispiel 10.2** Wählen wir im Satz von Gauß als Vektorfeld  $X(x) = x$ , so folgt

$$\mathcal{L}^n(\Omega) = \frac{1}{n} \int_{\Omega} \operatorname{div} X \, d\mathcal{L}^n = \frac{1}{n} \int_{\partial\Omega} \langle x, \nu(x) \rangle \, d\mu(x).$$

Insbesondere ergibt sich wieder  $\alpha_n = \omega_{n-1}/n$ , vergleiche Beispiel 9.6.

**Folgerung 10.1 (Greensche Formeln)** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und beschränkt mit  $C^1$ -Rand. Dann gilt für  $u \in C^1(\overline{\Omega})$  und  $v \in C^2(\overline{\Omega})$

$$\int_{\Omega} (u\Delta v + \langle Du, Dv \rangle) \, d\mathcal{L}^n = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \nu} \, d\mu.$$

Weiter folgt für  $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) \, d\mathcal{L}^n = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, d\mu.$$

BEWEIS: Die erste Aussage folgt aus dem Satz von Gauß wegen  $\operatorname{div}(uDv) = \langle Du, Dv \rangle + u\Delta v$ . Die zweite Aussage ergibt sich aus der ersten durch Vertauschen von  $u$  und  $v$ .  $\square$

**Beispiel 10.3 (Mittelwerteigenschaft harmonischer Funktionen)** Sei  $u \in C^2(\Omega)$  eine harmonische Funktion, das heißt  $\Delta u = 0$  auf  $\Omega$ . Aus dem Satz von Gauß folgt dann für  $x_0 \in \Omega$  und  $0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial\Omega)$

$$\int_{\partial B_r(x_0)} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, d\mu = \int_{B_r(x_0)} \Delta u \, dx = 0.$$

Betrachte weiter die auf  $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$  harmonische Funktion  $v(x) = \gamma(|x - x_0|)$  mit

$$\gamma(\varrho) = \begin{cases} \frac{\varrho^{2-n}}{2-n} & \text{für } n \geq 3, \\ \log \varrho & \text{für } n = 2. \end{cases}$$

Aus der zweiten Greenschen Formel folgt wegen  $\gamma'(\varrho) = \varrho^{1-n}$

$$r^{1-n} \int_{\partial B_r(x_0)} u \, d\mu = \varepsilon^{1-n} \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} u \, d\mu.$$

Nun gilt aber für  $\varepsilon \searrow 0$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\omega_{n-1}\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} u(x) \, d\mu(x) - u(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{\omega_{n-1}\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} (u(x) - u(x_0)) \, d\mu(x) \right| \\ &\leq \sup_{|x-x_0|=\varepsilon} |u(x) - u(x_0)| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dies beweist die sphärische Mittelwerteigenschaft harmonischer Funktionen:

$$u(x_0) = \frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x_0)} u(x) \, d\mu(x) \quad \text{für } 0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial\Omega).$$

Mit Satz 9.6 folgt auch die Mittelwertformel auf Kugeln:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n r^n} \int_{B_r(x_0)} u(x) dx &= \frac{1}{\alpha_n r^n} \int_0^r \int_{\partial B_\varrho(x_0)} u(x) d\mu_\varrho(x) d\varrho \\ &= \frac{u(x_0)}{\alpha_n r^n} \int_0^r \omega_{n-1} \varrho^{n-1} d\varrho \\ &= u(x_0). \end{aligned}$$

**Beispiel 10.4 (Strömungen)** Sei  $v \in C^1(G \times (a, b), \mathbb{R}^n)$ ,  $v = v(x, t)$ , ein evtl. zeitabhängiges Vektorfeld auf dem Gebiet  $G \subset \mathbb{R}^n$ . Für  $x \in G$  sei  $\phi^x : (a_x, b_x) \rightarrow G$  die maximale Lösung des Anfangswertproblems

$$\frac{d\phi^x}{dt}(t) = v(\phi^x(t), t) \quad \text{und} \quad \phi^x(0) = x.$$

Anschaulich interpretieren wir  $v$  als Geschwindigkeitsfeld einer Strömung und  $\phi^x(t)$  als Bahnkurve eines Partikels, das zur Zeit  $t = 0$  an der Stelle  $x$  ist. Zusammenfassen aller Bahnkurven ergibt eine  $C^1$ -Abbildung, den Fluss von  $v$ ,

$$\phi : \{(x, t) \in G \times (a, b) : a_x < t < b_x\} \rightarrow G, \quad \phi(x, t) = \phi^x(t).$$

Die Mengen  $G_t = \{x \in G : t \in (a_x, b_x)\}$  sind offen, und die Abbildungen  $\phi_t : G_t \rightarrow G_{-t}$ ,  $\phi_t(x) = \phi(x, t)$ , sind Diffeomorphismen mit

$$\phi_s \circ \phi_t = \phi_{s+t} \quad \text{auf } G_t \cap G_{s+t}.$$

Zur Zeit  $t = 0$  gilt  $\frac{\partial}{\partial t}(D_x \phi) = D_x \left( \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = D_x v$ , insbesondere wegen  $D_x \phi(x, 0) = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\det D_x \phi)|_{t=0} = \text{tr } D_x v = \text{div } v.$$

Sei nun  $\varrho \in C^1(G \times (a, b))$  die evtl. auch zeitabhängige Dichteverteilung der Strömung. Ist  $\Omega \subset\subset G$ , so gilt  $\Omega \subset G_t$  für  $|t|$  hinreichend klein. Es bezeichne  $m_\Omega(t)$  die im Gebiet  $\phi_t(\Omega)$  enthaltene Masse. Mit dem Transformationssatz und Differentiation unter dem Integral folgt

$$\begin{aligned} m'_\Omega(0) &= \frac{d}{dt} \int_{\phi_t(\Omega)} \varrho(y, t) dy|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt} \int_\Omega \varrho(\phi_t(x), t) \det D_x \phi(x, t) dx|_{t=0} \\ &= \int_\Omega \left( D_x \varrho \cdot v + \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \varrho \text{div } v \right) dx \\ &= \int_\Omega \left( \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \text{div}(\varrho v) \right) dx. \end{aligned}$$

Für beliebige  $t \in (a, b)$  mit  $\Omega \subset\subset G_t$  ergibt sich aus dem Fall  $t = 0$

$$m'_\Omega(t) = \frac{d}{ds} \int_{\phi_s(\phi_t(\Omega))} \varrho(y, s+t) dy|_{s=0} = \int_{\phi_t(\Omega)} \left( \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \text{div}(\varrho v) \right) dx.$$

Gilt daher auf  $G \times (a, b)$  die Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \text{div}(\varrho v) = 0,$$

so ist die Funktion  $m_\Omega(t)$  für alle  $\Omega \subset\subset G$  zeitlich konstant. Wählen wir  $\varrho \equiv 1$ , so ist  $m_\Omega(t)$  das Volumen von  $\phi_t(\Omega)$ , und der Satz von Gauß impliziert

$$m'_\Omega(0) = \int_{\partial\Omega} \langle v, \nu \rangle d\mu.$$

Das Flächenelement  $d\mu$  trägt mit der Normalkomponente  $\langle v, \nu \rangle$  zur Änderung des eingeschlossenen Volumens bei, was eine sehr anschauliche Deutung des Gaußschen Satzes ist.

**Beispiel 10.5 (Integralsatz von Cauchy)** Sei  $\Omega \subset \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$  beschränktes Gebiet mit  $C^1$ -Rand. Die Funktion  $f \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{C})$ ,  $f = u + iv$ , sei holomorph, das heißt es gelten die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Sei  $\gamma : [0, L] \rightarrow \partial\Omega$  die Parametrisierung einer Komponente von  $\partial\Omega$  nach der Bogenlänge, so dass  $\Omega$  links von  $\gamma$  liegt, das heißt die äußere Normale längs  $\gamma(s) = (x(s), y(s))$  ist  $\nu(s) = (y'(s), -x'(s))$ . Aus der Definition des komplexen Kurvenintegrals folgt

$$\begin{aligned} \int_\gamma f dz &= \int_0^L (ux' - vy') ds + i \int_0^L (uy' + vx') ds \\ &= \int_0^L \langle (-v, -u), (y', -x') \rangle ds + i \int_0^L \langle (u, -v), (y', -x') \rangle ds. \end{aligned}$$

Also impliziert der Satz von Gauß

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} f(z) dz &= \int_\Omega \operatorname{div}(-v, -u) dx dy + i \int_\Omega \operatorname{div}(u, -v) dx dy \\ &= - \int_\Omega \left( \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \int_\Omega \left( \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

## 11 Faltung und Fouriertransformation

Es werden die Faltung und die Fouriertransformation für Funktionen im  $\mathbb{R}^n$  als Anwendungen der Integrationstheorie behandelt. Die Faltung ordnet zwei gegebenen Funktionen eine dritte Funktion durch gewichtete Mittelung zu. Dieses Verfahren kann unter anderem dazu benutzt werden, gegebene Funktionen zu glätten. Die zentrale Aussage zur Fouriertransformation ist der Satz von Plancherel, der die Rückberechnung einer Funktion aus ihrer Fouriertransformierten erlaubt. Als Anwendung berechnen wir die Lösung der Wärmeleitungsgleichung zu gegebenen Anfangsdaten im  $\mathbb{R}^n$ , und diskutieren das entsprechende Problem für die Wellengleichung.

In diesem Kapitel haben wir es ausschließlich mit dem  $n$ -dimensionalen Lebesguemaß zu tun, und wir schreiben statt  $d\mathcal{L}^n(x)$  stets einfach  $dx$ .

**Satz 11.1 (Definition der Faltung)** Sei  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , und  $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ . Die Faltung von  $f$  mit  $g$  ist die  $\mathcal{L}^n$ -fast-überall definierte Funktion

$$f * g : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

Es gilt  $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$  sowie  $\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}$ .

BEWEIS: Die Funktion  $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y) = f(x - y)g(y)$  ist messbar bezüglich  $\mathcal{L}^{2n} = \mathcal{L}^n \times \mathcal{L}^n$ . Denn  $f_0(x, y) = f(x)$  und  $g_0(x, y) = g(y)$  sind  $\mathcal{L}^{2n}$ -messbar, und wegen  $f(x - y) = (f_0 \circ T)(x, y)$  mit  $T(x, y) = (x - y, y)$  ist  $(x, y) \mapsto f(x - y)g(y)$  ebenfalls  $\mathcal{L}^{2n}$ -messbar nach Satz 4.5. Wir zeigen die Behauptung nun zunächst für  $f, g \geq 0$ . Nach dem Satz von Fubini, Satz 7.2, ist die Funktion  $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} F(x, y) dy$  messbar, und mit der Hölderschen Ungleichung folgt

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)^{\frac{1}{p}} g(y)^{\frac{p-1}{p}} dy \right)^p dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)^p g(y) dy \right) \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy \right)^{p-1} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)^p dx \right) g(y) dy \cdot \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy \right)^{p-1} \\ &= \|f\|_{L^p}^p \|g\|_{L^1}^p < \infty. \end{aligned}$$

Für  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$  beliebig folgt durch Zerlegung in  $f^\pm$  bzw.  $g^\pm$ , dass die Funktion  $f * g$  für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alle  $x \in \mathbb{R}^n$  definiert und endlich ist, sowie  $\mathcal{L}^n$ -messbar. Der Satz ergibt sich nun aus der Abschätzung

$$\|f * g\|_{L^p}^p \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| |g(y)| dy \right)^p dx \leq \|f\|_{L^p}^p \|g\|_{L^1}^p.$$

□

Die Faltung ist kommutativ, denn mit der Substitution  $x - y = z$  folgt

$$(11.1) \quad (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x - z) dz = (g * f)(x).$$

**Lemma 11.1** Sei  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$  mit  $1 \leq p \leq \infty$ , und  $\tau_h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\tau_h(x) = x + h$ . Dann gelten folgende Aussagen.

(i)  $f \circ \tau_h \in L^p(\mathbb{R}^n)$  und  $\|f \circ \tau_h\|_{L^p} = \|f\|_{L^p}$ .

(ii)  $f \circ \tau_h \rightarrow f$  in  $L^p(\mathbb{R}^n)$  für  $h \rightarrow 0$ , falls  $p < \infty$ .

BEWEIS: Aussage (i) ist trivial. Wir zeigen (ii) zunächst unter der Annahme  $f \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ . Dann gilt  $\text{osc}(f, \delta) := \sup_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)| \searrow 0$  für  $\delta \searrow 0$ , folglich

$$\|f \circ \tau_h - f\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| \leq \text{osc}(f, |h|) \rightarrow 0 \quad \text{mit } h \rightarrow 0.$$

Wähle  $R > 0$  mit  $\text{spt } f \subset B_R(0)$ . Dann gilt  $\text{spt}(f \circ \tau_h) \subset B_{R+|h|}(0)$ , also für  $|h| < 1$

$$\|f \circ \tau_h - f\|_{L^p} \leq \|f \circ \tau_h - f\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \mathcal{L}^n(B_{R+1}(0))^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad \text{mit } h \rightarrow 0.$$


Sei nun  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$  beliebig. Nach Satz 6.10 ist  $C_c^0(\mathbb{R}^n)$  dicht in  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , das heißt zu  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $f_\varepsilon \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$  mit  $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \varepsilon/2$ , und es folgt mit Aussage (i)

$$\|f \circ \tau_h - f\|_{L^p} \leq \|(f - f_\varepsilon) \circ \tau_h\|_{L^p} + \|f_\varepsilon \circ \tau_h - f_\varepsilon\|_{L^p} + \|f_\varepsilon - f\|_{L^p} < \|f_\varepsilon \circ \tau_h - f_\varepsilon\|_{L^p} + \varepsilon.$$

Somit gilt  $\limsup_{h \rightarrow 0} \|f \circ \tau_h - f\|_{L^p} \leq \varepsilon$ , und Behauptung (ii) folgt mit  $\varepsilon \searrow 0$ .  $\square$

**Satz 11.2 (Approximation durch Faltung)** Sei  $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$  mit  $1 \leq p < \infty$ . Ist  $\eta \in L^1(\mathbb{R}^n)$  mit  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(z) dz = 1$ , so folgt für  $\eta_\varrho(x) = \varrho^{-n} \eta(x/\varrho)$

$$\|f * \eta_\varrho\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|\eta\|_{L^1} \quad \text{und} \quad f * \eta_\varrho \rightarrow f \text{ in } L^p(\mathbb{R}^n).$$



BEWEIS: Durch Substitution sieht man  $\|\eta_\varrho\|_{L^1} = \|\eta\|_{L^1}$ , daher gilt  $f * \eta_\varrho \in L^p(\mathbb{R}^n)$  und  $\|f * \eta_\varrho\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|\eta\|_{L^1}$  nach Satz 11.1. Weiter folgt mit der Substitution  $y = \varrho z$

$$(f * \eta_\varrho)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \eta_\varrho(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\varrho z) \eta(z) dz.$$



Wir schätzen mit der Hölderschen Ungleichung und dem Satz von Fubini wie folgt ab:

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \eta_\varrho)(x) - f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x - \varrho z) - f(x)) \eta(z) dz \right|^p dx \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - \varrho z) - f(x)| |\eta(z)|^{\frac{1}{p}} |\eta(z)|^{\frac{p-1}{p}} dz \right)^p dx \\
&\leq \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - \varrho z) - f(x)|^p |\eta(z)| dz dx \\
&= \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} |\eta(z)| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - \varrho z) - f(x)|^p dx dz \\
&= \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} |\eta(z)| \|f \circ \tau_{-\varrho z} - f\|_{L^p}^p dz.
\end{aligned}$$

Im letzten Integral geht der Integrand punktweise gegen Null mit  $\varrho \rightarrow 0$  nach Lemma 11.1(ii). Außerdem gilt die Abschätzung

$$|\eta(z)| \|f \circ \tau_{-\varrho z} - f\|_{L^p}^p \leq 2^p \|f\|_{L^p}^p |\eta(z)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Also konvergiert das Integral gegen Null nach dem Satz über majorisierte Konvergenz.  $\square$

Die Approximation ist besonders nützlich, wenn die Funktion  $\eta$  glatt gewählt wird. Wir erinnern an die Multiindexnotation für Ableitungen von Funktionen im  $\mathbb{R}^n$ , und zwar setzt man für  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n \quad \text{und} \quad D^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}.$$

**Satz 11.3 (Glättung)** Sei  $\eta \in C^k(\mathbb{R}^n)$  mit  $\|D^\alpha \eta\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \leq K$  für  $|\alpha| \leq k$ . Für  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  ist dann  $f * \eta \in C^k(\mathbb{R}^n)$  und es gilt

$$D^\alpha(f * \eta) = f * (D^\alpha \eta), \quad \text{insbesondere} \quad \|D^\alpha(f * \eta)\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \leq K \|f\|_{L^1}.$$

BEWEIS: Nach der Substitution  $z = x - y$  haben wir

$$(f * \eta)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} F(x, z) dz \quad \text{mit} \quad F(x, z) = f(z) \eta(x - z).$$

Im Fall  $k = 0$  gilt  $F(x, \cdot) \in L^1(\mathbb{R}^n)$  für alle  $x \in \mathbb{R}^n$ , die Funktion  $F(\cdot, z)$  ist stetig für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alles  $z \in \mathbb{R}^n$  und wir haben die Abschätzung

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |F(x, z)| \leq K |f(z)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Also ist  $\eta * f$  stetig nach Satz 6.5 und es gilt  $\|f * \eta\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \leq K \|f\|_{L^1}$ . Im Fall  $k = 1$  gilt  $F(\cdot, z) \in C^1(\mathbb{R}^n)$  für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alles  $z \in \mathbb{R}^n$  sowie

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial F}{\partial x_j}(x, z) \right| \leq K |f(z)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Aus Folgerung 6.1 folgt  $f * \eta \in C^1(\mathbb{R}^n)$  und  $\partial_j(f * \eta) = \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \partial_j \eta(x - z) dz = (f * \partial_j \eta)(x)$ , insbesondere gilt die Abschätzung  $\|\partial_j(f * \eta)\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \leq K \|f\|_{L^1}$ . Die Aussage für eine Ableitung  $D^\alpha$  mit Ordnung  $|\alpha| \leq k$  ergibt sich in offensichtlicher Weise durch Induktion.  $\square$

Wir können jetzt das Dichteresultat aus Satz 6.10 verschärfen.

**Satz 11.4 (Dichtheit von  $C_c^\infty(\Omega)$  in  $L^p(\Omega)$ )** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $1 \leq p < \infty$ . Dann gibt es zu  $f \in L^p(\Omega)$  eine Folge  $f_k \in C_c^\infty(\Omega)$  mit  $\|f - f_k\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$ .

BEWEIS: Wegen Satz 6.10 können wir  $f \in C_c^0(\Omega)$  annehmen. Wähle  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  mit  $\eta \geq 0$ ,  $\int \eta(z) dz = 1$  und  $\text{spt } \eta \subset B_1(0)$ . Mit  $\eta_\varrho(x) = \varrho^{-n} \eta(x/\varrho)$  gilt dann  $f * \eta_\varrho \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  nach Satz 11.3 und  $f * \eta_\varrho \rightarrow f$  in  $L^p(\mathbb{R}^n)$  nach Satz 11.2. Weiter gilt für  $x \in \mathbb{R}^n$  mit  $\text{dist}(x, \text{spt } f) > \varrho$

$$(f * \eta_\varrho)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \eta_\varrho(y) dy = 0,$$

denn für  $|y| \geq \varrho$  ist  $\eta_\varrho(y) = \varrho^{-n} \eta(y/\varrho) = 0$  und für  $|y| \leq \varrho$  ist  $f(x-y) = 0$ . Also folgt

$$(11.2) \quad \text{spt}(f * \eta_\varrho) \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, \text{spt } f) \leq \varrho\},$$

das heißt  $f * \eta_\varrho \in C_c^\infty(\Omega)$  für  $\varrho > 0$  hinreichend klein, womit der Satz bewiesen ist.  $\square$

Das folgende Ergebnis verallgemeinert Lemma 8.2. Es ist dabei sinnvoll, die Aussage mit lokal integrierbaren Funktionen zu formulieren.

**Definition 11.1** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und  $1 \leq p \leq \infty$ . Die messbare Funktion  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  liegt in  $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$ , falls  $\chi_K f \in L^p(\Omega)$  ist für alle kompakten Mengen  $K \subset \Omega$ .

**Satz 11.5 (Fundamentallemma der Variationsrechnung)** Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen. Für die Funktion  $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$  gelte

$$\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \geq 0 \quad \text{für alle } \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \text{ mit } \varphi \geq 0.$$

Dann folgt  $f(x) \geq 0$  für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alles  $x \in \Omega$ .

BEWEIS: Zu zeigen ist, dass  $E = \{x \in \Omega : f(x) < 0\}$  eine Nullmenge ist. Nach Satz 4.3 gilt

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \subset E \text{ kompakt}\}.$$

Sei  $K \subset E$  kompakt und  $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  mit  $\eta \geq 0$ ,  $\text{spt } \eta \subset \overline{B_1(0)}$  und  $\int \eta(z) dz = 1$ . Dann folgt  $\eta_\varrho * \chi_K \rightarrow \chi_K$  in  $L^1(\mathbb{R}^n)$ , insbesondere  $\eta_{\varrho_i} * \chi_K \rightarrow \chi_K$  punktweise  $\mathcal{L}^n$ -fast-überall für eine Teilfolge nach Folgerung 6.2. Wegen  $|\eta_{\varrho_i} * \chi_K| \leq 1$  liefert der Konvergenzsatz von Lebesgue

$$0 \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \int f(x) (\eta_{\varrho_i} * \chi_K)(x) dx = \int f(x) \chi_K(x) dx.$$

Aber  $f < 0$  auf  $K$ , also  $\mathcal{L}^n(K) = 0$  nach Folgerung 5.3 und damit  $\mathcal{L}^n(\{f < 0\}) = 0$ .  $\square$

Faltungen mit singulären Integralkernen spielen bei partiellen Differentialgleichungen eine große Rolle. Ein prominentes Beispiel ist das Newtonpotential.

**Beispiel 11.1 (Newtonpotential)** Sei  $G \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ . Für eine Funktion  $f \in L^\infty(\Omega)$ , mit  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und beschränkt, betrachten wir die Faltung

$$u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, u(x) = \int_{\Omega} G(x-y) f(y) dy.$$

Es ist  $u = G * f$ , wobei  $f$  durch Null auf  $\mathbb{R}^n$  fortgesetzt wird. Es gelte zunächst

$$(11.3) \quad |G(z)| \leq C |z|^{-p} \quad \text{für ein } p < n,$$

das heißt  $u(x)$  ist für alle  $x \in \mathbb{R}^n$  definiert nach Beispiel 5.5. Um zu zeigen, dass  $u$  stetig ist, wählen wir  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  mit  $\varphi(z) = 0$  für  $|z| \leq 1/2$ ,  $\varphi(z) = 1$  für  $|z| \geq 1$  und  $|D^k \varphi| \leq C_k$ , und definieren den abgeschnittenen Kern

$$G_\varepsilon = \varphi_\varepsilon G \quad \text{mit } \varphi_\varepsilon(z) = \varphi\left(\frac{z}{\varepsilon}\right).$$

Aus (11.3) folgt die Abschätzung

$$(11.4) \quad |G(z) - G_\varepsilon(z)| \leq C \chi_{B_\varepsilon(0)} |z|^{-p}.$$

Die Funktion  $u_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u_\varepsilon(x) = \int_\Omega G_\varepsilon(x-y) f(y) dy$ , ist glatt, und es folgt

$$|u(x) - u_\varepsilon(x)| \leq C \int_{B_\varepsilon(x)} |x-y|^{-p} |f(y)| dy \leq \frac{C}{n-p} \|f\|_{L^\infty} \varepsilon^{n-p} \rightarrow 0.$$

Somit ist  $u$  stetig als gleichmäßiger Grenzwert der  $u_\varepsilon$ . Nun gelte zusätzlich

$$(11.5) \quad |DG(z)| \leq C |z|^{-p-1} \quad \text{für ein } p < n-1.$$

Dann folgt wegen  $(D\varphi_\varepsilon)(z) = \frac{1}{\varepsilon} D\varphi(\frac{z}{\varepsilon})$

$$(11.6) \quad |DG(z) - DG_\varepsilon(z)| \leq C \chi_{B_\varepsilon(0)} \left( |z|^{-p-1} + \frac{1}{\varepsilon} |z|^{-p} \right) \leq C \chi_{B_\varepsilon(0)} |z|^{-p-1}.$$

Mit  $v_j(x) = \int_\Omega (\partial_j G)(x-y) f(y) dy$  ergibt sich

$$\begin{aligned} |v_j(x) - \partial_j u_\varepsilon(x)| &\leq \int_\Omega |(\partial_j G)(x-y) - (\partial_j G_\varepsilon)(x-y)| |f(y)| dy \\ &\leq \frac{C}{n-p-1} \|f\|_{L^\infty} \varepsilon^{n-p-1} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Also konvergiert  $\partial_j u_\varepsilon$  gleichmäßig auf  $\mathbb{R}^n$  gegen  $v_j$ , und es folgt  $\partial_j u = v_j \in C^0(\mathbb{R}^n)$ . Wir spezialisieren jetzt auf das Newtonpotential

$$G(z) = \begin{cases} \frac{|z|^{2-n}}{(2-n)\omega_{n-1}} & \text{für } n \geq 3, \\ \frac{1}{2\pi} \log |z| & \text{für } n = 2. \end{cases}$$

Im Fall  $n \geq 3$  sind (11.3) und (11.5) mit  $p = n-2$  erfüllt, im Fall  $n = 2$  gilt (11.3) für jedes  $p > 0$  und (11.5) für  $p = 0$ . Somit ist das Newtonpotential von  $f$  in  $C^1(\mathbb{R}^n)$ , und

$$\partial_j u(x) = \int_\Omega H(x-y) f(y) dy \quad \text{mit } H(z) = \partial_j G(z) = \frac{1}{\omega_{n-1}} \frac{z_j}{|z|^n}.$$

Auf  $\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}$  kann weiter unter dem Integral differenziert werden, also ist  $u$  auf  $\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}$  glatt und

$$\Delta u(x) = \int_\Omega (\Delta G)(x-y) f(y) dy = 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}.$$

Im Innern von  $\Omega$  kann aber wegen der Singularität so nicht argumentiert werden. Das Ergebnis wäre sogar falsch, denn  $u$  ist nicht harmonisch auf  $\Omega$ , sondern löst dort die Poissonsgleichung  $\Delta u = f$ , was wir nun zeigen wollen. Wie oben approximieren wir  $\partial_j u = v_j$  durch

$$v_{j,\varepsilon} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_{j,\varepsilon}(x) = \int_\Omega H_\varepsilon(x-y) f(y) dy, \quad \text{wobei } H_\varepsilon = \varphi_\varepsilon H.$$

Da (11.3) für  $H$  mit  $p = n - 1$  erfüllt ist, konvergiert  $v_{j,\varepsilon}$  gleichmäßig auf  $\mathbb{R}^n$  gegen  $v_j = \partial_j u$ . Das Problem ist nun, dass die Ungleichung in (11.5) nur mit  $p = n - 1$  richtig ist, das heißt wir haben nur die Abschätzung

$$(11.7) \quad |DH(z) - DH_\varepsilon(z)| \leq C\chi_{B_\varepsilon(0)} \left( |z|^{-n} + \frac{1}{\varepsilon} |z|^{1-n} \right) \leq C\chi_{B_\varepsilon(0)} |z|^{-n}.$$

Um die fehlende Integrierbarkeit zu kompensieren, setzen wir zusätzlich voraus, dass  $f$  Hölderstetig mit einem Exponenten  $\alpha \in (0, 1]$  ist, also

$$(11.8) \quad [f]_\alpha := \sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty.$$

Sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  offen und beschränkt mit  $C^1$ -Rand, so dass  $\Omega \subset\subset U$ , und  $x \in \Omega$ . Dann gilt, wobei im letzten Schritt der Satz von Gauß auf das Vektorfeld  $y \mapsto H_\varepsilon(x - y)e_i$  angewandt wird,

$$\begin{aligned} \partial_i v_{j,\varepsilon}(x) &= \int_{\Omega} (\partial_i H_\varepsilon)(x - y) f(y) dy \\ &= \int_U (\partial_i H_\varepsilon)(x - y) (f(y) - f(x)) dy + f(x) \int_U (\partial_i H_\varepsilon)(x - y) dy \\ &= \int_U (\partial_i H_\varepsilon)(x - y) (f(y) - f(x)) dy - f(x) \int_{\partial U} H_\varepsilon(x - y) \langle \nu(y), e_i \rangle d\mu(y). \end{aligned}$$

Nun ist  $H = \partial_j G$ , und  $H_\varepsilon(x - y) = \partial_j G(x - y)$  für  $y \in \partial U$  und  $\varepsilon > 0$  klein. Setze

$$w_{ij}(x) = \int_U (\partial_{ij}^2 G)(x - y) (f(y) - f(x)) dy - f(x) \int_{\partial U} (\partial_j G)(x - y) \langle \nu(y), e_i \rangle d\mu(y).$$

Die  $\partial_i v_{j,\varepsilon}$  konvergieren gleichmäßig auf  $\Omega$  gegen  $w_{ij}$ , denn aus (11.7) und (11.8) folgt

$$\begin{aligned} |w_{ij}(x) - \partial_i v_{j,\varepsilon}(x)| &\leq \int_U |\partial_i H(x - y) - \partial_i H_\varepsilon(x - y)| |f(y) - f(x)| dy \\ &\leq \frac{C}{\alpha} [f]_\alpha \varepsilon^\alpha \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Somit gilt  $\partial_{ij}^2 u = w_{ij} \in C^0(\Omega)$ . Insbesondere folgt, da  $\Delta G = 0$  auf  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,

$$\begin{aligned} \Delta u(x) &= -f(x) \int_{\partial U} \langle DG(x - y), \nu(y) \rangle d\mu(y) \\ &= -f(x) \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \langle DG(x - y), \nu(y) \rangle d\mu(y) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Damit ist die Poisson-Gleichung  $\Delta u = f$  in  $\Omega$  verifiziert. Es gibt stetige Funktionen  $f$ , für die keine zweimal differenzierbare Lösung der Gleichung  $\Delta u = f$  existiert, die Voraussetzung der Hölderstetigkeit ist also nicht überflüssig.

Wir kommen zum Abschluss der Vorlesung zur Fourierintegraldarstellung, die wir zuerst heuristisch als kontinuierlichen Grenzwert der Entwicklung in eine Fourierreihe herleiten. Sei  $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  und  $N > 0$  so groß, dass  $\text{spt } f \subset (-N\pi, N\pi)$ . Die normierten Basisfunktionen mit Periode  $2\pi N$  lauten

$$w_k^N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} e^{i \frac{k}{N} x} \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}.$$

Nach Satz 6.12 wird die Funktion  $f$  auf  $(-N\pi, N\pi)$  durch ihre Fourierreihe dargestellt, das heißt für jedes  $x \in (-N\pi, N\pi)$  gilt

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi N} e^{i\frac{k}{N}x} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-i\frac{k}{N}y} dy =: \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(\frac{k}{N}\right) \frac{1}{N},$$

wobei

$$F(p) = \frac{1}{2\pi} e^{ipx} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-ipy} dy.$$

Falls nun  $F(p)$  für  $p \rightarrow \pm\infty$  hinreichend schnell gegen Null geht, sollte die Riemannsche Summe  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(\frac{k}{N}\right) \frac{1}{N}$  für  $N \rightarrow \infty$  gegen das Integral  $\int_{\mathbb{R}} F(p) dp$  konvergieren. Dies motiviert für  $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  die Darstellung

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(p) e^{ipx} dp \quad \text{mit} \quad \hat{f}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-ipy} dy.$$

Der geschilderte Ansatz kann zu einem vollen Beweis ausgebaut werden, wir gehen aber anders vor. Alle im Folgenden auftretenden Funktionen sind  $\mathbb{C}$ -wertig.

**Definition 11.2** Die Fouriertransformierte von  $f \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  ist die Funktion

$$\hat{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{f}(p) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\langle p, x \rangle} dx.$$

Die inverse Fouriertransformierte von  $g \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  ist

$$\check{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}, \quad \check{g}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} g(p) e^{i\langle p, x \rangle} dp.$$

Bevor wir die Frage angehen, inwiefern diese beiden Transformationen invers sind, notieren wir einige wichtige Eigenschaften.

**Satz 11.6 (Fouriertransformation auf  $L^1$ )** Für  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  gilt:

- (1)  $\hat{f} \in C^0(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  und  $\|\hat{f}\|_{C^0(\mathbb{R}^n)} \leq (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \|f\|_{L^1}$ .
- (2)  $\widehat{f * g} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \hat{f} \hat{g}$ .
- (3)  $\langle \hat{f}, g \rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \langle f, \check{g} \rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ .

BEWEIS: Für  $F(p, x) = f(x) e^{-i\langle p, x \rangle}$  ist  $F(p, \cdot) \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  für alle  $p \in \mathbb{R}^n$  sowie  $F(\cdot, x) \in C^0(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alles  $x \in \mathbb{R}^n$ , und es gilt

$$\sup_{p \in \mathbb{R}^n} |F(p, x)| = |f(x)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Also folgt die Stetigkeit von  $\hat{f}$  aus der entsprechenden Aussage für Parameterintegrale, Satz 6.5. Die Abschätzung in (1) ist offensichtlich. Für (2) berechnen wir mit Fubini

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(p) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x-y) dy e^{-i\langle p, x \rangle} dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-i\langle p, y \rangle} \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y) e^{-i\langle p, x-y \rangle} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-i\langle p, y \rangle} \hat{g}(p) dy \\ &= (2\pi)^{\frac{n}{2}} \hat{f}(p) \hat{g}(p). \end{aligned}$$

Auch (3) folgt aus dem Satz von Fubini, und zwar gilt

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(p) \overline{g(p)} dp &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\langle p, x \rangle} dx \overline{g(p)} dp \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\int_{\mathbb{R}^n} g(p) e^{i\langle p, x \rangle} dp} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\check{g}(x)} dx.\end{aligned}$$

□

Wir berechnen nun zwei Beispiele – das erste werden wir im Beweis von Satz 11.7 verwenden.

**Beispiel 11.2** Für die Gaußfunktion

$$G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad G(x) = e^{-|x|^2/2},$$

gilt  $\hat{G} = G = \check{G}$ . Um dies zunächst für  $n = 1$  zu zeigen, berechnen wir mit Differentiation unter dem Integral und partieller Integration

$$\begin{aligned}\frac{d}{dp} \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-ixp} dx &= \int_{\mathbb{R}} (-ix) e^{-x^2/2} e^{-ixp} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left( \frac{d}{dx} e^{-x^2/2} \right) i e^{-ixp} dx \\ &= (-p) \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-ixp} dx,\end{aligned}$$

das heißt  $(e^{p^2/2} \hat{G}(p))' \equiv 0$ . Aber nach Beispiel 8.2 gilt

$$\hat{G}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = 1,$$

also folgt  $\hat{G} = G$ . Für  $n$  beliebig folgt mit Fubini für  $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$  induktiv

$$\hat{G}(p) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-|x'|^2/2 - i\langle x', p' \rangle} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x_n)^2/2 - ix_n p_n} dx_n dx' = e^{-|p'|^2/2} e^{-(p_n)^2/2} = G(p).$$

Schließlich ergibt sich  $\check{G}(x) = \hat{G}(-x) = G(x)$  wie behauptet.

**Beispiel 11.3** Für  $a > 0$  gilt

$$\widehat{\chi_{[-a, a]}}(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(pa)}{p} & \text{für } p \neq 0 \\ \sqrt{\frac{2}{\pi}} a & \text{für } p = 0. \end{cases}$$

Das zweite Beispiel zeigt, dass die Fouriertransformierte einer  $L^1$ -Funktion im allgemeinen nicht wieder in  $L^1$  liegt. Aufgrund dieser Asymmetrie kann das Problem der Fourierintegraldarstellung im  $L^1$ -Kontext nicht befriedigend behandelt werden. Der richtige Raum ist  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ , denn bezüglich der  $L^2$ -Norm ist die Fouriertransformation sogar isometrisch.

**Satz 11.7 (Plancherel)** Für  $f \in (L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  gilt  $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|\check{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ .

BEWEIS: Es reicht die Aussage für  $\hat{f}$  zu beweisen, da  $\check{f}(x) = \hat{f}(-x)$ . Sei  $G(z) = e^{-|z|^2/2}$  und  $G_\varrho(z) = \varrho^{-n} G\left(\frac{z}{\varrho}\right)$  für  $\varrho > 0$ . Dann folgt aus Beispiel 11.2

$$\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} G(\varrho p) e^{-i\langle p, z \rangle} dp = \frac{\varrho^{-n}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} G(q) e^{-i\langle q, \frac{z}{\varrho} \rangle} dq = \varrho^{-n} \hat{G}\left(\frac{z}{\varrho}\right) = G_\varrho(z).$$

Wir berechnen nun mit dem Satz über monotone Konvergenz und dem Satz von Fubini

$$\begin{aligned} \|\hat{f}\|_{L^2}^2 &= \lim_{\varrho \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(p)|^2 G(\varrho p) dp \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \lim_{\varrho \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{f(y)} e^{-i\langle p, x-y \rangle} dy dx G(\varrho p) dp \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \lim_{\varrho \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} G(\varrho p) e^{-i\langle p, x-y \rangle} dp f(x) \overline{f(y)} dy dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \lim_{\varrho \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{f(y)} G_\varrho(x-y) dy dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \lim_{\varrho \searrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\bar{f} * G_\varrho)(x) dx. \end{aligned}$$

Aus Beispiel 8.2 folgt mit Fubini  $\int_{\mathbb{R}^n} G(z) dz = (2\pi)^{\frac{n}{2}}$ . Aber nach Satz 11.2 konvergiert dann  $(2\pi)^{-n/2} \bar{f} * G_\varrho$  gegen  $\bar{f}$  in  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ , und es folgt  $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ .  $\square$

Der Satz von Plancherel erlaubt es, die Fouriertransformation auf den Raum  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  fortzusetzen, obwohl das in der Definition gegebene Integral nicht notwendig konvergiert.

**Satz 11.8 (Fouriertransformation auf  $L^2$ )** Es gibt eindeutig bestimmte Abbildungen  $\mathcal{F}, \mathcal{F}^* : L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  mit folgenden Eigenschaften:

- (1)  $\mathcal{F}f = \hat{f}$  und  $\mathcal{F}^*f = \check{f}$  für alle  $f \in (L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ ,
- (2)  $\|\mathcal{F}f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2} = \|\mathcal{F}^*f\|_{L^2}$  für alle  $f \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ .

Weiter gelten für  $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  folgende Aussagen:

- (3)  $\langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g \rangle_{L^2} = \langle f, g \rangle_{L^2} = \langle \mathcal{F}^*f, \mathcal{F}^*g \rangle_{L^2}$ .
- (4)  $\langle \mathcal{F}f, g \rangle_{L^2} = \langle f, \mathcal{F}^*g \rangle_{L^2}$ .
- (5)  $\mathcal{F}^*\mathcal{F} = \mathcal{F}\mathcal{F}^* = \text{Id}_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ .

BEWEIS: Der Raum  $(L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  ist dicht in  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ , denn für  $f \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  ist  $\chi_{B_R(0)}f \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  nach Cauchy-Schwarz, und es gilt  $\chi_{B_R(0)}f \rightarrow f$  in  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  mit  $R \rightarrow \infty$ . Die Eindeutigkeit und Existenz der Abbildungen  $\mathcal{F}$  bzw.  $\mathcal{F}^*$  mit (1) und (2) folgt damit leicht aus Satz 11.7. In dem komplexen Skalarproduktraum  $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  gilt die Polarisationsformel

$$\langle f, g \rangle_{L^2} = \frac{1}{4} (\|f + g\|_{L^2}^2 - \|f - g\|_{L^2}^2 + i\|f + ig\|_{L^2}^2 - i\|f - ig\|_{L^2}^2).$$

Also folgt (3) aus (2). Da in (4) beide Seiten stetig bzgl. der  $L^2$ -Norm sind, folgt die Aussage aus Satz 11.6(3) durch Approximation. Schließlich ergibt sich aus (4) und (3)

$$\langle \mathcal{F}^* \mathcal{F} f, g \rangle_{L^2} = \langle \mathcal{F} f, \mathcal{F} g \rangle_{L^2} = \langle f, g \rangle_{L^2},$$

also  $\mathcal{F}^* \mathcal{F} f = f$ . Die Gleichung  $\mathcal{F} \mathcal{F}^* f = f$  folgt analog.  $\square$

Im folgenden schreiben wir  $\hat{f}$  bzw.  $\check{g}$  auch dann, wenn  $f, g$  nur in  $L^2(\mathbb{R}^n)$  liegen. Die Fouriertransformation spielt eine wichtige Rolle in der Theorie linearer partieller Differentialgleichungen. Dies basiert vor allem darauf, dass Ableitungsoperatoren in Multiplikationsoperatoren transformiert werden. Es ist oft praktisch, dabei im sogenannten Raum der schnell fallenden Funktionen oder Schwartz-Raum zu operieren:

$$(11.9) \quad \mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}) : x^\alpha D^\beta f \text{ ist beschränkt für alle } \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n\}$$

Wie üblich ist hier  $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$  und  $D^\beta = \partial_1^{\beta_1} \cdots \partial_n^{\beta_n}$ . Für  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  gilt

$$|f(x)| \leq C_N (1 + |x|^2)^{-N/2} \quad \text{für jedes } N \in \mathbb{N},$$

insbesondere ist  $f \in L^p(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  für alle  $p \in [1, \infty]$ . Außerdem sind mit  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  auch  $\partial_j f$  und  $x_j f$  in  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  für  $1 \leq j \leq n$ . Im Gegensatz zum Raum  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  ist der Schwartz-Raum  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  invariant unter der Fouriertransformation, wie wir jetzt zeigen.

**Satz 11.9 (Fouriertransformation auf  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$ )** *Mit  $f$  ist auch  $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$  und*

- (1)  $\widehat{\partial_j f}(p) = i p_j \hat{f}(p) \quad \text{sowie} \quad \widehat{x_j f}(p) = i \partial_j \hat{f}(p).$
- (2)  $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(p) e^{i\langle p, x \rangle} dp \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$

BEWEIS: Die Funktion  $\hat{f}$  ist beschränkt nach Satz 11.6(1). Wir berechnen mit partieller Integration, siehe Satz 7.3,

$$\widehat{\partial_j f}(p) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_j f)(x) e^{-i\langle p, x \rangle} dx = -\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{\partial}{\partial x_j} e^{-i\langle p, x \rangle} dx = i p_j \hat{f}(p).$$

Weiter folgt durch Herausziehen der Ableitung aus dem Integral

$$\widehat{x_j f}(p) = \frac{i}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{\partial}{\partial p_j} e^{-i\langle p, x \rangle} dx = \frac{i}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \frac{\partial}{\partial p_j} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\langle p, x \rangle} dx = i \partial_j \hat{f}(p).$$

Insbesondere sind auch die Funktionen  $p_j \hat{f}$  und  $\partial_j \hat{f}$  beschränkt, wieder nach Satz 11.6(1). Durch Induktion über  $|\alpha| + |\beta|$  verifiziert man leicht die allgemeine Formel

$$\widehat{D^\alpha x^\beta f} = i^{|\alpha|+|\beta|} p^\alpha D^\beta \hat{f},$$

und erhält  $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ . Aus Satz 11.8 folgt Behauptung (2) zunächst für  $\mathcal{L}^n$ -fast-alles  $x \in \mathbb{R}^n$ , wegen der Stetigkeit beider Seiten also sogar für alle  $x \in \mathbb{R}^n$ . Damit ist der Satz bewiesen.  $\square$

Wir wollen zum Schluss des Kapitels noch zwei Anwendungen auf die Lösung von linearen partiellen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten behandeln. Typischerweise wird dabei zunächst mit einem Fourieransatz eine Lösungsformel ermittelt, wobei die Eigenschaften der Fouriertransformation formal angewandt werden. In einem zweiten Schritt wird dann geprüft, unter welchen Voraussetzungen an die Daten die Formel eine gültige Lösung liefert. Dieser Punkt kann technisch anspruchsvoll sein – je nach Gleichung – und wird hier nur angedeutet.



**Beispiel 11.4** Betrachte das Anfangswertproblem für die Wärmeleitungsgleichung im  $\mathbb{R}^n$ :

$$\begin{aligned}\partial_t u - \Delta u &= 0 & \text{auf } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(\cdot, 0) &= f & \text{auf } \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

Wir bilden die Fouriertransformierte  $\widehat{u}(\cdot, t) = \widehat{u(\cdot, t)}$  bezüglich der räumlichen Variablen. Mit Satz 11.9 erhalten wir für  $\widehat{u}$  das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned}0 = \widehat{\partial_t u} - \widehat{\Delta u} &= \partial_t \widehat{u} + |p|^2 \widehat{u} & \text{auf } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ \widehat{f} &= \widehat{u}(0, \cdot) & \text{auf } \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

Es folgt  $\widehat{u}(p, t) = \widehat{f}(p) e^{-t|p|^2}$ . Aber nach Beispiel 11.2 gilt für  $G_{\sqrt{2t}}(x) = (2t)^{-\frac{n}{2}} G\left(\frac{x}{\sqrt{2t}}\right)$

$$\widehat{G_{\sqrt{2t}}}(p) = \widehat{G}(\sqrt{2t} p) = G(\sqrt{2t} p) = e^{-t|p|^2}.$$

Aus Satz 11.6(2) folgt nun  $u = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} f * G_{\sqrt{2t}}$ , das heißt

$$u(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} f(y) dy.$$

Es ist leicht zu sehen, dass die Formel für beschränkte und stetige Anfangsdaten  $f$  eine Lösung  $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty)) \cap C^0(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$  des Anfangswertproblems liefert.

**Beispiel 11.5** Als zweites betrachten wir das Anfangswertproblem für die Wellengleichung:

$$\begin{aligned}\partial_t^2 u - \Delta u &= 0 & \text{auf } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(\cdot, 0) &= f & \text{auf } \mathbb{R}^n, \\ \partial_t u(\cdot, 0) &= g & \text{auf } \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

Wir führen den analogen Fourieransatz durch und erhalten das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned}0 = \widehat{\partial_t^2 u} - \widehat{\Delta u} &= \partial_t^2 \widehat{u} + |p|^2 \widehat{u} & \text{auf } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ \widehat{f} &= \widehat{u}(0, \cdot) & \text{auf } \mathbb{R}^n, \\ \widehat{g} &= \partial_t \widehat{u}(0, \cdot).\end{aligned}$$

Es folgt diesmal für die Fouriertransformierte

$$\widehat{u}(p, t) = \widehat{f}(p) \cos t|p| + \widehat{g}(p) \frac{\sin t|p|}{|p|}.$$

Angenommen, es gibt eine Funktion  $R : \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\widehat{R} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \frac{\sin(t|p|)}{|p|}$ . Dann liefert formale Anwendung von Satz 11.6(2)

$$\begin{aligned}\widehat{R * g} &= (2\pi)^{\frac{n}{2}} \widehat{R} \widehat{g} = \widehat{g}(p) \frac{\sin t|p|}{|p|}, \\ \partial_t (\widehat{R * f}) &= \partial_t (\widehat{R * f}) = \partial_t \left( \widehat{f}(p) \frac{\sin(t|p|)}{|p|} \right) = \widehat{f}(p) \cos(t|p|).\end{aligned}$$

Die Lösung des Anfangswertproblems wäre dann  $u = \partial_t(R * f) + R * g$ . Für  $n = 1$  können wir  $R = \frac{1}{2} \chi_{[-t,t]}$  wählen nach Beispiel 11.3 und erhalten

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left( f(x+t) + f(x-t) + \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy \right).$$

Dies liefert eine gültige Lösung  $u \in C^2(\mathbb{R} \times (0, \infty)) \cap C^1(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ , falls  $f \in C^2(\mathbb{R})$  und  $g \in C^1(\mathbb{R})$ . Für  $n = 2$  behaupten wir

$$R(x, t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\chi_{B_t(0)}}{\sqrt{t^2 - |x|^2}}.$$

Denn mit Fubini folgt, zunächst für  $p = (0, |p|) \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} 2\pi \hat{R}(p, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\{|x| < t\}} \frac{e^{-i\langle p, x \rangle}}{\sqrt{t^2 - |x|^2}} dx \\ &= \frac{t}{2\pi} \int_{\{|y| < 1\}} \frac{e^{-i\langle tp, y \rangle}}{\sqrt{1 - |y|^2}} dy \\ &= \frac{t}{2\pi} \int_{-1}^1 e^{-it|p|y_2} \int_{-\sqrt{1-y_2^2}}^{\sqrt{1-y_2^2}} \frac{1}{\sqrt{1 - y_2^2 - y_1^2}} dy_1 dy_2 \\ &= \frac{t}{2\pi} \int_{-1}^1 e^{-it|p|y_2} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - \eta^2}} d\eta dy_2 \\ &= \frac{t}{2} \int_{-1}^1 e^{-it|p|y_2} dy_2 \\ &= \frac{\sin |p|t}{|p|}. \end{aligned}$$

Dann gilt aber  $\hat{R}(p, t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin |p|t}{|p|}$  für alle  $p \neq 0$ , da beide Seiten invariant unter Drehungen sind. Wir haben also für  $n = 2$  die Formel

$$u(t, x) = \partial_t \left( \frac{t}{2\pi} \int_{\{|y| < 1\}} \frac{f(x - ty)}{\sqrt{1 - |y|^2}} dy \right) + \frac{t}{2\pi} \int_{\{|y| < 1\}} \frac{g(x - ty)}{\sqrt{1 - |y|^2}} dy.$$

Damit die Formel eine Lösung  $u \in C^2(\mathbb{R} \times (0, \infty)) \cap C^1(\mathbb{R} \times [0, \infty))$  definiert, müssen wir für  $n = 2$  mehr voraussetzen, nämlich  $g \in C^2(\mathbb{R}^n)$  und  $f \in C^3(\mathbb{R}^n)$ . Beachte auch, dass  $R(\cdot, t)$  für  $n = 2$  nicht mehr in  $L^2(\mathbb{R}^n)$  liegt. Für  $n \geq 3$  ist die Gleichung  $\hat{R}(p, t) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \frac{\sin |p|t}{|p|}$  gar nicht mehr durch eine Funktion lösbar; trotzdem kann mit dem Ansatz eine Lösung gefunden werden. Der zweite Schritt – die Rechtfertigung der Lösungsformel – ist für die Wellengleichung deutlich subtiler als für die Wärmeleitungsgleichung.

## 12 Anhang

**Satz 12.1 (Heine-Borel)** *Sei  $(X, d)$  metrischer Raum. Für  $M \subset X$  sind äquivalent:*

- (1)  *$M$  ist folgenkompakt: jede Folge  $x_k \in M$  hat einen Häufungspunkt  $x \in M$ .*
- (2)  *$M$  ist überdeckungskompakt: ist  $M \subset \bigcup_{i \in I} U_i$  mit  $U_i \subset X$  offen, so gibt es  $I' \subset I$  endlich mit  $M \subset \bigcup_{i \in I'} U_i$ .*

BEWEIS: Sei  $M$  überdeckungskompakt. Wäre  $M$  nicht folgenkompakt, so gibt es eine Folge  $x_k \in M$  mit folgender Eigenschaft: zu jedem  $x \in M$  gibt es eine offene Umgebung  $U_x$  mit  $x_k \notin U_x$  für hinreichend große  $k$ . Nach Voraussetzung wird  $M$  durch endlich viele Mengen  $U_{x_1}, \dots, U_{x_N}$  überdeckt, also folgt  $x_k \notin M$  für  $k$  groß, ein Widerspruch.

Sei nun umgekehrt  $M$  folgenkompakt, und  $\bigcup_{i \in I} U_i$  eine offene Überdeckung von  $M$ . Als erstes zeigen wir: es gibt ein  $\varrho > 0$ , so dass für alle  $x \in M$  ein  $i = i(x)$  existiert mit  $B_\varrho(x) \subset U_i$ . Andernfalls gibt es zu  $k \in \mathbb{N}$  ein  $x_k \in M$  mit  $B_{1/k}(x_k) \setminus U_i \neq \emptyset$  für alle  $i \in I$ . Nach Übergang zu einer Teilfolge gilt  $x_k \rightarrow x \in M$ . Aber  $x \in U_{i_0}$  für ein  $i_0 \in I$ , also  $B_{1/k}(x_k) \subset U_{i_0}$  für  $k$  hinreichend groß, Widerspruch.

Gäbe es nun keine endliche Teilüberdeckung, so finden wir induktiv  $x_1, x_2, \dots$  in  $M$  mit  $x_k \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} B_\varrho(x_i)$ . Es folgt  $d(x_k, x_i) \geq \varrho > 0$  für  $k > i$ , das heißt die Folge  $x_k$  besitzt keine konvergente Teilfolge, im Widerspruch zur Voraussetzung.  $\square$