

Psöriatik Artrit CASPAR Sınıflama Kriterleri

(CASPAR; **CL**ASSification criteria for **P**soriatic **AR**thritis)

Tanı; İnflamatuvar eklem değişikliğine (eklem, omurga veya entezal) ilaveten skorun >3 olması ile konur (sadece 1.a 2 puan olup diğer maddeler 1'er puandır)

1. Psöriyazis bulgusu (a.b.c 'den herhangi birisi):

- a. Halen mevcut psöriyazis (2 puan)
- b. Psöriyazis öyküsü
- c. Psöriyazis için 'aile' öyküsü

2. Psöriyatik tırnak distrofisi:

Muayenede tipik psöriyatik tırnak değişiklikleri; onikoliz yüksük tırnak, hiperkeratoz

3. RF negatifliği:

Romatoid faktörün tercihen ELISA ve nefelometrik yöntem ile laboratuvar referans değerlerine göre negatif bulunmasıdır

Daktilit (a veya b'den herhangi birisi):

- 4. a. Halen mevcut tüm parmakta şişlik
- b. Bir Romatolog tarafından kaydedilmiş tüm parmağın şişme/daktilit öyküsü

Eklem çevresinde yeni kemik oluşumu bulgusu:

- 5. Direkt grafide el veya ayak eklem kenarlarında (juktartiküler) yeni kemik oluşumunun bulunması (osteofitler hariç)

Referans: Classification Criteria for Psoriatic Arthritis Development of New Criteria From a Large International Study William Taylor, Dafna Gladman Arthritis & Rheumatism Vol. 54, No. 8, August 2006, pp 2665–2673 DOI 10.1002/art.21972

