

CI 3 : INGÉNIERIE NUMÉRIQUE & SIMULATION

CHAPITRE 1 – INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Savoir Méthodes des rectangles et des trapèzes pour le calcul approché d'une intégrale sur un segment.

Lors de la résolution de problèmes scientifiques, le calcul intégral est souvent nécessaire :

- en mathématiques, lors du calcul d'une intégrale définie ;
- en mécanique, lors du calcul de la vitesse et de l'accélération à partir de la position d'un solide ;
- lors d'activités expérimentales, lorsqu'on veut par exemple connaître l'intégrale d'un signal mesuré ;
- etc.

1	Description du problème	1
1.1	Approximation d'un calcul intégral	1
1.2	Traitement de mesures	2
1.3	Limites de la résolution numérique	3
1.4	Remarques préliminaires	3
2	Méthode des rectangles	3
2.1	Principe	3
2.2	Interprétation graphique	4
2.3	Implémentations	5
3	Méthode des trapèzes	5
3.1	Principe	5
3.2	Interprétation graphique	5
3.3	Implémentation	5
4	Calcul d'erreur	5
4.1	Sous titre 1	5

1 Description du problème

1.1 Approximation d'un calcul intégral

Problématique


Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ avec $a, b \in \mathbb{R}^2$ et $a < b$. On appelle $I \in \mathbb{R}$ l'intégrale définie. On la note :

$$I = \int_a^b f(x) \, dx$$

Comment calculer I sans connaître de primitive de f ?

Calcul de π

Parmi les méthodes permettant de calculer π , on peut chercher à calculer l'aire du cercle trigonométrique (de rayon 1). L'aire d'un cercle de rayon 1 vaut π . On s'intéresse ici à l'aire d'un quart de cercle. Il est nécessaire de modéliser le problème afin d'établir la fonction f .



En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle défini, on a : $x^2 + f(x)^2 = 1$. On a donc $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

L'aire d'un quart de disque est donc l'aire sous la courbe $f(x)$ quand x varie de 0 à 1 :

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

Ainsi une valeur approchée de l'intégrale peut permettre de calculer la valeur de π .

Exemple



Calcul intégral

Comment calculer l'intégrale suivante : $\int_0^1 \cos(x^2) dx$?

Exemple


1.2 Traitement de mesures

Lors de l'acquisition de signaux grâce à des capteurs, les signaux mesurés ne sont pas toujours exploitables. Pour avoir, par exemple, la valeur moyenne d'un signal il peut alors être nécessaire d'avoir recours à l'intégration numérique.



Enfin, pour avoir une idée de l'accélération d'un solide alors qu'il est seulement possible de mesurer une vitesse, l'intégration numérique peut s'avérer nécessaire.

Ainsi, sur la capsuleuse de bocaux seule la vitesse de la croix de Malte (et du maneton) sont possibles. Une intégration permet le calcul de l'accélération angulaire.



Mesures sur la capsuleuse de bocaux

1.3 Limites de la résolution numérique

Attention L'intégration numérique ne permet d'avoir qu'une valeur approchée de l'intégrale définie. Ainsi, il est nécessaire d'être conscient de l'approximation réalisée lors de tels calculs.

1.4 Remarques préliminaires

Les méthodes présentées s'appuient sur les formules de Newton – Cotes, elles-même reposant sur les formules de quadrature. Il s'agit de subdiviser l'intervalle de calcul, puis d'approximer la courbe par des fonction polynomiales sur ces intervalles. Les polynômes utilisés sont appelés polynômes de Lagrange. On appelle :

- méthode des rectangles, lorsque les polynômes d'interpolation sont de degrés 0,
- méthode des trapèzes, lorsque les polynômes d'interpolation sont de degrés 1,
- méthode de Simpson, lorsque les polynômes d'interpolation sont de degré 2 ou 3.

2 Méthode des rectangles

2.1 Principe

Dans cette méthode, la fonction à intégrer est interpolée par un polynôme de degré 0, à savoir une fonction constante. Géométriquement, l'aire sous la courbe est alors approximée par un rectangle. Plusieurs choix sont possibles.

Rectangle à gauche :

$$I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f(a)$$

Point milieu :

$$I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

Rectangle à droite :

$$I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f(b)$$

Définition

Remarque


Dans le but d'augmenter la précision du calcul, on utilise les propriétés de linéarité de l'intégrale afin de subdiviser l'intervalle $[a, b]$. Ainsi, si $[a, b]$ est divisé en n intervalles, on note $\varepsilon = \frac{b-a}{n}$ et on a :

$$I = \int_a^b f(x) = \int_a^{a+\varepsilon} f(x)dx + \int_{a+\varepsilon}^{a+2\varepsilon} f(x)dx + \dots + \int_{a+(n-1)\varepsilon}^b f(x)dx$$


On approxime alors chacune des intégrales par la méthode des rectangles.

2.2 Interprétation graphique


1 subdivision




Calcul intégral



Rectangle à gauche - $\pi \simeq 4$




Point milieu - $\pi \simeq 3,464...$




Rectangle à droite - $\pi \simeq 0$


5 subdivisions



Rectangle à gauche - $\pi \simeq 3,437...$



Point milieu - $\pi \simeq 3,037...$



Rectangle à droite - $\pi \simeq 2,637...$

Pour 100 subdivisions de l'intervalle, on a :

- dans le cas des rectangles à gauche : $\pi \simeq 3,160...$;
- dans le cas des points milieux : $\pi \simeq 3,137...$;
- dans le cas des rectangles à droite : $\pi \simeq 3,120...$

Remarque

On remarque l'existence d'une erreur dans le calcul intégral. Suivant les cas, le calcul permet de majorer ou de minorer la valeur de l'intégrale définie.

2.3 Implémentations

Calcul intégral

Soit une fonction `gen_f` qui prend comme argument un nombre réel et qui renvoie un réel. On fera l'hypothèse que `gen_f` est une fonction continue définie sur \mathbb{R} . On cherche à calculer l'intégrale de la fonction définie dans `gen_f` sur un intervalle donné avec un pas donné.

1. Définir la fonction `rectangle_gauche` qui permet d'intégrer une fonction par la méthode des rectangles, à gauche.
2. Définir la fonction `rectangle_droite` qui permet d'intégrer une fonction par la méthode des rectangles, à droite.
3. Définir la fonction `rectangle_milieu` qui permet d'intégrer une fonction par la méthode des rectangles en utilisant le point milieu.
4. Définir une fonction permettant de comparer les méthodes d'intégration. Elle devra permettre de calculer des intégrales pour différentes valeurs du pas.

Exemple

Calcul d'une valeur moyenne

On fournit un fichier texte brut contenant les mesures provenant d'un capteur.

1. Comment stocker les valeurs du fichier dans un tableau de nombres ?
2. Définir une fonction prenant comme argument un tableau et retournant la valeur moyenne du signal.
3. Définir une fonction permettant de retourner un tableau contenant une valeur moyenne par morceau.

Exemple

3 Méthode des trapèzes

3.1 Principe

3.2 Interprétation graphique

3.3 Implémentation

4 Calcul d'erreur

4.1 Sous titre 1

Références

- [1] Analyse numérique : Intagration numérique, INP Grenoble – Pagora. https://team.inria.fr/moise/files/2013/03/Cours_integration.pdf.