

## Zadanie 1

Niech  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$ ,  $B_1 = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $B_2 = (v_1, v_2, v_3)$ , gdzie  $u_1 = v_1 = (1, 0, 0)$ ,  $u_2 = v_2 = (1, 1, 0)$ ,  $u_3 = v_3 = (1, 1, 1)$  i  $B$  - baza standardowa (kanoniczna) w  $\mathbb{R}^3$ .

### 1.a)

Wyznacz macierz odwzorowania  $f$  w bazach standardowych;

$$f(1, 0, 0) = (1, 0, -1)$$

$$f(0, 1, 0) = (-1, 1, 0)$$

$$f(0, 0, 1) = (0, -1, 1)$$

$$M_f(B, B) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 1.b)

Wykorzystując tę macierz, znajdź obraz wektora  $v = (0, -1, -2)$ ;

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 1 + 0 \\ 0 - 1 + 2 \\ 0 + 0 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$
$$f(v) = (1, 1, -2)$$

### 1.c)

Wyznacz  $M_f(B_1, B_2)$ ;

Wyznamy obrazy wektorów z  $B_1$  i przedstawmy je przy pomocy bazy  $B_2$ .

$$f(u_1) = f(1, 0, 0) = (1, 0, -1) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1)$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 1 \\ \beta + \gamma = 0 \\ \gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -1 \end{cases}$$

$$f(u_2) = f(1, 1, 0) = (0, 1, -1) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1)$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 1 \\ \gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \\ \gamma = -1 \end{cases}$$

$$f(u_3) = f(1, 1, 1) = (0, 0, 0) = 0(1, 0, 0) + 0(1, 1, 0) + 0(1, 1, 1)$$

$$M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.d)

Wyznacz obraz wektora  $v$  wykorzystując nową macierz;

Wyznaczymy współrzędne wektora  $v$  w bazie  $B_1$ .

$$v = (0, -1, -2) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1)$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = -1 \\ \gamma = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -2 \end{cases}$$

$$v = (1, 1, -2)_{B_1}$$

$$f(v)_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1 + 0 \\ 1 + 2 + 0 \\ -1 - 1 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Zamieńmy z powrotem na bazę kanoniczną.

$$(0, 3, -2)_{B_2} = 0(1, 0, 0) + 3(1, 1, 0) - 2(1, 1, 1) = (1, 1, -2)$$

1.e)

Wyznacz jeszcze raz  $M_f(B_1, B_2)$  wykorzystując macierze przejścia.

Znamy  $M_f(B, B) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , musimy jeszcze wyznaczyć  $P_{B \rightarrow B_1}$  i  $P_{B_2 \rightarrow B}$ . Wtedy

$$M_f(B_1, B_2) = P_{B_2 \rightarrow B} \cdot M_f(B, B) \cdot P_{B \rightarrow B_1}$$

$P_{B \rightarrow B_1}$  to wektory z  $B_1$  zapisane w bazie kanonicznej  $B$  jako kolumny, czyli po prostu:

$$P_{B \rightarrow B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zauważmy, że  $B_1 = B_2$ , więc  $P_{B_2 \rightarrow B} = P_{B_1 \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B_1})^{-1}$ .

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[-w_3]{-w_2} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$P_{B_2 \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_f(B_1, B_2) = P_{B_2 \rightarrow B} \cdot M_f(B, B) \cdot P_{B \rightarrow B_1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

#### Zadanie 4

Wiedząc, że macierz endomorfizmu  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ma w bazach  $B_1 = (e_1, e_2) = ((1, 0), (1, 1))$ ,  $B_2 = (l_1, l_2) = ((1, 1), (0, -1))$ , postać  $M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ , sprawdź, czy  $f$  jest odwzorowaniem odwracalnym. Jeżeli tak, to wyznacz wzór na  $f^{-1}$ .

Odwzorowanie jest odwracalne jeśli macierz odwzorowania w dowolnych bazach jest odwracalna, czyli jej wyznacznik jest różny od zera.

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 2 = 1 \neq 0$$

Żeby wyznaczyć wzór potrzebujemy tego odwzorowania w bazie kanonicznej.

$$M_{f^{-1}}(B, B) = (M_f(B, B))^{-1}$$

$$M_f(B, B) = P_{B \rightarrow B_2} \cdot M_f(B_1, B_2) \cdot P_{B_1 \rightarrow B}$$

$$P_{B \rightarrow B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, P_{B_1 \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-w_2} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow P_{B_1 \rightarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_f(B, B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-3w_2} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot (-1)} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

$$M_{f^{-1}}(B, B) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$f^{-1}(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - 3y \\ -y \end{bmatrix} = (x - 3y, -y)$$

#### Zadanie 5

Niech  $V$  będzie przestrzenią wektorową nad ciałem  $\mathbb{R}$  i niech  $B = (e_1, e_2, e_3)$  będzie jej bazą. Udowodnij, że  $B' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ , gdzie  $e'_1 = e_1$ ,  $e'_2 = e_1 + e_2$ ,  $e'_3 = e_1 + e_2 + e_3$ , jest bazą

przestrzeni  $V$ , wyznacz  $P = P_{B \rightarrow B'}$  oraz współrzędne wektora  $x = e_1 - 2e_2 + 3e_3$  w bazie  $B'$ .

Sprawdźmy, czy  $e'_1 = (1, 0, 0)_B$ ,  $e'_2 = (1, 1, 0)_B$ ,  $e'_3 = (1, 1, 1)_B$  są liniowo niezależne.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Są liniowo niezależne i jest ich tyle samo co w  $B$ , więc  $B'$  również jest bazą  $V$ .

$P_{B \rightarrow B'}$  to wektory z  $B'$  zapisane w bazie  $B$  czyli ta sama macierz  $P_{B \rightarrow B'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

Wiemy, że  $[x]_B = P_{B \rightarrow B'} \cdot [x]_{B'}$ . Niech  $x = (a, b, c)_{B'}$ . Wtedy

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c = 3 \\ b = -2 - 3 = -5 \\ a = 1 + 5 - 3 = 3 \end{cases}$$

$$x = (3, -5, 3)_{B'}$$

## Zadanie 6

$P$  jest macierzą przejścia od pewnej bazy  $B_1$  do danej bazy  $B_2 = (v_1, v_2, v_3)$ ,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

### 6.a)

Wyznacz wektory bazy  $B_1$ .

Niech  $B_1 = (u_1, u_2, u_3)$ .

$$\begin{cases} v_1 = 2u_2 + u_3 \\ v_2 = -u_1 \\ v_3 = -u_2 - u_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = -v_2 \\ u_2 = v_1 + v_3 \\ u_3 = v_1 - 2(v_1 + v_3) = -v_1 - 2v_3 \end{cases}$$

### 6.b)

Wektor  $v$  ma w bazie  $B_1$  współrzędne  $[-2, 4, 2]^T$ . Znajdź współczynniki wektora  $v$  w bazie  $B_2$  (Wykorzystaj  $P$ !).

$$[v]_{B_2} = P_{B_2 \rightarrow B_1} \cdot [v]_{B_1} = (P_{B_1 \rightarrow B_2})^{-1} \cdot [v]_{B_1}$$

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2w_1} \\ \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \cdot (-1) &\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \\ [v]_{B_2} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### Zadanie 8

Niech  $A = M_f(B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  będzie macierzą odwzorowania liniowego  $f : U \rightarrow V$ ,  
a  $C = M_g(B_3, B_1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  macierzą odwzorowania  $g : V \rightarrow U$ .

#### 8.a)

Znajdź  $M_{f \circ g}(B_2, B_2)$ , jeżeli wiadomo, że  $B_1 = (u_1, u_2)$ ,  $B_2 = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $B_3 = (w_1, w_2, w_3)$ , gdzie  $w_1 = 2v_2 + v_3$ ,  $w_2 = -v_1$ ,  $w_3 = -v_2 - v_3$ .

Dostajemy wektor z  $V$  w bazie  $B_2$ , tłumaczymy go na  $B_3$ , wrzucamy do  $g$  i otrzymujemy odwzorowanie z  $U$  w bazie  $B_1$ , a potem wrzucamy do  $f$  i otrzymujemy odwzorowanie z  $V$  w bazie  $B_2$ .

$$M_{f \circ g}(B_2, B_2) = M_f(B_1, B_2) \cdot M_g(B_3, B_1) \cdot P_{B_3 \rightarrow B_2}$$

Wyznamy  $P_{B_3 \rightarrow B_2}$ . Są to wektory z  $B_2$  zapisane przy pomocy  $B_3$ .

$$\begin{cases} w_1 = 2v_2 + v_3 \\ w_2 = -v_1 \\ w_3 = -v_2 - v_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = -w_2 \\ v_2 = w_1 + w_3 \\ v_3 = -w_1 - 2w_3 \end{cases}$$

$$P_{B_3 \rightarrow B_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$M_{f \circ g}(B_2, B_2) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -9 \\ 2 & 7 & -10 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

#### 8.b)

Wyznacz  $\text{Ker } g$ .

$\text{Kerg} = \{v \in V : g(v) = \bar{0}\}$ . Niech  $v = (x, y, z)_{B_3}$ . Wtedy:

$$g(v) = \bar{0} \Leftrightarrow M_g(B_3, B_1) \cdot [v]_{B_3} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x - y + z \\ 2x + z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ z = -2x \end{cases}$$

$$v = x(1, -1, -2)_{B_3} = x(2v_2 + v_3 + v_1 + 2v_2 + 2v_3) = x(v_1 + 4v_2 + 3v_3)$$

$$\text{Kerg} = \text{Lin}\{v_1 + 4v_2 + 3v_3\}$$