

1. Przestrzeń wektorowa (liniowa)

$V \neq \emptyset$ - zbiór, (K, \oplus, \odot) - ciało przemienne

wektor - element zbioru V

skalar - element ciała K

$+$: $V \times V \rightarrow V$ - działanie wewnętrzne w V (**dodawanie wektorów**)

\cdot : $K \times V \rightarrow V$ - działanie zewnętrzne w V (**mnożenie wektora przez skalar**)

$(V, K, +, \cdot)$ jest **przestrzenią wektorową (liniową) nad ciałem K** \Leftrightarrow

1. struktura $(V, +)$ jest grupą abelową

2. $\forall u, v \in V : \forall \alpha \in K : \alpha \cdot (u + v) = (\alpha \cdot u) + (\alpha \cdot v)$

3. $\forall v \in V : \forall \alpha, \beta \in K : (\alpha \odot \beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v) \wedge (\alpha \oplus \beta) \cdot v = (\alpha \cdot v) + (\beta \cdot v)$

4. $\forall v \in V : 1 \cdot v = v$, gdzie 1 jest elementem neutralnym względem \odot

Zamiast $(V, K, +, \cdot)$ czasami pisze się V lub $V(K)$.

wektor zerowy $\bar{0}$ - element neutralny względem $+$

2. Własności działań w przestrzeni wektorowej

$(V, K, +, \cdot)$ - przestrzeń wektorowa

1. $\forall v \in V : \mathbf{0} \cdot v = \bar{0}$

2. $\forall \alpha \in K : \alpha \cdot \bar{0} = \bar{0}$

3. $\forall \alpha \in K : \forall v \in V : (-\alpha) \cdot v = \alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$

4. $\forall \alpha \in K : \forall v \in V : \alpha \cdot v = \bar{0} \Leftrightarrow \alpha = \mathbf{0} \vee v = \bar{0}$

5. $\forall \alpha \in K \setminus \{\mathbf{0}\} : \forall u, v \in V : \alpha \cdot u = \alpha \cdot v \Rightarrow u = v$

6. $\forall \alpha, \beta \in K : \forall v \in V \setminus \{\bar{0}\} : \alpha \cdot v = \beta \cdot v \Rightarrow \alpha = \beta$

3. Podprzestrzeń wektorowa (liniowa)

$(V, K, +, \cdot)$ - przestrzeń wektorowa

$U \subset V, U \neq \emptyset$ to **podprzestrzeń wektorowa przestrzeni V** \Leftrightarrow

1. $\forall u, v \in U : u + v \in U$

2. $\forall \alpha \in K : \forall u \in U : \alpha \cdot u \in U$

\Leftrightarrow

$\forall \alpha, \beta \in K : \forall u, v \in U : \alpha \cdot u + \beta \cdot v \in U$

\Leftrightarrow

$\forall n \in \mathbb{N}_+ : \forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K : \forall v_1, v_2, \dots, v_n \in U :$

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \in U$ (**kombinacja liniowa**)

Wektor zerowy przestrzeni liniowej jest elementem każdej jej podprzestrzeni.

4. Liniowa niezależność wektorów

$(V, K, +, \cdot)$ - przestrzeń wektorowa, $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$

wektory v_1, v_2, \dots, v_n są **liniowo niezależne** \Leftrightarrow

$\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K : (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \bar{0}) \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n = \mathbf{0})$

$$(v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) \wedge (v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n), v \in V \Rightarrow (\alpha_1 = \beta_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n = \beta_n)$$

Zbiór $\{v\}$ jest liniowo niezależny $\Leftrightarrow v \neq \bar{0}$

wektory v_1, v_2, \dots, v_n są **liniowo zależne** \Leftrightarrow

$$\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K : (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \bar{0}) \wedge (\alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \dots \vee \alpha_n \neq 0)$$

\Leftrightarrow przynajmniej jeden jest **kombinacją liniową** pozostałych lub $\{v_1, \dots, v_n\} = \{\bar{0}\}$

zespół wektorów $v_1, v_2, \dots, \bar{0}, \dots, v_n$ jest liniowo zależny

5. Baza przestrzeni wektorowej

$(V, K, +, \cdot)$ - przestrzeń wektorowa

Liniowa powłoka zbioru $A \subset V, A \neq \emptyset$:

$$\text{Lin}A := \{v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in K, v_1, \dots, v_k \in A\}$$

$\text{Lin}A$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni V i nazywamy ją **(pod)przestrzenią generowaną przez zbiór A** .

A jest zbiorem wektorów **rozpinających** $V \Leftrightarrow \text{Lin}A = V$

Baza przestrzeni wektorowej V - zbiór $B \subset V$ taki, że:

$$1. \text{Lin}B = V$$

$$2. \forall v_1, \dots, v_k \in B : \{v_1, \dots, v_k\} \text{ jest zbiorem } \textbf{liniowo niezależnym}$$

B jest **maksymalnym** (w sensie inkluzji) zbiorem wektorów **liniowo niezależnych** z V

B jest **minimalnym** (w sensie inkluzji) zbiorem wektorów **rozpinających** z V

$$\forall M \subset V : M \text{ jest } \textbf{liniowo niezależny} \Rightarrow \exists B : M \subset B \wedge B \text{ jest } \textbf{bazą} V$$

$$\forall N \subset V : N \text{ jest zbiorem wektorów } \textbf{rozpinających} V \Rightarrow \exists B' : B' \subset N \wedge B' \text{ jest } \textbf{bazą} V$$

$\text{Lin}A = V \Rightarrow$ każdy **maksymalny** podzbiór wektorów **liniowo niezależnych** z A tworzy **bazę** przestrzeni V

6. Wymiar przestrzeni wektorowej

B - baza przestrzeni wektorowej V

$$\textbf{wymiar przestrzeni} V : \dim V = |B|$$

$$|B| < +\infty \Rightarrow V \text{ jest } \textbf{skończenie wymiarowa}$$

$$|B| = +\infty \Rightarrow V \text{ jest } \textbf{nieskończenie wymiarowa}, \dim V = +\infty$$

$$V = \{\bar{0}\} \Rightarrow \dim V = 0$$

$$\dim V = n \Rightarrow$$

$$1. \text{ każdy zespół } \textbf{n + 1} \text{ wektorów jest } \textbf{liniowo zależny} \text{ w } V$$

$$2. \text{ każdy zespół } \textbf{n} \text{ wektorów, które } \textbf{generują} \text{ przestrzeń } V \text{ jest } \textbf{liniowo niezależny} \text{ (jest } \textbf{bazą}) \text{ i na odwrót}$$

$\dim V < +\infty, U$ - podprzestrzeń V

$$1. \dim U \leq \dim V$$

$$2. \dim U = \dim V \Rightarrow U = V$$

7. Współrzędne wektora

Reper bazowy (czasem po prostu baza) - dowolna baza z ustaloną kolejnością wektorów

$B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ - reper bazowy $(V, K, +, \cdot)$, $v = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n \in V$

Współrzędne wektora v względem bazy B - skalary $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, $v = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]_B$

Przestrzeń $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$ oznaczamy w skrócie $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$ lub \mathbb{R}^n

Baza kanoniczna - $B_k := (e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1))$

$\dim \mathbb{R}^n = n$

8. Suma podprzestrzeni

V_1, V_2 - podprzestrzenie przestrzeni wektorowej V

Suma podprzestrzeni $V_1 + V_2 := \{v \in V \mid \exists v_1 \in V_1 : \exists v_2 \in V_2 : v = v_1 + v_2\} = \{v_1 + v_2 : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$

1. $V_1 + V_2$ jest podprzestrzenią przestrzeni V
2. $V_1 \cap V_2$ jest podprzestrzenią przestrzeni V
3. $V_1 \cup V_2$ na ogół **nie** jest podprzestrzenią przestrzeni V

Suma podprzestrzeni $V_1 + V_2$ jest **sumą prostą** oznaczaną $V_1 \oplus V_2 \Leftrightarrow$

$\forall v \in V_1 + V_2 : \exists! v_1 \in V_1 : \exists! v_2 \in V_2 : v = v_1 + v_2 \Leftrightarrow$

$V_1 \cap V_2 = \{\vec{0}\}$

Przestrzeń uzupełniająca przestrzeni V_1 do V to V_2 taka, że $V = V_1 \oplus V_2$

Dla każdej podprzestrzeni dowolnej przestrzeni wektorowej istnieje jej przestrzeń uzupełniająca.

V_1, V_2 - skończenie wymiarowe $\Rightarrow \dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

$V = V_1 \oplus V_2 \Rightarrow \dim V = \dim V_1 + \dim V_2$