

Final cálculo diferencial 2015

Ejercicio 1

a) $f(0) = f(0x) = 0f(x) = 0$

b) La esfera de radio unidad (K) esta trivialmente acotada, por ejemplo por $B_2(0,0)$ y es cerrada ya que

$$\forall \{x^k\} \subset K \mid \{x^k\} \rightarrow q \implies \left\{ \|x^k\| \right\} \rightarrow \|q\| \iff 1 = \|q\| \implies q \in K \implies K \text{ cerrado}$$

Y como K es cerrado y acotado, K es compacto. Como f es continua (de clase C^∞), por el teorema de Weierstrass, f toma valores extremos en K , en particular, denotaremos como p al valor minimo de f en K

c) Tomamos $m = f(p)$ entonces:

$$f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{f(x)}{\|x\|^2} \implies f(x) = \|x\|^2 f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \geq \|x\|^2 f(p) = \|x\|^2 m$$

e) f es diferenciable en el origen si (y solo si):

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0) - Df(0)(h)}{\|h\|} \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - Df(0)(h)}{\|h\|} = 0$$

Pero

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{\|h\|} &= \lim_{h \rightarrow 0} f\left(\frac{h}{\sqrt{\|h\|}}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} f\left(\frac{h}{\|h\|} \frac{\|h\|}{\sqrt{\|h\|}}\right) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f\left(\sqrt{\|h\|} \frac{h}{\|h\|}\right) = f\left(\lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{\|h\|} \frac{h}{\|h\|}\right) = f(0) = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, tomando $Df(0) = 0$, tenemos que:

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0) - Df(0)(h)}{\|h\|}$$

Y f es diferenciable en el origen y $Df(0) = 0$

d) Las derivadas parciales en el origen son $D_{e_i}f(0) = Df(0)e_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$

Ejercicio 2

a) Calculamos $Jf(0, 1, -1)$:

$$Jf(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2xy + e^x & x^2 & 1 \end{pmatrix} \implies Jf(0, 1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observamos que $\det(\frac{\partial f}{\partial x}) \neq 0$ y que f es de clase C^∞ , por lo tanto, por el teorema de la funcion implicita:

$$\exists! g: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{tal que} \quad f(g(y, z), y, z) = 0 \quad \forall (y, z) \in A \subset \mathbb{R}^2$$

$$(y, z) \mapsto g(y, z) = x$$

Calculamos ahora $P_2(g, (1, -1))$ que es:

$$P_2(g, a)(\phi) = g(a) + Jg(a)(\phi - a) + \frac{1}{2}(\phi - a)^t Hg(a)(\phi - a) \quad a = (1, -1)$$

Calculamos ahora $Jg(a)$:

$$Jg(a) = - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p) \right)^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial y}(p) & \frac{\partial f}{\partial z}(p) \end{pmatrix} = -(1)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos ahora $Hg(a)$. Para ello derivamos implicitamente. Sabemos que $f(g(y, z), y, z) = 0$ y por lo tanto (Llamando $g(y, z) = x$):

$$0 = \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2xy \frac{\partial x}{\partial y} + e^x \frac{\partial x}{\partial y} \iff x^2 + \frac{\partial x}{\partial y} (2xy + e^x) = 0 \quad (1)$$

Calculamos ahora $\frac{\partial^2 x}{\partial y \partial y}$, repitiendo el mismo proceso:

$$0 = 2x \frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial^2 x}{\partial y \partial y} (2xy + e^x) + \frac{\partial x}{\partial y} \left(2y \frac{\partial x}{\partial y} + 2x + e^x \frac{\partial x}{\partial y} \right)$$

De donde se obtiene (sustituyendo):

$$\frac{\partial^2 x}{\partial y \partial y} (1, -1) = 0$$

Ahora derivando parcialmente respecto a z en la ecuacion (1) tenemos:

$$0 = 2x \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial^2 x}{\partial z \partial y} (2xy + e^x) + \frac{\partial x}{\partial y} \left(2y \frac{\partial x}{\partial z} + e^x \frac{\partial x}{\partial z} \right) \implies \frac{\partial^2 x}{\partial z \partial y} (1, -1) = 0$$

Como f es de clase C^∞ , entonces $\frac{\partial^2 x}{\partial z \partial y} = \frac{\partial^2 x}{\partial y \partial z} = 0$. Repetimos ahora el proceso para obtener $\frac{\partial^2 x}{\partial z \partial z}$:

$$0 = 2xy \frac{\partial x}{\partial z} + e^x \frac{\partial x}{\partial z} + 1 \iff 0 = \frac{\partial x}{\partial z} (2xy + e^x) + 1$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial z \partial z} (2xy + e^x) + \frac{\partial x}{\partial z} \left(2y \frac{\partial x}{\partial z} + e^x \frac{\partial x}{\partial z} \right) = 0 \implies \frac{\partial^2 x}{\partial z \partial z} (1, -1) = -3$$

Y $Hg(a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Para concluir:

$$P_2(g, a)(y, z) = 0 + (0 \quad -1) \left(\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) + \frac{1}{2} ((y \quad z) - (1 \quad -1)) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$P_2(g, a)(y, z) = -3z^2 - 4z + 1$$

b) Sabemos que $J(f+g) = Jf + Jg$ (si f y g son diferenciables) y por lo tanto, si $h(y, z) = g(y, z) + t(y, z)$ (con $t(y, z) = -y^2 + 2y + z$) entonces $Jh(y, z) = Jg(y, z) + Jt(y, z)$ ya que tanto t como g son de clase C^∞ y

$$Jh(1, -1) = (0 \quad -1) + (0 \quad 1) = (0 \quad 0)$$

Por lo tanto $(1, -1)$ es punto critico. Vamos ahora a clasificarlo, para ello calculamos $Hh(1, -1)$, teniendo en cuenta que $Hh(y, z) = Hg(y, z) + Ht(y, z)$ (de nuevo ya que g y t son de clase C^∞):

$$Ht(y, z) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies Hh(1, -1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Y por lo tanto $(1, -1)$ es un maximo, ya que $Hh(1, -1)$ es definida negativa (todos los v aps son negativos)

Ejercicio 3

a) Primero calculamos $Jf(x, y)$:

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} -y^2 e^{y-x^2} 2x & 2y e^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} \end{pmatrix}$$

De la primera componente observamos que vale 0 $\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

La segunda, vale 0 $\iff \begin{cases} y = 0 \\ y = -2 \end{cases}$

De donde obtenemos que los puntos criticos son $(0, -2)$ y $(x, 0) \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Calculamos ahora $Hf(x, y)$:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 4y^2 x^2 e^{y-x^2} - 2y^2 e^{y-x^2} & -4xy e^{y-x^2} - 2xy^2 e^{y-x^2} \\ -4xy e^{y-x^2} - 2xy^2 e^{y-x^2} & 2e^{y-x^2} + 4y e^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} \end{pmatrix}$$

$$Hf(0, -2) = \begin{pmatrix} -8e^{-2} & 0 \\ 0 & -2e^{-2} \end{pmatrix}$$

Y por lo tanto $f(0, -2)$ es maximo, ya que es definida negativa porque todos los *vaps* son negativos

$$Hf(x, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2e^{-x^2} \end{pmatrix} \quad \text{que es semidefinida positiva}$$

Para caracterizar los puntos $(x, 0)$ observamos que $f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y que $f(x, 0) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^2$ y por lo tanto son minimos

b) Los puntos criticos de f en K son $(0, 0)$. Miramos ahora los puntos de la frontera $x = 0$. Para ello definimos la funcion:

$$F(x, y, \lambda) = y^2 e^{y-x^2} + \lambda x$$

$$JF(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + \lambda & 2y e^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} & x \end{pmatrix}$$

$$JF(x, y, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} -2xy^2 e^{y-x^2} + \lambda = 0 \\ 2y e^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} = 0 \\ x = 0 \end{cases} \implies x = 0, \lambda = 0, y = \begin{cases} -2 \\ 0 \end{cases}$$

Ahora la frontera $y = 1$:

$$F(x, y, \lambda) = y^2 e^{y-x^2} + \lambda(y-1) \implies JF(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} + \lambda & y-1 \end{pmatrix}$$

$$JF(x, y, \lambda) = 0 \iff x = 0, y = 1, \lambda = -3e$$

Con la frontera $x^2 = y$:

$$F(x, y, \lambda) = y^2 e^{y-x^2} + \lambda(x^2 - y) \implies JF(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + 2\lambda x & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} - \lambda & x^2 - y \end{pmatrix}$$

$$JF(x, y, \lambda) = 0 \iff x = 0, y = 0, \lambda = 0$$

Ahora con la restriccion $x = 0$ y $y = 1$:

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= y^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 x + \lambda_2(y-1) \implies \\ \implies JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} + \lambda_2 & x & y \end{pmatrix} \\ JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \iff x = 0, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

Ahora con la restriccion $x = 0$ y $x^2 = y$:

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= y^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 x + \lambda_2(x^2 - y) \implies \\ \implies JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 + 2\lambda_2 x & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} - \lambda_2 & x & x^2 - y \end{pmatrix} \\ JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \iff x = 0, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

Ahora con $y = 1$ y $x^2 = y$:

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= y^2 e^{y-x^2} + \lambda_1(y-1) + \lambda_2(x^2 - y) \implies \\ \implies JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + 2\lambda_2 x & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 - \lambda_2 & y-1 & x^2 - y \end{pmatrix} \\ JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \iff x = \pm 1, y = 1, \lambda_1 = 1 - 3e, \lambda_2 = 1 \end{aligned}$$

Por ultimo, tomamos como restriccion $x = 0, y = 1, x^2 = y$:

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &= y^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 x + \lambda_2(y-1) + \lambda_3(x^2 - y) \implies \\ \implies JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &= \begin{pmatrix} -2xy^2 e^{y-x^2} + \lambda_1 + 2\lambda_2 x & 2ye^{y-x^2} + y^2 e^{y-x^2} + \lambda_2 - \lambda_3 & x & y-1 & x^2 - y \end{pmatrix} \\ JF(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &\neq 0 \quad \forall (x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^5 \end{aligned}$$

Los candidatos a maximo y aminimo son:

$$\begin{pmatrix} (0, 0) \\ (0, 1) \\ (1, 1) \end{pmatrix} \implies \begin{cases} f(0, 0) = 0 \\ f(0, 1) = e \\ f(1, 1) = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \text{maximo: } (0, 1) \\ \text{minimo: } (0, 0) \end{cases}$$