

COMMENT UN ALIMENT ACIDIFIANT AGIT SUR L'ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

1) DIGESTION

L'aliment est dégradé en nutriments (glucose, acides aminés).

→ Aucun impact direct sur le pH sanguin pour l'instant.

2) MÉTABOLISME : PRODUCTION D'ACIDES

Le métabolisme du glucose et de certains acides aminés génère :

- des ions H^+ (acides)
- des acides comme le lactique, sulfurique ou phosphorique.

→ C'est la source principale de la charge acide.

3) TAMPONNAGE IMMÉDIAT DU SANG

Le sang neutralise les acides grâce aux bicarbonates, phosphates et protéines.

→ Le pH sanguin reste stable entre 7,35 et 7,45.

4) APPEL AUX MINÉRAUX ALCALINS

Pour régénérer les tampons, l'organisme utilise :

- calcium
- magnésium
- potassium

→ Il peut les puiser dans les os et les réserves cellulaires.

5) ÉLIMINATION PAR LES REINS ET LES POUMONS

- Les poumons évacuent les acides volatils sous forme de CO_2 .
- Les reins éliminent les acides forts et régénèrent les bicarbonates.

→ Le pH urinaire devient plus acide, pas le pH du sang.

CONCLUSION

Un aliment acidifiant augmente la charge acide que le corps doit gérer.

Le pH sanguin reste stable, mais cela nécessite davantage de minéraux pour garder l'équilibre.

