

LES HEPATOCYTES

GLANDES ANNEXE : LE FOIE

ESPACE DE DISSE

- **Cellules du foie**
- **Sont des cellules polyédriques disposées** les unes à côtés des autres le long de capillaires, en cordon ou travées hépatocytaires => **travées de Remack**.
- Les facettes d'un hépatocyte sont orientées de telle façon que certaines sont en **rapport avec le pôle sanguin et d'autres avec les canalicules biliaires**.
 - ➔ **Constituent donc le pôle biliaire.**

LES VOIES BILIAIRES

- Les canaux biliaires des espaces portes se regroupent en canaux interlobulaires de calibre progressif et forment les conduits hépatiques droit et gauche, qui confluent en un conduit hépatique commun.
- **Le conduit hépatique commun quitte le foie, sur sa face inférieure, et rejoint le conduit cystique qui draine la vésicule biliaire.**
- **Il prend alors le nom de conduit cholédoque, qui s'ouvre dans le duodénum(D2).**
- **Cet abouchement duodénal est commun avec la voie pancréatique** => **conduit de Wirsung**
- **Les deux voies arrivent dans** => **l'ampoule de Vater** munie d'un sphincter => **le sphincter d'Oddi.**

LA VESICULE BILIAIRE

- Est **une poche musculieuse** à paroi mince.
- **Rôle** => **emmagasiner de la bile** afin de la concentrer et de la rendre disponible ensuite pour la digestion
- Lors du repas, les parois se contractent pour **déverser la bile dans le conduit cystique.**

- Est l'espace compris entre l'hépatocyte et le vaisseau sanguin.
- Est traversé par de nombreuses microvillosités qui augmentent la surface d'échanges
- Comporte trois types de cellules :

- **Les cellules de Küpffer**

- ⇒ Macrophages tissulaires qui ont pour fonction la phagocytose des particules étrangères, tels les micro-organismes.
- ⇒ **Rôle important dans la réaction immunitaire.**

- **Les cellules péri-sinusoïdales ou cellules de Ito**

- ⇒ Cellules riches en vacuoles lipidiques qui ont **deux fonctions** :
 - ⇒ **Le stockage de la vitamine A** et peuvent se transformer en fibroblastes
 - ⇒ **Synthétiser les fibres collagènes** qui se trouvent dans l'espace de Disse (rôle dans les fibroses hépatiques, cirrhose).

- **Les cellules granuleuses**

- ⇒ Cellules de **type lymphocytaires**, apparentées aux lymphocytes **T NK** (natural killers).

➔ **Pour résumer chaque travée d'hépatocytes présente une face vasculaire et une face biliaire.**

- **La face vasculaire**

- ⇒ Permet les échanges avec le sang veineux portal et avec le sang artériel hépatique.
- ⇒ Est le siège de l'activité métabolique et endocrinienne de l'hépatocyte.

- **La face biliaire**

- ⇒ **Responsable de la fonction exocrine de l'hépatocyte par la synthèse de la bile.**