



Physiologie de la digestion

L'estomac

- organe abdominal, va **stocker les aliments et entamer la digestion des protéines**
- **muscle très puissant** qui brasse son contenu grâce à **des contractions**,
- permet de mélanger le bol alimentaire avec le **suc gastrique** pour former **le chyme gastrique**.
- Les contractions permettent aussi d'évacuer **le chyme vers le pylore** et **le duodénum** afin de continuer la digestion des aliments.

tapissé d'un **épithélium cylindrique monostratifié**.


L'**épithélium** est parcouru par de très nombreux **orifices ou cryptes** de l'estomac qui se prolongent par **les glandes gastriques**.



CELLULES MUCIPARES:

Ces cellules se situent au niveau de l'**épithélium de surface** et au niveau **des cryptes et du collet**.

Elles sécrètent le **mucus** qui va être riche en **éléments alcalinisants** afin de protéger la **muqueuse** de l'**acidité gastrique**



CELLULES PARIETALES

Les cellules pariétales ou encore **cellules bordantes** sont chargées de produire:

- **l'acide chlorhydrique** : permet la **dénaturation des protéines**, c'est-à-dire la **destruction de la structure des protéines** afin de faciliter l'**action de la pepsine**. A aussi pour rôle de **désinfecter le bol alimentaire**.

- **le facteur intrinsèque**: ou **facteur de Castle** est une **glycoprotéine** sécrétée par **les cellules pariétales**. Il se lie (au niveau duodénal) à la **vitamine B12** et permet **son absorption** au niveau de l'**iléon**.

CELLULES PRINCIPALES:

- * On les retrouve **au fond des glandes** et sont chargées de sécréter le **pepsinogène**, c'est-à-dire le **précurseur de la pepsine**, enzyme permettant de **digérer les protéines**.
- * Le **pepsinogène** va s'activer en **pepsine** au contact de l'**acide chlorhydrique**.
- * sécrètent aussi de la **lipase gastrique**, permettant de **digérer les lipides** mais dont le rôle reste **mineur** toutefois.

