


Physiologie de la digestion 2

(Alcaliniser le chyme)


Alcaliniser le chyme

- A la sortie de l'estomac, **on estime le pH du chyme gastrique aux environs de 2.**
- Plusieurs éléments vont permettre de **l'alcaliniser** afin qu'il n'agresse pas la **muqueuse duodénale** :
 - Le mucus duodénal,
 - La bile,
 - Le suc pancréatique.



Mucus duodénal

- Au niveau du duodénum, dans la **sous-muqueuse**, on retrouve les **glandes de Brunner** qui vont sécréter du mucus.
 - * Ce mucus a deux rôles essentiels :
 - **Tamponner (neutraliser) l'acidité du chyme** : il est en effet riche en bicarbonates (HCO_3^-)
 - **protéger la muqueuse duodénale des enzymes digestives.**





Physiologie de la digestion 2

(Alcaliniser le chyme)

Au niveau du foie:

- Le foie sécrète au niveau de ses hépatocytes la bile (sécrétion exocrine),
- La bile est une sécrétion jaune-verdâtre alcaline (pH compris entre 7,8 et 8,6), Elle est produite en continu (entre 0,5 et 1L/jour) et stockée dans la vésicule biliaire.
- La bile est composée :
 - Eau 97,5 %
 - Sels biliaires 1,1 %
 - Bilirubine 0,04 %
 - Cholestérol 0,1 %
 - Phospholipides 0,04 %
 - Electrolytes (Na^+ , K^+ , HCO_3^- , Cl^-)
- Seuls les sels biliaires et les phospholipides participent à la digestion.



Suc pancréatique:

- Le suc pancréatique est produit par les cellules acineuses du pancréas (sécrétion exocrine), son pH est compris entre 7 et 9 et on en sécrète entre 1,2 et 1,5L par jour.
- Le suc pancréatique est composé de :
 - D'électrolytes et en particulier des bicarbonates (HCO_3^-) dont le rôle va être de neutraliser l'acidité du chyme.
 - De nombreuses enzymes digestives :
 - protéases,
 - lipases,
 - amylases,
 - ribonucléases...

